



Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2015

Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
ORTICOLE			
Aglio	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno
Bietola da coste e da foglia	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato
Carciofo	Afidi	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno
Cavoli a testa	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato su cavolo verza
Cavoli a foglia	Afidi	Pirimicarb	Impiego revocato
Cetriolo	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato in pieno campo
Cetriolo coltura protetta	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi all'anno con ditiocarbammati
Cetriolo pieno campo	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi all'anno con ditiocarbammati
Cicoria	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato
Cipolla	Peronospora	Metiram	Con ditiocarbammati massimo 3 interventi anno
Cipolla da industria	Peronospora	Metiram	Con ditiocarbammati massimo 3 interventi anno
Cocomero	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Fragola	Necrosi del colletto	Propamocarb	Impiego revocato
Fragola pieno campo	Tripidi	Acrinatrina + Abamectina	Massimo 1 intervento all'anno, nei limiti dei piretroidi
Lattuga	Peronospora	Fluopicolid + Propamocarb	Da massimo 3 a massimo 2 interventi all'anno (nuova etichetta)
Lattuga	Peronospora	Propamocarb + Fosetil Al	Massimo 2 interventi all'anno
Lattuga pieno campo	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Lattuga pieno campo	Tripidi	Acrinatrina + Abamectina	Nei limiti dei piretroidi e dell'Abamectina
Melone	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Patata	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno con prodotti contenenti metiram
Patata	Dorifora	Novaluron	Impiego revocato
Pisello	Peronospora	Metalaxyl + Rame	Massimo 2 interventi all'anno
Pisello	Afidi	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno
Pomodoro da industria	Peronospora	Metiram	Nel limite dei ditiocarbammati (max 3 all'anno)
Pomodoro coltura protetta	Peronospora	Metiram	Nel limite dei ditiocarbammati (max 3 all'anno)
Porro	Peronospora	Propamocarb	Impiego revocato
Radicchio	Pythium	Propamocarb	Impiego revocato
Sedano	Pythium	Propamocarb	Impiego revocato
Sedano	Afidi	Pirimicarb	Impiego revocato
Zucca	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno
Zucchino	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi anno

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
ESTENSIVE			
Barbabietola	Cercospora	Clortalonil	Massimo 2 interventi, nei casi di accertati fenomeni di resistenza alle strobilurine
Colza	Punteruolo	Acetamiprid	Max 1 intervento all'anno indep. dall'avversità
Frumento	Septoria, Oidio, Ruggini, Fusariosi	Difenoconazolo + Tebuconazolo	Nei limiti previsti per l'impiego dei fungicidi sulla coltura
Mais dolce	Afidi	Pirimicarb	Massimo 1 intervento anno
Tabacco	Altica o pulce	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Tabacco	Afidi	Pirimicarb	Impiego revocato

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
FRUTTICOLE			
Albicocco	Oidio, Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 3 interventi per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid) e dei 3 interventi con IBE.
Ciliegio	Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 3 interventi per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid) e dei 3 interventi con IBE.
Ciliegio	Drosophyla	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Melo	Ticchiolatura, Oidio	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi previsti per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid e Pentyopirad) e dei 4 interventi con IBE
Melo	Miridi	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Olivo	Lebbra	Pyraclostrobin	Massimo 1 intervento all'anno. Tempo di carenza 120 giorni.
Pero	Ticchiolatura, Maculatura	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi previsti per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid e Pentyopirad) e dei 4 interventi con IBE.
Pero	Miridi	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Pero	Psylla	Bicarbonato di K	
Pesco	Oidio, Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi per gli SDHI (Fluopyram, Boscalid) e dei 4 interventi con IBE.
Pesco	Miridi	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi
Pesco	Cocciniglie	Pyriproxifen	Utilizzabile anche in post-fioritura. Max 1 trattamento all'anno
Vite	Oidio	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 1 intervento. Con prodotti contenenti SDHI (Fluopyram, Boscalid) massimo 1 intervento all'anno in alternativa tra loro.
Vite	Cocciniglie, Cicaline	Acetamiprid	Nel limite dei neonicotinoidi

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
COLTURE IV GAMMA			
Cicorino	Peronospora, Pythium	Propamocarb	Impiego revocato
Dolcetta	Peronospora, Pythium	Propamocarb + Fosetil	Impiego limitato solo al pieno campo

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
PICCOLI FRUTTI			
Lampone	Drosophila, Afidi, Cicaline, Antonomo	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi
Mora di rovo	Drosophila, Afidi, Cicaline, Antonomo	Acetamiprid	Massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
FLORICOLE ED ORNAMENTALI			
Garofano	Peronospora	Metiram	Massimo 3 interventi all'anno

Correzione refusi

Nelle LTDI 2015, nella parte generale, è stata inserita la seguente frase "Si precisa inoltre che, tenuto conto dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari – il cosiddetto CLP -, viene sospeso per due anni, e quindi per tutto il 2015 e il 2016, il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare la preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica".

Pertanto eventuali note presenti nelle tabelle di coltura, che richiamano l'obbligo di usare prodotti non classificati come T o come Xn, vanno considerate un refuso.