

**Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale ZERBAXA®**

Indicazioni terapeutiche: Zerbaxa è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:

- Infezioni intra-addominali complicate
- Pielonefrite acuta
- Infezioni complicate del tratto urinario

Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

La rimborsabilità è limitata alla pielonefrite acuta, alle infezioni complicate del tratto urinario sostenute da batteri gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea e alle infezioni addominali complicate, la cui etiologia documentata o sospetta è dovuta a batteri gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea.

Azienda Sanitaria: _____
Unità Operativa Richiedente: _____ Data: ____ / ____ / ____
Paziente (nome, cognome): _____ Data di nascita: ____ / ____ / ____
Sesso: F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: _____
ASL di Residenza: _____ Provincia: ____ Regione: _____

Diagnosi		
<input type="checkbox"/>	Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia <u>documentata/sospetta</u> da batteri Gram-negativi, resistente ai trattamenti di prima linea (se si sospetta la presenza di patogeni anaerobi ceftolozano+tazobactam dovrà essere associato a metronidazolo)	1a linea: _____ <input type="checkbox"/> Sospetta (specificare _____) <input type="checkbox"/> Documentata <u>(Allegare Antibiogramma)</u>
<input type="checkbox"/>	Pielonefrite acuta con eziologia <u>documentata</u> da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea	1a linea: _____

□	Infezione complicata del tratto urinario (cUTI) con eziologia <u>documentata</u> da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea	<u>Allegare Antibiogramma</u>
---	--	--------------------------------------

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	Specialità	Dose	Durata Prevista
Zerbaxa	1g + 0,5g polvere per concentrato per soluzione per infusione		

Il dosaggio standard in soggetti con CrCl>50 mL/min è 1 g ceftolozano + 0,5 g tazobactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 1h) per una durata di 4-14 giorni nel trattamento delle cIAI e di 7 giorni nel trattamento della pielonefrite acuta e delle cUTI.

- infettivologo
- infettivologo consulente
- altro (specificare) _____

Nome e cognome del Medico*: _____

Recapiti del Medico*: _____

**La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE