



REGIONE DEL VENETO

UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

# LINEE TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA

(difesa integrata volontaria)

## Anno 2021

**TU aggiornato ad aprile 2021**

(in rosso le modifiche rispetto al documento approvato con DD n. 5 del 5 febbraio 2021)

---

Approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 9 - 10 dic. 2020

Approvate con Decreto Direttore  
Unità Organizzativa Fitosanitario n. 5 del 5 Febbraio 2021

**Aggiornate con Decreto Direttore**  
**Unità Organizzativa Fitosanitario n. 27 del 22 aprile 2021**

# Regione del Veneto - Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2021

Decreto Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario n. 5 del 5 febbraio 2021

**Aggiornate con Decreto Direttore U.O. Fitosanitario n. 27 del 22 aprile 2021**

(ai sensi della DGR n. 624 del 17 marzo 2009)

## INDICE

<b>PREMESSA e DEFINIZIONI</b>	2	ZUCCHINO	138
LETTURA DELLE SCHEDE	10	<b>COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI</b>	<b>142</b>
IRRORATRICI	11	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	143
S.A. CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE	13	CEREALI A.V. (FRUMENTO, ORZO, ALTRI)	148
INSETTI UTILI	14	COLZA	153
FITOREGOLATORI AUTORIZZATI	15	GIRASOLE	154
<b>COLTURE ORTICOLE</b>	<b>17</b>	LUPPOLO	155
AGLIO	17	MAIS	156
ARACHIDE	19	RISO	159
ASPARAGO	20	SOIA	162
BASILICO	22	SORGO	164
BIETOLA DA COSTA	24	TABACCO	165
CARCIOFO	26	<b>COLTURE FORAGGERE</b>	<b>168</b>
CAROTA	28	ERBA MEDICA, LOIESSA	168
CAVOLI A INFIORESCENZA	30	PRATI AVVICENDATI	169
CAVOLI A TESTA	33	<b>COLTURE FRUTTICOLE</b>	<b>170</b>
CAVOLI A FOGLIA	36	ACTINIDIA	170
CETRIOLO	38	ALBICOCCO	172
CICORIA	44	CASTAGNO DA FRUTTO	175
CIPOLLA	47	CILIEGIO	176
CIPOLLA DA INDUSTRIA	49	KAKI	178
COCOMERO	51	MELO	179
DOLCETTA	54	MELOGRANO	184
ERBE FRESCHE	58	NOCCIOLO	185
FAGIOLINO	60	NOCE DA FRUTTO	188
FAGIOLO	63	OLIVO	190
FINOCCHIO	66	PERO	193
FRAGOLA	68	DISERBO POMACEE	198
INDIVIA E SCAROLA	78	PESCO	199
LATTUGA	81	SUSINO	204
MAIS DOLCE	85	DISERBO DRUPACEE	207
MELANZANA	87	VITE	208
MELONE	92	DISERBO VITE	213
PATATA	96	<b>COLTURE BABY LEAF</b>	<b>214</b>
PATATA DOLCE	100	BIETOLA DA FOGLIA	214
PEPERONE	101	CICORINO	216
PISELLO	106	CRESCIONE	220
POMODORO DA INDUSTRIA	108	DOLCETTA	224
POMODORO CULTURA PROTETTA	112	BRASSICACEAE	228
PORRO	117	LATTUGHINO	231
PREZZEMOLO	118	RUCOLA	236
RADICCHIO	121	SPINACINO	240
RAPA BIANCA E ROSSA	124	<b>PICCOLI FRUTTI</b>	<b>243</b>
RAVANELLO	125	LAMPONE	243
RUCOLA	126	MIRTILLO	245
SCALOGNO	129	MORA DI ROVO	247
SEDANO	131	RIBES	249
SPINACIO	133	UVA SPINA	251
TOPINAMBUR	135	<b>FLOREALI E ORNAMENTALI</b>	<b>252</b>
ZUCCA	136	<b>FUNGHI COLTIVATI</b>	<b>261</b>

# NORME GENERALI

## Premessa

Le “**Linee Tecniche di Difesa Integrata**” predisposte dall’Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata – GDI – istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, indicano i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la **difesa delle colture** ed il **controllo delle infestanti**, nell’ottica di un minor impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Le “Linee Tecniche di Difesa Integrata” sono il riferimento per la **Difesa Integrata Volontaria** di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.

Questo documento **può costituire inoltre un utile orientamento per la generalità delle aziende**, che sono tenute comunque, a partire al 1 gennaio 2014, al rispetto dei principi generali della difesa integrata come stabiliti dalla direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Le “Linee Tecniche di Difesa Integrata” sono state predisposte sulla base delle “Linee Guida Nazionali” approvate dal GDI tenendo conto di:

1. **Direttiva 2009/128/CE** relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento a:
  - Articolo 14* - Difesa integrata, in particolare il comma 5, dove prevede di “... incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria orientamenti specifici per coltura ..”;
  - ALLEGATO III* - Principi generali di difesa integrata;
2. **D.Lgs n. 150 del 14/08/2012** di recepimento Direttiva 2009/128/CE con particolare riferimento a:
  - Articolo 20* - Difesa integrata volontaria;
  - Articolo 2*, comma 3 – armonizzazione con le politiche di sviluppo rurale;
3. **DM del 22 gennaio 2014** di approvazione del Piano d’Azione Nazionale – PAN - sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa integrata volontaria;
4. **Regolamento (CE) n. 1107/2009**, e gli atti conseguenti, con particolare riferimento alla lista delle s.a. candidate alla sostituzione *di cui al Reg. n. 2015/408 dell’11/3/2015 e successive modifiche. Elenco aggiornato su EU \_ Pesticides database*  
[https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en)

Inoltre si è tenuto conto di:

- normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
- principi e criteri definiti nella “Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea;
- Linee Guida Nazionali 2020;
- norme tecniche attualmente in uso da parte delle Regioni e valutate dal GDI stesso;
- innovazioni tecniche recentemente messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata ed evoluzione della fitofarmacopea;
- delle indicazioni del FRAC, dell’IRAC e dell’HRAC e le indicazioni scientifiche acquisite sul territorio per la gestione delle resistenze ai prodotti fitosanitari.

## La difesa integrata

Per quanto richiamato in premessa, la difesa integrata si deve sviluppare **valorizzando prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica** che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori e allo stesso tempo limitando i rischi per l'ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.

Particolare importanza va, quindi, riposta nel rispetto della normativa vigente e nell'applicazione dei principi generali indicati nel citato **Allegato III della Direttiva 2009/128/CE** nonché di tutte le pertinenti prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari riportate nel PAN.

In tal senso occorre tra l'altro:

- adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
- favorire l'utilizzo degli ausiliari;
- favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l'adozione di tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
- limitare l'esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, (dispositivi di protezione individuale, formazione, ecc.);
- razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e le perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
- limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
- ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
- recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari ed i relativi imballaggi;
- mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentano, tra l'altro, di prevenire e gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.

Sulla base di tali principi e criteri vengono proposte delle specifiche strategie di difesa integrata e di controllo integrato delle infestanti per ciascuna delle colture considerate.

**Nel caso in cui la gestione o la destinazione delle produzioni** (es. colture in serra, Baby leaf, colture da seme) **lo renda necessario, sono state predisposte differenti schede di difesa per la medesima specie.**

Nelle schede di coltura occorre prestare attenzione alle differenziazioni per quanto riguarda le **colture in pieno campo e le colture protette (serre)**. Vanno comunque sempre verificate le indicazioni riportate nelle etichette aggiornate dei formulari commerciali. In particolare, per serre e colture protette si intende quanto definito al comma 27 dell'articolo 3 del Regolamento n. 1107/09/CE:

**“Serra”** - ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante un rivestimento esterno solitamente traslucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia con l'ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Ai fini del presente regolamento sono considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è traslucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia). Non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta le coperture antipioggia e i piccoli tunnel mobili.

In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego di prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura, possono essere concesse **deroghe di carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.**

In caso di nuove emergenze fitosanitarie, i provvedimenti adottati dall'Unità Organizzativa Fitosanitario hanno effetto immediato anche sull'applicazione delle Norme Tecniche Regionali, senza l'esigenza di ulteriori provvedimenti.

Anche l'uso dei fitoregolatori viene regolamentato nel rispetto dei principi della produzione integrata ed è previsto solo per quelle colture per le quali l'applicazione di questi prodotti fitosanitari sia tecnicamente indispensabile per l'ottenimento della produzione.

Ove possibile, l'applicazione dei **monitoraggi** e della produzione integrata **può avvenire su scala territoriale.**

## DEFINIZIONI E NORME COMUNI DI COLTURA

Per tutte le colture vengono adottate le definizioni, le precisazioni e le prescrizioni di seguito riportate.

### 1. Coadiuvanti

Le sostanze contenute nei prodotti fitosanitari con attività di **bagnanti, coadiuvanti, antideriva, antidoti agronomici, sinergizzanti**, di norma non vengono indicate nelle schede di coltura.

**Il loro impiego è in ogni caso ammesso**, sia come componente di un prodotto fitosanitario, sia come prodotto fitosanitario, nel rispetto delle specifiche indicazioni di etichetta.

### 1. Concia delle sementi e del materiale di moltiplicazione

E' consentita la concia delle sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti fitosanitari registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente vietato. Gli interventi effettuati durante la fase di vivaio non vanno conteggiati fra quelli eseguiti nella fase di coltivazione.

### 2. Contaminazioni accidentali

La presenza di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non autorizzati o non ammessi dai disciplinari, si classifica come contaminazione accidentale, qualora riscontrata in quantità uguale o inferiore al limite di 0,01 mg/Kg così come stabilito al comma 1 lettera b dell'articolo 18 del Reg CE 396/2005.

### 3. Deroghe

Nel caso di eccezionali condizioni meteorologiche o infezioni o infestazioni non controllabili con i prodotti fitosanitari previsti dalle norme tecniche, l'Unità Organizzativa Fitosanitario potrà autorizzare deroghe aziendali o territoriali.

Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche per altre colture o impieghi.

La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione di emergenza riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque (Aclonifen, Bifenox, Cipermetrina e suoi isomeri); s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene - CMR.

### 4. Difesa

E' obbligatoria l'adozione integrale delle linee di difesa, incluso il diserbo, e l'impiego dei prodotti solo contro le avversità per le quali sono indicati, rispettando i criteri d'intervento o le limitazioni d'uso. Le dosi d'impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei prodotti fitosanitari, salvo diversa indicazione, in senso restrittivo. I prodotti fitosanitari elencati si possono utilizzare singolarmente o in miscela tra loro (vedi anche successivo punto "miscele estemporanee di PF").

Per maggiori dettagli vedi **allegato 1** - Lettura delle schede.

### 5. Diserbo

Per il diserbo le dosi, quando riportate, si riferiscono alla quantità massima di formulato commerciale ammessa per ettaro e per ciclo colturale; al variare della percentuale di principio attivo, le dosi vanno opportunamente modificate e rapportate alla dose indicata.

L'utilizzo di solfato ammonico, olio minerale (ove registrato) e altri attivanti, sono ammessi secondo le necessità aziendali.

### 6. Distribuzione dei prodotti fitosanitari

Le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono rispettare le norme riportate nell'**allegato 2**.

## 7. Etichetta dei prodotti fitosanitari

Nell'uso dei prodotti **devono essere sempre rispettate le indicazioni riportate sulle etichette** dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute. In caso di contraddizione valgono sempre le indicazioni riportate sulle etichette vigenti.

Si evidenzia che le schede di coltura riportano le sostanze attive per le quali c'è almeno un formulato autorizzato su quella coltura e per quella avversità.

Pertanto, prima di impiegare un prodotto è necessario leggere l'etichetta, in particolare per quanto riguarda gli **impieghi ammessi**, le dosi, i tempi di carenza, il numero di trattamenti e ogni altra indicazione specifica.

Per quanto riguarda il **numero massimo di interventi ammessi**, oltre alle indicazioni riportate nella colonna "limitazioni d'uso", occorre prestare particolare attenzione anche in questo caso ai limiti di etichetta, che in qualche caso potrebbero essere più restrittivi, in relazione al formulato commerciale.

## 8. Formulazioni (consigli nella scelta delle formulazioni)

Nella scelta dei formulati commerciali è consigliabile dare la preferenza a quelli che vengono commercializzati in formulazioni meno pericolose per l'operatore agricolo e per l'ambiente. In particolare sono da preferire le formulazioni di prodotti costituite da emulsioni in acqua (contrassegnate dalle lettere EW), granuli disperdibili (WG, WDG o DF), granuli solubili (SG) e sospensioni di microcapsule (CS), rispetto a quelle costituite da polveri bagnabili (PB, WP), polveri solubili (PS, WS) e concentrati emulsionabili (EC) che presentano maggiori rischi per l'operatore nella fase di preparazione della miscela e rendono più difficoltose le operazioni di lavaggio e di bonifica dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari. Le sospensioni concentrate (SC) ed i prodotti costituiti da pasta fluida, flowable (FL, FLOW) riducono il rischio tossicologico per l'operatore; tuttavia occorre considerare che i contenitori richiederanno un lavaggio più accurato. L'impiego di sacchetti idrosolubili, poco diffusi, risulta essere una soluzione valida nel caso dei prodotti in polvere.

## 9. Grandinate

A seguito di grandinate può essere eseguito un intervento disinfettante con uno dei fungicidi già ammessi per ciascuna coltura. **Tale intervento non incide nel numero massimo dei fungicidi ammessi nei disciplinari.** Vanno comunque rispettati i vincoli di etichetta relativi al numero massimo complessivo degli interventi eseguiti e all'intervallo tra i trattamenti. Ciò significa che non si potrà intervenire con la stessa sostanza attiva se è previsto ad esempio un intervallo di 7 giorni.

## 10. Microorganismi (utilizzo di sostanze attive microbiologiche)

Al fine di ottimizzare l'utilizzo del *Bacillus thuringiensis* in relazione all'efficacia dei diversi ceppi nei confronti delle diverse avversità si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella **tabella 1**.

Il *Bacillus thuringiensis* agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato quando le larve sono nei primi stadi di sviluppo. Si consiglia di utilizzare formulati di recente produzione e ben conservati. In presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente l'acqua prima di preparare la miscela. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia bordolese).

Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo di *Trichoderma* spp., *Coniothyrium minitans*, *Ampelomyces quisqualis*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Lecanicillium muscarium*, *Metharizium anisopliae*, si segnalano nella **tabella 2, 3 e 4** le avversità controllate e le registrazioni al momento disponibili.

## 11. Miscele estemporanee e (fungicidi e acaricidi)

Nelle miscele di **fungicidi** non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale. In ogni caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

Nell'esecuzione dei trattamenti con **acaricidi** sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate nelle schede di coltura, a prescindere dalla limitazione dei trattamenti contro l'avversità. Ad esempio con un limite di 1 trattamento all'anno, è ammessa la miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella scheda di coltura per la difesa dagli acari con diversa azione (es. adulticida + ovicida).

## 12. Miscele commerciali

All'interno delle schede colturali delle LGNDI vengono riportate le singole s.a. senza trascrivere le miscele, sia per il diserbo che per la difesa. E' possibile utilizzare le miscele commerciali purché le singole s.a. in esse presenti siano tutte riportate nella scheda colturale e nelle specifiche avversità.

## 13. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica

Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dall'Allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008, come modificato dal Reg. (UE) N. 2018/1584, anche quando non riportate nelle schede, a condizione che siano regolarmente autorizzati in Italia. *I prodotti biologici sono di norma evidenziati nelle schede di difesa in corsivo.*

## 14. Prodotti fitosanitari (criteri di valutazione adottati nella scelta dei prodotti)

Nel rispetto dei principi della difesa integrata, la scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle diverse colture e per le rispettive avversità, è stata effettuata tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini di poter applicare adeguate strategie di difesa.

Sono stati limitati, per quando possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione CLP) che:

- contengono sostanze attive "**candidate alla sostituzione**" ai sensi del Reg. 408/2015/UE;
- sono caratterizzati da **elevata tossicità acuta**: presenza sull'etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma "teschio con tibie incrociate" (corrispondente al pittogramma GHS06);
- sono classificati "**CORROSIVI**" o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e H318 (gravi lesioni oculari).

Inoltre sono limitati i prodotti con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:

- H350i Può provocare il cancro se inalato,
- H351 Sospettato di provocare il cancro;
- H340 Può provocare alterazioni generiche;
- H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
- H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
  - H360D Può nuocere al feto;
  - H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  - H360F Può nuocere alla fertilità.
  - H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  - H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
  - H361d Sospettato di nuocere al feto.
  - H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
  - H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.

Nei casi in cui la coltura considerata rappresenti **un impiego minore**, ai sensi dell'articolo 51 del Reg. n. 1107/09, oppure interessi un'areale produttivo limitato ed in assenza di valide alternative a minore rischio, **non sono state poste limitazioni** all'impiego di **sostanze attive candidate alla sostituzione** in ragione della minore pressione che si determina sull'ambiente. Rientrano in tale casistica, ad esempio, numerose colture orticole sulle quali è autorizzato un limitato numero di prodotti fitosanitari.

Sono state escluse o limitate le **sostanze attive classificate pericolose per l'ambiente acquatico** di cui al LGS n. 152/06, tabelle 1A e 1B, e quelle di frequente ritrovamento nelle acque.

## 15. Registro dei trattamenti

Tutte le aziende hanno l'obbligo di tenere il registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009, art. 67, e del D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012, art. 16.

Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

## 16. Resistenza (gestione della resistenza)

Per mantenere l'efficacia dei prodotti, in particolare nei confronti delle avversità che richiedono trattamenti ripetuti, occorre mettere in atto strategie antiresistenza, come indicato al punto 7 dei principi generali della difesa integrata (Allegato III della Direttiva 2009/128/CE). Tra le possibili soluzioni, le schede riportano limitazioni del numero di trattamenti con sostanze attive che presentano lo stesso meccanismo d'azione.

Il riferimento, oltre alle etichette dei prodotti fitosanitari, sono le indicazioni degli organismi internazionali e la documentazione sui meccanismi d'azione, disponibili sui seguenti siti, a cui si rimanda:

- per i fungicidi:

FRAC – FUNGICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE <http://www.frac.info>

- per gli insetticidi:

IRAC – INSECTICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE <http://www.irac-online.org>

- per gli erbicidi:

HRAC – HERBICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE <http://www.hracglobal.com>

Per quanto riguarda la situazione della resistenza agli erbicidi in Italia, si veda anche il sito del GIRE – Gruppo Italiano Resistenza Erbicidi - <http://gire.mlib.cnr.it>

## 17. Revoche e modifiche di impieghi

In applicazione del Regolamento CE 1107/2009, i prodotti possono essere revocati o possono subire modifiche di impieghi, con decreti del Ministero della Salute, che **vengono comunicati alle Società di Agrofarmaci, le quali sono tenute a loro volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori**. I decreti o i comunicati **non vengono più pubblicati in GU** ma sul sito del Ministero della Salute <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home>. Le etichette aggiornate sono disponibili sul sito web del Ministero della Salute: [http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet) (Banca dati dei Prodotti Fitosanitari del Min. Salute).

Nel caso in cui una sostanza attiva sia stata **revocata**, ed è ancora utilizzabile nella stagione in corso, nelle schede di norma viene riportata una nota con il termine ultimo di utilizzo.

## 18. Rodenticidi

Attualmente non risultano disponibili prodotti fitosanitari impiegabili come rodenticidi.

## 19. Smaltimento giacenze di magazzino dell'anno precedente

E' autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche (schede colturali) dell'anno precedente, ma esclusi dalle schede nella presente stagione. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per **l'esaurimento delle scorte presenti in azienda** e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell'anno precedente.



## 20. Sostanze attive di nuova registrazione

Qualora durante l'annata agraria fossero registrate nuove sostanze attive, l'U.O. Fitosanitario potrà autorizzarne l'impiego, per l'anno in corso, a condizioni che sia acquisito il parere di conformità da parte del Gruppo Difesa Integrata e che i nuovi formulati commerciali non riportino in etichetta frasi di rischio relative a possibili effetti cronici sulla salute dell'uomo.

## 21. Sostanze di base

Possono essere utilizzate le sostanze di base a condizione che in etichetta sia riportata la dicitura "sostanza di base approvata ai sensi dell'Art. 23 del Reg. (CE) n. 1107/2009".

## 22. Trappole a feromoni o cromotropiche

L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole, quando obbligatorie per accertare la presenza di un fitofago, non potranno richiedere nessuna deroga specifica.

L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali. Inoltre l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d'intervento relativa ad altri stadi di sviluppo del parassita.

## 23. Utilizzo del *Bacillus thuringiensis*

Al fine di ottimizzare l'utilizzo del *Bacillus thuringiensis* in relazione all'efficacia dei diversi ceppi nei confronti delle diverse avversità si consiglia di tener conto delle seguenti indicazioni:

- il *Bacillus thuringiensis* agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato quando le larve sono nei primi stadi di sviluppo;
- utilizzare formulati di recente produzione e ben conservati;
- in presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente l'acqua prima di preparare la miscela;
- non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia Bordolese);
- assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere

**Tabella 1 – Indicazioni per il corretto impiego del *Bacillus thuringiensis***

Ceppo	Prodotto Commerciale	% a.i.	Attività (UI/mg)	Lobesia botrana	Pandemis cerasana	Anarsia lineatella	Mamestra brassicae	Autogr. gamma	Helicov. armigera
B.t. kurstaki ABTS-351	DIPEL DF PRIMIAL BIOBIT		32.000 <sup>1</sup>	+++	+++	+++	++	++	++
B.t. kurstaki SA11	DELFIN ABLE	6,4	53.000 US <sup>2</sup>	+++	+++	+++	++	++	+++
B.t. kurstaki SA12	COSTAR	18	90.000 <sup>1</sup>	+++	+++	+++	++	++	++
B.t. kurstaki EG2348	LEPINOX PLUS RAPAX	15 18,8	32.000 <sup>1</sup> 24.000 <sup>1</sup>	+++	+++	+	++	++	++
B.t.aizawai/kurstaki GC91	AGREE TUREX	3,8	25.000 <sup>1</sup>	++	++	++	+++	+++	+++
B.t.aizawai H7	XENTARI FLORBAC	10,3	35,000 UP <sup>3</sup>	++	++	++	+++	+++	+++

Legenda: + sufficiente; ++ discreto; +++ buono

1 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di *Trichoplusia ni*. Il valore di riferimento è stato ottenuto tramite un saggio biologico nei confronti di uno standard di riferimento fornito dall'Istituto Pasteur (ceppo E61) il cui titolo è stato fissato in 1.000 Unità di Attività per mg.

2 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di *Spodoptera exigua*

3 Unità internazionali basate sulle larve di *Plutella xylostella*

## 24. Utilizzo di sostanze microbiologiche

Al fine di ottimizzare l'utilizzo di sostanze microbiologiche, si segnalano nelle **tabelle n. 2** i principali ceppi e formulati commerciali e si forniscono indicazioni orientative sulle colture e sulle avversità per cui sono autorizzati. Le colture autorizzate e le relative avversità **devono essere verificate nelle etichette** dei formulati commerciali.

**Tabella 2 – Prodotti microbiologici: formulati commerciali**

Antagonista microbico	Ceppo	Prodotto commerciale	Avversità
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	M-10	AQ 10 WG	Funghi
<i>Aureobasidium pullulans</i>	DSM 14940 e DSM 14941	BLOSSOM PROTECT BLOSSOM PROTECT NEW BONI PROTECT BOTECTOR BOTECTOR NEW	Funghi/Batteri
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Sottospecie <i>plantarum</i> , ceppo D747	AMYLO-X AMYLOX - LC	Funghi/Batteri
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	MBI600	SERIFEL	Funghi
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	FZB24	TAEGRO	Funghi
<i>Bacillus pumilus</i>	QST 2808	SONATA	Funghi
<i>Bacillus subtilis</i>	QST 713	SERENADE ASO	Funghi/Batteri
<i>Beauveria bassiana</i>	GHA	BOTANIGARD 22 WP BOTANIGARD OD	Insetticida
<i>Beauveria bassiana</i>	Atcc 7404	NATURALIS	Insetticida
<i>Coniothyrium minitans</i>	CON/M/91-08	CONTANS WG	Funghi
<i>Lecanicillium muscarium</i>	Ve6	MYCOTAL	Insetticida
<i>Metarhizium anisopliae</i>	F52	MET52 Granulare MET52 OD	Insetticida
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	FE 9901	FUTURECO NOFLY WP SHARK PF	Aleurodidi in serra
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	251	BIOACT PRIME DC	Nematodi
<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	MA 342	CERALL	Funghi (concia semente)
<i>Pseudomonas sp.</i>	DSMZ 13134	PRORADIX SIDERA	Funghi terricoli
<i>Pythium oligandrum</i>	M1	POLYVERSUM	Funghi
<i>Streptomyces griseoviridis</i>	K61	MYCOSTOP	Funghi terricoli
<i>Trichoderma asperellum</i>	TVI	PATRIOT GOLD, MONEY GEO XEDAVIR	Funghi terricoli
<i>Trichoderma asperellum</i>	T34	T34 BIOCONTROL	Funghi terricoli
<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	ICC 012 + ICC080	BIOTEN, ECOFOX, RADIX SOIL, REMEDIER, TELLUS WP	Funghi
<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i>	T25 + T11	TUSAL	Funghi
<i>Trichoderma atroviride</i>	SC1	VINTEC	Mal dell'esca vite/Botrite pomod.
<i>Trichoderma atroviride</i>	I-1237	ESQUIVE WP	Malattie legno vite
<i>Trichoderma harzianum</i>	T-22	TRIANUM-G TRIANUM-P	Funghi

In aggiunta agli antagonisti microbici, sono attualmente autorizzati i seguenti prodotti ad attività insetticida a base di virus:

- Virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* per il controllo delle larve della nottua gialla (*Helicoverpa armigera*) su pomodoro, peperone, melanzana, cucurbitacee, lattuga, fagiolino;
- Virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera littoralis* per il controllo della nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*) su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga e spinacio in serra e in pieno campo.

**SCHEDE “DIFESA INTEGRATA”**

Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità (colonne):

**Avversità:** vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei confronti delle quali vengono indicate le strategie di difesa; vengono considerate le principali avversità normalmente diffuse in ambito regionale.

**Criteri d'intervento:** per ciascuna avversità vengono date indicazioni sui metodi di monitoraggio, soglie, situazioni predisponenti tali avversità. Vengono inoltre indicate, quando disponibili, le modalità di impiego di mezzi alternativi ai chimici.

**Sostanze attive e ausiliari:** per ciascuna avversità vengono indicati i mezzi di difesa da utilizzare tra cui: ausiliari, tecniche basate sull'uso di feromoni, prodotti fitosanitari a base di microorganismi; prodotti fitosanitari a base di sostanze chimiche.

**È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Sostanze attive e ausiliari":** (N.B. i prodotti biologici e i prodotti con sostanze attive di base sono sempre ammessi).

**Limitazioni d'uso:** vengono riportate limitazioni d'uso dei mezzi di difesa. Le limitazioni nel numero di interventi ammessi possono derivare dalle etichette dei prodotti, oppure dalla necessità di evitare fenomeni di resistenza oppure sono finalizzate a limitare la presenza di residui. Le limitazioni possono riguardare anche un intervallo di sicurezza superiore a quello previsto in etichetta.

**Le limitazioni d'uso costituiscono sempre un obbligo che va rispettato.**

Le limitazioni d'uso riportate nelle tabelle non riguardano i prodotti biologici, per i quali vale l'etichetta (eccetto *Spinosad* e spinosine).

**Le limitazioni sono indicate come numero massimo di interventi ammessi con prodotti contenenti la sostanza attiva indicata**, per ciclo o per anno, indipendentemente dalle avversità per le quali il prodotto viene usato. Quindi, se la sostanza attiva è indicata su diverse avversità, nel limite di due interventi all'anno, questo è il numero massimo di interventi consentiti sulla coltura.

La singola sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze attive presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se non per quanto specificamente indicato. Per le miscele di fungicidi valgono le indicazioni riportate in premessa.

Nella colonna “Sostanze attive e ausiliari”, i numeri riportati a fianco di alcune sostanze attive (s.a.), indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella colonna “Limitazioni d'uso e note”, da riferirsi a quella specifica sostanza o a sostanze caratterizzate dallo stesso meccanismo d'azione.

**Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono state indicate** nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità.

Le dosi di impiego dei prodotti, quando non diversamente specificato, sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno preferibilmente le dosi minori.

**SCHEDE “DISERBO”**

Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità (colonne):

**Epoca d'impiego:** viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle infestanti consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre trapianto della coltura, post trapianto della coltura);

**Infestanti:** sono riportate le tipologie delle infestanti controllate;

**Sostanze attive:** vengono indicate le sostanze attive utilizzabili;

**Note** (limitazioni d'uso): vengono riportate indicazioni e limitazioni d'uso degli erbicidi riportati nelle colonne precedenti.

Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è quella indicata nelle etichette. Solo per quei prodotti per i quali vi è una specifica indicazione nelle schede di coltura deve essere rispettato il limite massimo di impiego di sostanza attiva o prodotto.

*Allegato 2*

## **IRRORATRICI**

### ***SCelta DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI FITOSANITARI***

Le nuove macchine irroratrici devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'azienda e delle colture da trattare (specie, forme di allevamento, tipologie di impianto ecc.), ed alla facilità e flessibilità d'uso e di regolazione. Le attrezzature devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2006/42/CE e dalla direttiva 2009/127/CE relative alle "macchine per l'applicazione di pesticidi".

E' consigliato l'acquisto di irroratrici dotate di certificazione (ENAMA/ENTAM-EN 12761).

E' importante orientare la scelta verso **irroratrici adeguatamente predisposte di accorgimenti tecnici per contenere l'effetto deriva** (ugelli antideriva, deflettori, dispositivi di avvicinamento dell'attrezzatura alla vegetazione, irroratrici a recupero, ecc.).

### ***MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI***

L'azienda agricola deve mantenere le attrezzature di distribuzione in uno **stato di funzionamento efficiente** e sottoporle a **manutenzione** almeno annuale, o comunque cadenzata in funzione della frequenza dell'utilizzo.

La manutenzione riguarda almeno i seguenti aspetti:

- a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi antigoccia;
- d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore.

L'attrezzatura deve essere adeguatamente **pulita** al termine delle operazioni di distribuzione utilizzando ogni accorgimento utile per evitare inquinamento ambientale, e comunque nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato IV del Piano di Azione Nazionale.

### ***CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI***

La direttiva 2009/128/CE, relativa all'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, ha reso **obbligatorio il controllo funzionale** per tutte le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei PF, secondo le seguenti **scadenze** (vedi DM MiPAAF n. 4847 del 3/03/2015):

- entro il 26/11/2016 tutte le irroratrici per arboree ed erbacee utilizzate a scopi professionali;
- l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate a partire dal 1 gennaio 2021;
- le attrezzature nuove vanno sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto (inteso come "primo acquisto", ossia dell'attrezzatura nuova);
- le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni due anni, ed entro due anni dall'acquisto;
- le irroratrici con larghezza di lavoro inferiore a 3 metri, ad esempio le irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree andavano controllate entro il 26 novembre 2018. L'intervallo tra i successivi controlli deve essere non superiore a 6 anni per le aziende, 4 anni per i contoterzisti.

Il controllo funzionale riguarda le diverse parti dell'attrezzatura: elementi di trasmissione, pompa, agitazione, serbatoio, sistemi di misura, controllo e regolazione, tubi, filtraggio, barra irrorante, ugelli, distribuzione e ventilatore (quando presente).

Per quel che riguarda le modalità per l'esecuzione dei controlli funzionali si applicano le procedure stabilite da:

- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e le disposizioni operative emanate con il successivo Decreto di adozione del Piano di Azione Nazionale, allegato II (in GU n. 35 del 12/02/2014);
- documenti ENAMA, approvati dal gruppo di lavoro istituito nell'ambito del "Programma per il coordinamento delle attività di controllo delle macchine per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole", disponibili sul sito <http://www.enama.it/controllo-irroratrici/s9f57c577>
- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1158 del 26 luglio 2011 – "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione delle macchine per la distrib. dei prodotti fitosanitari", allegato A.

Maggiori informazioni e l'elenco aggiornato dei Centri Prova abilitati sono disponibili sul sito:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici>

## **REGOLAZIONE**

Le aziende che aderiscono alle LTDI hanno l'obbligo di sottoporre le irroratrici alla **regolazione presso i centri prova autorizzati**, a completamento delle operazioni di controllo funzionale.

I principali parametri operativi da definire con la regolazione sono:

- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell'ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

Al termine delle operazioni di regolazione il Centro Prova rilascia idonea documentazione.

La **regolazione è un'operazione che l'utilizzatore** deve comunque essere in grado di effettuare, al fine di stabilire i parametri operativi più adeguati in funzione delle colture presenti in azienda, delle forme di allevamento, dei sistemi di impianto, dello stadio fenologico. Ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

I dati vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso, e sono almeno: tipo di attrezzatura; data di esecuzione della regolazione; volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.

## **CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

La preparazione della miscela dovrà essere effettuata con la massima attenzione a non determinare inquinamenti puntiformi.

L'esecuzione dei trattamenti dovrà avvenire nel rispetto delle precauzioni operative orientate alla minimizzazione degli effetti deriva. Ad esempio: trattare in assenza di vento o con vento tale da non provocare il trasporto delle goccioline all'esterno dell'appezzamento; mantenere adeguata distanza da corpi idrici, dalle strade e dalle abitazioni. Utilizzare ugelli antideriva. Vanno in ogni caso rispettate le specifiche prescrizioni riportate nelle etichette e le disposizioni comunali in materia.

Lo smaltimento dei residui del trattamento e delle acque di lavaggio dovrà essere attuato in modo da evitare contaminazioni puntiformi di prodotti fitosanitari nell'ambiente.

## Sostanze attive classificate come “Candidate alla sostituzione”

Il **DM del 22 gennaio 2014** di approvazione del Piano d’Azione Nazionale – PAN - sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al punto A.7.3, relativo alla difesa integrata volontaria, quarto capoverso, riporta:

*“Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal **Regolamento (CE) 1107/09.**”*

Le sostanze attive candidate alla sostituzione sono di seguito riportate:

### Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione

Alfa-cipermetrina, Dimetoato \*, Emamectina, Esfenvalerate, Ethoprophos \*, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos \*\*, Lambda-cialotrina, Lufenuron \*\*, Metam potassium, Metam sodium, Methomyl \*, Methossifenzide, Oxamyl, Pirimicarb, Tebufenpyrad, Thiacloprid \*.

### Diserbanti candidati alla sostituzione

Aclonifen, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Diquat \*, Flufenacet, Halosulfuron metile, Imazamox, Lenacil, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Nicosulfuron, Oxadiazon \*, Oxyfluorfen, Pendimetanil, Profoxydim, Propyzamide, Prosulfuron, Sulcotrione, Tembotrione, Tri-allate.

### Fungicidi e fitoregolatori candidati alla sostituzione

Benzovindiflupyr, Bromuconazolo, Cyproconazole, Cyprodinil, Difenconazole, Epoxiconazole \*\*, Famoxadone, Fludioxonil, Fluopicolide, Ipconazolo, Isopyrazam, Metalaxil, Metconazole, Miclobutanil, Paclobutrazolo, Prochloraz, Propiconazole \*, Quinoxifen \*, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame poltiglia bordolese, Rame solfato tribasico, Tebuconazole, Ziram.

### Topicidi

Bromadiolone

---

\* *Revocati, non più utilizzabili*

\*\* *Revocati con scadenza utilizzo nel 2021*

L’elenco aggiornato delle sostanze candidate alla sostituzione, a seguito delle procedure di revisione o di approvazione di nuove sostanze attive, è consultabile sul sito dell’Unione Europea “**EU Pesticides database**”, alla pagina web:

[https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en)

selezionando dal menù a sinistra “Search active substances” e quindi “Type” e nel menù a tendina “Candidate for Substitution”.

**Allegato 3 - Insetti utili segnalati nelle norme di coltura.**

ausiliare	bersaglio	castagno	cectriolo	cicorino	cocomero	dolcetta	Fragola C.P.	Fragola P.C	kaki	lattuga	lattughino	mais	melanzana	melo	melone	noce	peperone C.P.	pero	pomodoro C.P.	prezemolo	rucola	sedano	soia seme	zucca	zucchini
Amblyseius andersoni	ragnetti ed eriofidi		X				X						X				X		X						X
Amblyseius californicus *	ragnetti		X		X		X	X					X		X		X		X						
Amblyseius cucumeris *	tripidi		X				X	X					X				X		X						
Amblyseius swirskii	aleurodide/tripide		X				X			X			X				X		X						
Anthocoris nemoralis	cacopsilla pyri																	X							
Aphelinus abdominalis	afidi		X		X										X										X
Aphidius colemani	afidi piccoli		X		X		X	X					X		X		X							X	X
Aphidius ervi	afidi		X		X										X									X	X
Aphidletes aphidimyza	aphys gossypii																							X	X
Chrysoperla carnea	afidi						X								X		X						X	X	
Diglyphus isaea	Liriomyza spp.			X		X				X			X						X	X	X				
Encarsia formosa	Trialeurodes vaporarium		X										X						X						X
Eretmocerus eremicus	Trialeurodes + Bemisia		X										X						X						X
Eretmocerus mundus	Bemisia tabaci												X						X						
Heterorhabditis spp	Oziorrinco/larve lepidotteri e coleotteri						X	X																	
Lysiphlebus testaceipes	afidi		X																						
Macrolophus caliginosus	aleurodidi e tuta assoluta												X						X						
Necremnus arynes	Tuta assoluta																		X						
Nesidiocoris tenuis	tuta assoluta/aleurodidi		X										X						X						X
Orius laevigatus	tripidi		X				X	X					X						X						
Phytoseiulus persimilis	ragnetto rosso		X	X*	X		X	X			X*		X		X		X		X*		X*		X*	X	X
Praon volucre	afidi		X		X																				X
S. feltiae e carpocapsae	Larve lepidott. e coleott.	X							X					X											
Trichogramma sp	piralide											X													

\* *Amblyseius* o *Neoseiulus californicus*; \* *Amblyseius* o *Neoseiulus cucumeris*;

## FITOREGOLATORI AUTORIZZATI

## Orticole

COLTURA	TIPO DI IMPIEGO	S.A IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Aglione	Antigermogliante	Idrazide maleica	
Carciofo	Allegante	Acido gibberellico	
Cipolla	Antigermogliante	Idrazide maleica	
Fragola	Superamento stress trapianto, anticipo fioritura	NAA	
Melanzana	Allegante	Acido gibberellico, NAA	In serra con le basse temperature
Patata	Antigermogliante	Idrazide maleica	
Pomodoro da industria	Maturante	Etefon	I trattamenti possono essere effettuati entro il 5 agosto e dopo il 5 settembre, allo scopo di agevolare la pianificazione e le operazioni di raccolta. Il dosaggio varia in funzione dello sviluppo vegetativo e delle condizioni climatiche.
Pomodoro consumo fresco	Allegante	Acido gibberellico, NAA	
Zucchino	Allegante	acido gibberellico, NAA, NAD	In serra nei periodi di basse o alte temperature

Tabacco	TIPO DI IMPIEGO	S.A IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
	Antigermogliante	Idrazide maleica	
	Antigermogliante	N-decanolo	
	Maturante	Etefon	

Floreali e ornamentali	TIPO DI IMPIEGO	S.A IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
	Allegante	Acido gibberellico	Verificare le specifiche autorizzazioni dei formulati commerciali
	Aumenta la fioritura	NAA + Acido gibberellico	
	Aumenta la fotosintesi	NAA	
	Brachizzante	Clomequat	
	Brachizzante	Daminozide	
	Radicante	NAA	
	Brachizzante	Paclobutrazolo	
	Stimolante - Semenzai e piante da vivaio	NAA	
	Maturante	NAA	
Tappeti erbosi	Regolatore di crescita	Trinexapac ethyl	



**FITOREGOLATORI AUTORIZZATI**

**Frutticole**

<b>COLTURA</b>	<b>TIPO DI IMPIEGO</b>	<b>S.A IMPIEGABILE</b>	<b>NOTE E LIMITAZIONI D'USO</b>
<b>Actinidia</b>	allegante	NAA + Acido gibberellico (GA3)	
Actinidia	aumenta la pezzatura del frutto	Forchlofenuron	Consigliato anche diradamento manuale
Actinidia	diradamento fiori	NAA + Acido gibberellico GA3)	Consigliata integrazione con diradamento manuale
<b>Melo</b>	Alleganti	Acido gibberellico (GA3) Gibberelline (A4 – A7)	Impiego limitato in caso di rischio di danni da freddo
Melo	Contenimento della vigoria	Prohexadione calcium	
Melo	Contenimento della vigoria	Paclobutrazol	Massimo 0,4 litri/ettaro totale, solo con prescrizione del tecnico
Melo	Diradanti	Metamitron 6-benziladenina NAA 6-benziladenina + NAA NAD Etefon	Può essere opportuna l'integrazione con il diradamento manuale
Melo	Antiruggine Favorire uniformità dei frutti	Acido gibberellico (GA3) Gibberelline (A4 – A7) Gibberelline + 6-Benziladenina	
Melo	Antiscasola	NAA	Si raccomanda di utilizzarlo solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (cultivar, andamento climatico, parametri di maturazione)
<b>Pero</b>	Alleganti	Acido gibberellico (GA3) Gibberelline (A4 - A7) + 6-benziladenina NAA + NAD	
Pero	Contenimento della vigoria	Prohexadione calcium	
Pero	Contenimento della vigoria	Paclobutrazol	Massimo 0,4 litri/ettaro totale, solo con prescrizione del tecnico
Pero	anticasola	NAA	
<b>Pesco</b>	Contenimento della vigoria	Paclobutrazol	Massimo 1/3 superficie a pesco, solo con prescrizione del tecnico
Pesco	anticasola	NAA	Solo per percoche
<b>Susino</b>	Contenimento della vigoria	Paclobutrazol	Massimo 1/3 superficie a susino, solo con prescrizione del tecnico
<b>Vite</b>	allungamento rachide	Acido gibberellico	

## AGLIO – *Allium sativum*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Ruggine</b> <i>Puccinia spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruzione del materiale infetto dopo la raccolta - lunghe rotazioni	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Zolfo</i> <i>Azoxystrobin</i> (2) <i>Boscalid + Pyraclostrobin</i> (2, 3) <i>Tebuconazolo</i> (4) <i>Mancozeb</i> (4)	3/20 5 7/14 14 21 28c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con <i>Azoxystrobin</i> e <i>Pyraclostrobin</i> max 2 interventi all'anno (3) Massimo 2 interventi all'anno (4) Massimo 3 interventi all'anno tra <i>Mancozeb</i> e <i>Tebuconazolo</i> . <i>Mancozeb</i> revocato: impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora destructor</i> ( <i>sin. P. schleideni</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa)	<i>Pyraclostrobin + Dimetomorf</i> (1) <i>Cimoxanil</i> <i>Metiram</i> (2) <i>Zoxamide</i> (3) <i>Zoxamide + Dimetomorf</i> (3)	14 10 7 14 14	(1) Con <i>Azoxystrobin</i> e <i>Pyraclostrobin</i> max 2 interventi all'anno (2) Massimo 3 interventi anno (3) Massimo 3 interventi anno. Max 4 per <i>Dimetomorf</i>
<b>Alternaria</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruzione del materiale infetto dopo la raccolta - lunghe rotazioni	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Azoxystrobin</i> (2) <i>Pyraclostrobin + Dimetomorf</i> (2)	3/20 7 14	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con <i>Azoxystrobin</i> e <i>Pyraclostrobin</i> max 2 interventi all'anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis sp</i>		<i>Fludioxonil + Cyprodinil</i>	21c	(1) Massimo 1 intervento all'anno
<b>Marciume dei bulbi</b> <i>Fusarium spp.</i> , <i>Helminthosporium spp.</i> , <i>Sclerotium cepivorum</i> , <i>Penicillium spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare i ristagni idrici; lunghe rotazioni; - utilizzare aglio da seme sano - corretta sgranatura dei bulbi per evitare ferite Evitare la successione a colture sensibili a sclerotinia, come colza, soia e girasole. <b>Difesa chimica:</b> disinfezione secca od umida dei bulbilli con prodotti registrati	<i>Trichoderma harzianum</i> (1) <i>Boscalid + Pyraclostrobin</i> (2)	nr 14	(1) Indicato per <i>Fusarium</i> e <i>Sclerotinia</i> (2) Massimo 2 interventi all'anno
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas fluorescens</i>	<b>Interventi agronomici:</b> alla sgranatura eliminare le teste infette	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> <i>Potyvirus</i>	Non esistono trattamenti specifici Utilizzo di seme sano			

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

### DIFESA INTEGRATA DELL'AGLIO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - idonea rotazione; - utilizzo di bulbi esenti da nematodi, mediante verifica in campo sulle colture destinate a seme ed eventuali analisi			
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occident.</i>		<i>Spinosad</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Acrinatrina (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1) Betaciflutrin (1, 2) Etofenprox (1)	7 3 3 3 7 3 3 21 14	Contro questa avversità max 2 interventi all'anno. (1) Max 2 interventi all'anno con piretroidi o Etofenprox. Max 1 con Cipermetrina. Max 1 con Lambdacialotrina. Max 1 con Etofenprox. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Mosca</b> <i>Napomyza gymnostoma</i> ; <i>Suilla univittata</i>	<b>Difesa chimica:</b> - interventi precoci contro gli adulti svernanti e contro le larve appena nate	Etofenprox (1)	14	(1) Vedi nota piretroidi

### DISERBO DELL'AGLIO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Metazaclor	75 nr	
		Metazaclor	nr	Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni (vedi etichetta)
		Pendimetalin	75	Vedi nota sopra
		Aclonifen	nr	Post emergenza precoce
		Bromoxinil	30	Max 2,25 kg/ha/anno. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 14/09/2021
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Propaquizafop Quizalofop-P-etile Quizalofop etile isomero D (1) Ciclossidim	30 30 30 28	per migliorare l'azione, miscelare con bagnante (1) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali
	Dicotiledoni	Piridate	21	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
	Dicotiledoni	Clopiralid	nr	

## ARACHIDE – *Arachis hypogea*

AVVERSITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
Patogeni tellurici	Impiegare seme conciato			
Peronospora Antracnosi	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali; - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato. <b>Difesa chimica</b> - si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7 - 8 giorni	<i>Prodotti rameici</i> (1)		(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

## DISERBO DELL'ARACHIDE

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre-semina</b>	<del>Graminacee e Dicotiledoni</del>	<del>Benfluralin</del> (1)	<del>##</del>	(1) Revoca impiego DM 22 marzo 2021
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	nr	
<b>Post emergenza</b>	Interventi meccanici: in genere occorre effettuare almeno 2 sarchiature			

## ASPARGO – *Asparagus officinalis*

AVVERSAITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Ruggine</b> <i>Puccinia asparagi</i>	<b>Difesa chimica:</b> -trattamenti solo dopo la raccolta	<i>Prodotti rameici</i> (1) Difenoconazolo (2) Tebuconazolo (2) Azoxystrobin (3) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Fluopyram + Tebuconazolo (4) Mancozeb (5)	nr/20 7 nr nr 120 nr nr	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con IBE max 3 interventi anno (3) Con strobilurine max. 2 interventi anno (4) Max 1 intervento anno (5) Max 3 interventi anno. L'uso del mancozeb comporta una riduzione del rame a 3 kg /ha anno Mancozeb <b>revocato</b> : impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022
<b>Stemfiliosi</b> <i>Stemphylium vesicarium</i>	<b>Interventi agronomici:</b> in autunno asportazione o bruciatura delle stoppie e lavorazione del suolo, al fine di abbassare il potenziale d'innocuo <b>Difesa chimica:</b> - trattamenti solo dopo la raccolta	<b>Prodotti rameici</b> (1) Difenoconazolo (2) Tebuconazolo (2) Azoxystrobin (3) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Mancozeb (4) Fluopyram + Tebuconazolo (5)	nr/20 7 nr nr 120 nr nr	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con IBE max 2 interventi anno (3) Con strobilurine max. 2 interventi anno (4) Max 3 interventi anno. L'uso del mancozeb comporta una riduzione del rame a 3 kg /ha anno Mancozeb <b>revocato</b> : impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (5) Max 1 intervento anno
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria spp</i>	<b>Interventi agronomici:</b> in autunno asportazione o bruciatura delle stoppie	<i>Prodotti rameici</i> (1)	nr/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Oidio</b>		<i>Zolfo</i>	3/5	
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> per i nuovi impianti, concia delle zampe o sementi con prodotti registrati			
<b>Mal vinato</b> <i>Rhizoctonia violacea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> in presenza di focolai di malattia raccogliere e distruggere tempestivamente le piante malate	<i>Trichoderma asperellum</i>	nr	
<b>VIROSI - AV1, AV2</b>	Non sono previsti interventi			

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## ASPARGO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca grigia</b> <i>Delia = Hylemya platura</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire a 15 giorni dalla presumibile epoca di inizio dell'emergenza dei turioni, nelle zone colpite precedentemente	Teflutrin (1)	nr - c	(1) Max 1 intervento anno, localizzato lungo la fila, al momento del trapianto. Non impiegabile su impianti in produzione. c = solo pieno campo
<b>Criocere</b> <i>Crioceris asparagi, C. duodecimpunctata</i>	Danni generalmente limitati.	Deltametrina (1) Cipermetrina (1)	nr nr	(1) Max 2 interventi anno con piretroidi. Max 1 anno con Cipermetrina
<b>Ipoipta</b> <i>Hypoipta caestrum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> attacchi su aree limitate; raccogliere e distruggere i bozzoli delle crisalidi che fuoriescono dal terreno da giugno a metà di luglio			
<b>Afide</b> <i>Brachycorynella asparagi</i>	<b>Difesa chimica:</b> ammessa solo su impianti in allevamento	<i>Maltdestrina</i> Deltametrina (1)	nr nr	(1) Max 2 interventi anno con piretroidi
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	Gli elateridi cominciano a muoversi con temperature di 10 gradi. Può essere utile l'uso di calcicianamide.	Teflutrin (1)	nr - c	(1) Vedi nota sopra
<b>Limacce</b> <i>Helix spp., Limax spp</i>	<b>Soglia</b> Presenza generalizzata	<i>Fosfato ferrico</i>	-	

## DISERBO DELL'ASPARGO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre Trapianto, Pre emergenza dei turioni e/o Post Raccolta</b>	Dicotiledoni, Graminacee Annuali e Perenni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza dei turioni</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin	nr - 60	
<b>Post emergenza o post trapianto</b>	Graminacee	Propaquizafop	30	
<b>Post raccolta</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin + Clomazone Metribuzin Metobromuron	nr nr - 60 nr	
<b>Pre ricaccio</b>	Dicotiledoni	Piridate Metribuzin Dicamba (1) Pendimetalin (2)	nr 60 20 28/60	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche materbe (1) Specifico per villucchio (2) Da utilizzare solo dopo la rottura dell'asparagiaia

## BASILICO – *Ocimum* spp.

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture ammalate; favorire il drenaggio del suolo; distanziare maggiormente le piante; aerare oculatamente serre e tunnel; uso di varietà tolleranti <b>Difesa chimica</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia	<i>Prodotti rameici</i> * Metalaxil-M + Rame (1) Azoxystrobin (2) Mandipropamide (3) Dimetomorf (3) Fluopicolide + Propamocarb (4) Mancozeb (5) Dimetomorf + Pyraclostrobin (2, 3) Ametoctradin (6)	3/20 10/14 7 7 7 / 14 28c 7c 7c	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo. (1) Max 3 interventi all'anno (2) Con strobilurine – Azoxystrobin, Pyraclostrobin - max 3 interventi all'anno (3) Max 4 interventi anno con CAA – Mandipropamide e Dimetomorf - (4) Max 3 interventi anno. (5) Max 3 interventi all'anno. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022 (6) Max 2 interventi anno
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>basilici</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampi avvicendamenti colturali - ricorso a varietà tolleranti - impiego di semi sicuramente sani	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> D747 <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr - s 1	c = solo pieno campo s = solo in serra
<b>Marciume del colletto</b> <i>Rhizoctonia solan</i>	<b>Interventi agronomici:</b> ampi avvicendamenti colturali; impiego di semi o piante sane; uso limitato dei fertilizzanti azotati; accurato drenaggio del terreno; ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> D747 <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSM	nr nr 3 nr - s 1	
<b>Marciumi molli</b> <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili <b>Difesa chimica</b> - intervenire alla semina	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> D747 Boscalid + Pyraclostrobin (1) Fenexamide (2) Fludioxonil (3) Cyprodinil + Fludioxonil (3)	nr nr 0 nr - s 14 3 7 7	(1) Con strobilurine al massimo 3 interventi anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi anno con Fludioxonil
<b>Macchia nera</b> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	<b>Difesa chimica</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi o preventivamente	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i>	5	
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp.		<i>Trichoderma</i> spp <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> D747	nr nr - s	

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## BASILICO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Batteriosi</b> ( <i>Erwinia spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare avvicendamenti colturali ampi; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infette; effettuare concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per asperione; non irrigare con acque "ferme" o con residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte fogliari</b> ( <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> )	<b>Difesa chimica</b> Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) <i>Deltametrina</i> (2) <i>Metossifenozide</i> (3) <i>Clorantniliprole</i> (4)	3 7 3 3 3c 3c 3	(1) Tra <i>Spinosad</i> e <i>Spinetoram</i> massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con <i>Spinetoram</i> (2) Max 2 interventi all'anno. (3) Max 1 trattamento anno (4) Max 2 interventi anno c = solo pieno campo
<b>Minatrice fogliare</b> ( <i>Lyriomiza spp.</i> )	<b>Interventi biologici</b> - In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 - 0,2 individui per metro quadrato di <i>Dygliphus isaea</i> <b>Difesa chimica</b> - intervenire in presenza di forti infestazioni	<i>Spinosad</i> (1) <i>Acetamiprid</i> (2)	3 10c 5s	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo, 2 all'anno
<b>Afidi</b> ( <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> )	<b>Difesa chimica</b> Intervenire in presenza di forti infestazioni	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Deltametrina</i> (1) <i>Acetamiprid</i> (2)	1 7 0 nr 3c 10c 5s	(1) Max 2 interventi all'anno. (2) Max 1 intervento per ciclo, 2 all'anno
<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	<b>Difesa chimica</b> Intervenire in presenza di forti infestazioni	<i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1)	3 3	(1) Tra <i>Spinosad</i> e <i>Spinetoram</i> massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con <i>Spinetoram</i>
<b>Nematodi fogliari</b> ( <i>Ditylenchus dipsaci</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> effettuare ampi avvicendamenti; impiegare seme esente dal nematode			

## DISERBO DEL BASILICO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico <b>Benfluralin (1)</b>	nr nr nr - c	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	nr	
<b>Post-emergenza</b>	Graminacee	Quizalofop-p-etil Ciclossidim	28 28	Verificare registrazione f.c.



## BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA – *Beta vulgaris*

AVVERSITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Cercospora</b> <i>Cercospora beticola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampi avvicendamenti - eliminare la vegetazione infetta <b>Difesa chimica</b> - intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico <b>Difesa chimica</b> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe betae</i>	<b>Difesa chimica</b> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i>	5	
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora farinosa</i> (= <i>P. effusa</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali <b>Difesa chimica</b> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi <b>Difesa chimica</b> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Dimetomorf + Pyraclostrobin (2) Mandipropamide (2)	3/20 14c 7	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 3 interventi anno tra Dimetomorf e Mandipropamide
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces betae</i>	<b>Difesa chimica</b> - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni	<i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Pyraclostrobin + Boscalid (1) Penthiopirad (2)	0 14 7c	(1) Max 2 interventi anno (2) Max 2 interventi all'anno. Max 2 interventi con SDHI – Boscalid e Penthiopirad
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia</i> spp		<i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Coniothyrium minitans</i> Penthiopirad (1)	0 nr 7c	(1) Max 2 interventi all'anno. Max 2 con SDHI.
<b>Mal del piede</b> <i>Phoma betae</i> , <i>Pythium</i> <b>Mal vinato</b> <i>Rhizoctonia violacea</i> <b>Marciume secco</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive - utilizzare seme sano oppure conciato - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	<i>Trichoderma asperellum</i> (1) <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr 1	(1) Indicato per <i>Rhizoctonia solani</i> e <i>Pythium</i>

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

### BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Affidi</b> <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persica</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in presenza di infestazioni diffuse	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Lambdacialotrina (1) Taufluvallinate (1, 2) Acetamiprid (2, 3)	1 7 nr 0 10c 14c 10c	(1) Massimo 3 interventi anno con piretroidi. Max 2 anno con Lambdacialotrina; max 2 anno con Etofenprox. (2) Solo bietola rossa da foglia (3) Max 1 intervento per ciclo, max. 2 all'anno
<b>Mosca</b> <i>Pegomya betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle mine appena formate			
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	<i>Azadiractina</i> Acetamiprid (1)	7	(1) Max 1 intervento per ciclo, max. 2 all'anno
<b>Miridi</b>		Etofenprox	7	(1) Al massimo 2 interventi all'anno
<b>Nottue fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> <i>Spodoptera littoralis</i>	<b>Soglia</b> Presenza	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Etofenprox (2) Lambdacialotrina (2) Metossifenozide (3) Clorantraniliprole (4)	3 3 3 7 10c 3c 3	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Vedi nota piretroidi (3) Max 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp	<b>Soglia</b> Presenza generalizzata	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 -	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Altica</b> <i>Phyllotreta</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> se si riscontrano ovideposizioni o rosure degli adulti	Etofenprox (1) Acetamiprid (2)	7 10c	(1) Vedi nota piretroidi (2) Max 1 intervento per ciclo, max. 2 all'anno

### BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolacolor (1) Metamitron (2)	nr 45	(1) Ammesso solo tra febbraio ed agosto (2) <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 24/09/2021
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Fenmedifam	28	

## CARCIOFO – *Cynara scolymus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Solo in concomitanza di primavere ed autunni piovosi. Il trattamento va effettuato in presenza dei primi sintomi e per interventi localizzati, utilizzando s.a. sistemiche o citotropiche in miscela con s.a. di contatto oppure prodotti rameici.	<i>Prodotti rameici</i> Azoxystrobin (1) Cimoxanil Fosetil Al Pyraclostrobin (1) + Dimetomorf (2) <b>Mandipropamide (2)</b>	3/20 7 21 <b>21</b> 3 7c	Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità, eccetto l'impiego del rame, nel limite di 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Con strobilurine max 3 interventi anno. Azoxystrobin max 2 interventi anno. <b>(2) Con CAA massimo 3 interventi anno.</b>
<b>Marcume del colletto</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>		<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (2) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> Flutolanil (3)	nr nr 3 nr	(1) Impiegabile su terreno in assenza di coltura, solo contro sclerotinia (2) Indicato solo per <i>Rhizoctonia solani</i> (3) Indicato solo per <i>Rhizoctonia</i> . Prima del trapianto sul materiale di moltiplicazione
<b>Oidio</b> <i>Leveillula taurica</i>		<i>Bicarbonato di Potassio</i> <i>Zolfo</i> Penconazolo (1) Tebuconazolo (1) Tetraconazolo (1) Miclobutanil (1) Azoxystrobin (3) Pyraclostrobin + Dimetomorf (4) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1)	1 c 5 14 7 7 3 7 3 7 c	Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità, escluso l'impiego dello zolfo (1) Con IBE max 2 interventi all'anno. Max 1 con Tebuconazolo, Miclobutanil, Difenoconazolo in alternativa tra loro (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 3 interventi all'anno. Con strobilurine (Azoxystrobin Pyraclostrobin) max 3 interventi complessivi all'anno
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Brachicaudus cardui</i> , <i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Disaphis cynarae</i>	<b>Interventi agronomici</b> sfalcicare le infestanti dai bordi dei campi. <b>Difesa chimica:</b> Intervenire sulle fasce perimetrali delle coltivazioni o comunque ricorrere a interventi localizzati	<i>Maltodestrina</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) <i>Olio minerale</i> (3) Spirotetramat	nr 3 3 7 7 20 7c	(1) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. Max 1 Cipermetrina. Max 1 Lambdacialotrina. (2) Max 1 intervento all'anno (3) Formulati registrati per impiego in vegetazione
<b>Gortina</b> <i>Gortyna xanthenes</i> ; <i>Gortyna flavago</i>	<b>Difesa chimica:</b> gli interventi vanno effettuati alla fine del volo riscontrato con le trappole a feromone prima che le larve penetrino nello stelo	<i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (2)	3 3 7 7	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Vedi nota sopra. (2) Max 3 interventi all'anno

## CARCIOFO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Depressaria</b> <i>Depressaria erinacella</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire in autunno solo se è iniziata l'infestazione prima che le larve penetrino nei germogli e nei capolini.	<i>Bacillus thuringiensis Spinosad</i> (1) Emamectina (2)	3 7 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Noftue</b> <i>Scotia segetum Scotia ipsilon</i> <i>Plusia gamma</i>	<b>Soglia:</b> infestazione generalizzata <b>Difesa chimica:</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> Lambdacialotrina (1) Deltametrina (1) Cipermetrina (1)	3 7 3 3	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Vedi nota sopra.
<b>Noftue fogliari</b> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Vanessa cardui</i> <i>Mamestra brassicae</i>		<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1) <i>Spinosad</i> (2) Cipermetrina (3) Emamectina (4) Clorantranilprole (5)	3 10 7 3 3 3 c	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 1 intervento anno, nel limite piretroidi. (4) Max 2 interventi all'anno (5) In miscela con Lambdacialotrina, nel limite di 1 intervento anno
<b>Limacce</b>	<b>Soglia:</b> infestazione generalizzata.	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>		<i>Paecilomyces lilacinus</i>	nr	
<b>Altica dei cardi</b> <i>Spheroderma rubidum</i>	Non sono autorizzati trattamenti			

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## DISERBO DEL CARCIOFO

EPOCA - MODO D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre-trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Gliofate Acido pelargonico	nr nr	<b>Gliofate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni	Aclonifen	nr	
<b>Post-trapianto</b> <b>Pre-ricaccio</b> <b>Post-ricaccio</b>	Graminacee annuali e numerose Dicotiledoni	Oxyfluorfen (1) Pendimetalin Metazaclor (2)	nr 60 nr	(1) Solo applicazioni lungo la fila della coltura e solo in pre-emergenza autunnale o post emergenza invernale. (2) Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni (vedi etichetta)
<b>Post-trapianto</b> <b>Post-ricaccio</b>	Dicotiledoni	Piridate	45	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
<b>Post-trapianto</b> <b>Post-ricaccio</b>	Graminacee	Quizalofop etile isomero D (1) Quizalofop P etile (1) Cletodim	30 30 40	(1) Verificare autorizzazione dei formulati commerciali
<b>Localizzato</b>	Dicotiledoni	Pyraflufen etil	nr	Distribuire con attrezzature schermate, a bassa pressione

## CAROTA – *Daucus carota*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria dauci</i> <i>Stemphylium</i> spp		<i>Prodotti rameici</i> * Azoxystrobin (1) Difenoconazolo (2) Pyrimethanil (3) Boscalid + Pyraclostrobin (1, 4) Isopyrazam (5) Mancozeb (6) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (7)	3/20 7 7 7 14 14c 30 7c	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Max 2 interventi per ciclo con QoI - Azoxystrobin e Pyraclostrobin -. (2) Max 2 interventi anno tra Difenoconazolo e Isopyrazam (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno con la miscela. (5) Max 2 interventi anno tra Isopyrazam e Difenoconazolo. Max 2 interventi con SDHI – Isopyrazam, Boscalid, Fluxapiroxad -. (6) Max 2 interventi all'anno. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022 (7) Max 1 intervento, nel limite del Difenoconazolo
<b>Marciumi basali</b> <i>Sclerotinia</i> spp <i>Rhizoctonia solani</i>		<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (2) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr nr 3	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura; attivo su <i>Sclerotinia</i> (2) Indicato per <i>Rhizoctonia solani</i>
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <b>Bicarbonato di potassio</b> Azoxystrobin (1) Difenoconazolo (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Isopyrazam (4) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (5)	7 3 1 7 7 14 14c 7c	(1) Vedi nota sopra (2) Max 2 interventi anno tra Difenoconazolo e Isopyrazam (3) Max 2 interventi all'anno con la miscela. Vedi anche limitazione per i QoI (4) Max 2 interventi anno tra Isopyrazam e Difenoconazolo. Max 2 interventi con SDHI – Isopyrazam, Boscalid, Fluxapiroxad -. (5) Max 1 intervento, nel limite del Difenoconazolo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca</b> <i>Psila rosae</i>	<b>Difesa chimica:</b> limitatamente alle semine primaverili-estive	Deltametrina (1)	3	(1) Con piretroidi max 2 interventi per ciclo Con Deltametrina max 3 interventi all'anno. Verificare l'impiego in etichetta.
<b>Notte fogliari</b> <i>(Heliotis armigera, Autographa gamma)</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza accertata	Deltametrina (1) Clorantpriliprole (2)	3/7 21	(1) Con piretroidi max 2 interventi per ciclo. (2) Max 2 interventi anno
<b>Afidi</b> <i>Semiaphis dauci, Dysaphis</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> presenza accertata su piante in fase di accrescimento	<i>Azadiractina</i> <i>Maltodesrina</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Tauflualinate (1)	3 nr 3/7 3 14c	(1) Vedi nota sopra. Lambdacialotrina max 1 all'anno

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## CAROTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Heterodera carotae</i> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - utilizzo di piante biocide <b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza	<i>Pacilomices lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> Oxamyl (1) Fluopyram (2)	nr c nr - c nr nr - c	(1) Localizzato nel solco di semina (2) Nel limite dei 2 SDHI – Fluopyram, Boscalid, Isopyrazam -.
<b>Patogeni tellurici</b> <i>Sclerotinia Sclerotinia spp.</i> <i>Rhizoctonia Rhizoctonia s.</i> <i>Moria piante Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica:</b>  - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>		Teflutrin (1) Lambdaialotrina (1)	nr - c nr - c	(1) Intervento localizzato al terreno, massimo 1 intervento anno, in alternativa tra loro. c = solo pieno campo

## DISERBO DELLA CAROTA

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee Annuali e Dicotiledoni	Aclonifen Pendimetalin Clomazone (1)	nr 60 60c	(1) Possibile fitotossicità su terreni sabbiosi. In questi casi la dose indicata va opportunamente ridotta .
	Dicotiledoni annuali	Pendimetalin Metribuzin (2)	60 60	(2) dopo la 3° - 4° foglia
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-P-etile Quizalofop etile isomero D Cletodim	35 30 30 30 40	Per migliorare l'azione miscelare i graminicidi con bagnante.

## CAVOLI A INFIORESCENZA

### Cavolfiori, Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora brassicae</i>	<b>Difesa agronomica:</b> - effettuare ampie rotazioni - favorire il drenaggio del suolo - allontanare le piante e le foglie infette - non adottare alte densità di impianto	<i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) <b>Mandipropamide</b> (3)	3/20 20c 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Massimo 2 trattamenti per ciclo con Metalaxil-M (3) <b>Massimo 2 interventi anno</b> c = solo pieno campo
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria brassicicola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminazione delle piante infette in fase di trapianto; effettuare ampie rotazioni. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Prodotti rameici</i> Difenoconazolo (1) Azoxystrobin (2, 3) Pyraclostrobin (2) + Boscalid (4) Azoxystrobin + Difenoconazolo (1, 2) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1, 4)	3/20 14 14 14 14 14c	(1) Difenoconazolo: max 2 interventi per ciclo, 3 all'anno (2) Con strobilurine –Azoxystrobin, Pyraclostrobin - max 2 interventi per ciclo, max 3 anno (3) Registrato solo su cavolfiore (4) Con SDHI - Boscalid e Fluxapiroxad – massimo 3 interventi all'anno.
<b>Micosferella del cavolo</b> <i>Mycosphaerella brassicicola</i>	<b>Difesa agronomica:</b> - effettuare ampie rotazioni - eliminare le piante ammalate <b>Difesa chimica:</b> - intervenire in funzione delle condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e temperature tra 16-20 °C	<i>Prodotti rameici</i> (1) Difenoconazolo (2) Azoxystrobin (3) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (2, 4)	3/20 14 14 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con Difenoconazolo max 2 interventi per ciclo, 3 all'anno. (3) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo, max 3 anno . Registrato solo su cavolfiore (4) Vedi nota Difenoconazolo e SDHI
<b>Moria delle piante</b> <i>Phytium spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici nel terreno <b>Difesa chimica:</b> Intervenire alla semina o prime fasi vegetative	<i>Trichoderma harzianum</i> Propamocarb + Fosetil (1)	nr 20	(1) Ammesso solo in semenzaio
<b>Marciumi basali</b> <i>Rizoctonia solani</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Phoma lingam</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni; arieggiare le serre e i tunnel; eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative Intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma harzianum</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (1) <i>Coniothyrium minitans</i> (2) Pyraclostrobin + Boscalid (3) <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr nr 14 1	(1) Indicati per <i>Rhizoctonia</i> (2) Impiego sul terreno in assenza di coltura. Indicato per <i>Sclerotinia</i> (3) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo, max 3 anno. Registrato solo per <i>Sclerotinia</i> su broccoli. Su cavolfiore solo per alternaria.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cruciferarum</i>	Intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Zolfo</i>	5	
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas campestris</i> , <i>Erwinia carotovora</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**CAVOLI A INFIORESCENZA: Cavolfiori, Cavoli broccoli, Cavoli broccoli (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca</b> <i>Delia = Hylemya radicum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare le crucifere spontanee; distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno; - lavorazioni dell'interfila in aprile, per limitare la fuoriuscita degli adulti. <b>Difesa chimica:</b> - verificare le ovo deposizioni; bagnare bene la base della pianta	Teflutrin (1) Deltametrina (2)	nr -c 3	(1) Al massimo 1 intervento per ciclo, localizzato. Registrato su cavolfiore. (2) Vedi nota piretroidi. c = solo pieno campo
<b>Nottue, Cavolaia</b> <i>Mamestra oleracea,</i> <i>Pieris brassicae,</i> <i>Pieris rapae,</i> <i>Plutella xylostella</i>	<b>Difesa biologica:</b> - intervenire con <i>B. thuringiensis</i> in presenza delle prime larve <b>Difesa chimica:</b> - trattare alla comparsa dei primi danni	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (1) Taufluvinate (2, 3) Cipermetrina (2) Zetacipermetrina (2, 7) Lambdacialotrina (2) Deltametrina (2) Betaciflutrin (2, 8) <i>Spinosad</i> (4) Spinetoram (4) Emamectina (5) Clorantniliprole (6)	3 7 3 7c 3c 7 7c 7 3c 3 7c 3c 3c	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo. Max 3 per cicli oltre i 70 giorni. Max 2 anno per Lambdacialotrina. Max 1 anno fra Cipermetrina e Zetacipermetrina (3) Registrato solo per cavolfiore (4) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (5) Max 2 interventi anno (6) Max 2 interventi anno (7) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (8) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo
<b>Afidi</b> <i>Brevicoryne brassicae,</i> <i>Myzus persicae</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: presenza di colonie sul 5% delle piante	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> (1) <i>Maltodestrina</i> Cipermetrina (2) Deltametrina (2) Lambdacialotrina (2) Zetacipermetrina (2, 5) Betaciflutrin (2, 6) Taufluvinate (2) Esfenvalerate (2, 7) Acetamiprid (4) Sulfoxaflor	3c 7 nr 3c 7 7c 7 3c 7c 14 7c	(1) Registrata solo su cavolfiore (2) Vedi nota Piretroidi (3) Registrato solo per cavolfiore (4) Max 2 interventi all'anno. (5) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (6) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 (7) Solo cavolo broccolo. Nel limite dei piretroidi.
<b>Tripidi</b> <i>Tripis tabaci</i>	<b>Difesa chimica:</b>	<i>Spinosad</i> (1) <i>Olio essenziale di arancio</i> Taufluvinate (2) Deltametrina (2) Betaciflutrin (2, 3)	3 3 7c 7 3c	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) Vedi nota Piretroidi (3) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità



**CAVOLLIA INFIORESCENZA: Cavolfiori, Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Aleurodidi</b> <i>Aleyrodes proletella</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire alla presenza del 10% di piante infestate	<i>Piretrine pure</i> <i>Maltodesirina</i> Deltametrina (1) Zetacipermetrina (1) <i>Olio minerale</i> <i>Olio essenziale di arancio</i>	3c nr 7 7 3 3	(1) Vedi note piretroidi
<b>Altiche</b> <i>Phyllotreta spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo su piante giovani e in presenza di infestazioni diffuse	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 3) Acetamiprid (2)	7 3c 14	(1) Vedi note piretroidi. (2) Massimo 1 intervento per ciclo, 2 all'anno (3) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Tentredine</b> <i>Athalia rosae</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire solo nei cicli estivi	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 2)	7 3c	(1) Vedi note piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Limacce</b> ( <i>Helix</i> , <i>Cantareus</i> , <i>Helicella</i> , <i>Limax</i> , <i>Agriolimax</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - trattare alla comparsa	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	7/20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnellino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp</i>	<b>Difesa chimica:</b>	Teflutrin (1, 2) Zetacipermetrina (1, 3) Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1)	nr - c nr nr - c nr	(1) Un intervento anno, in alternativa tra loro, localizzati. Non rientrano nel limite dei piretroidi. (2) Solo cavolfiore (3) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021

**DISERBO CAVOLLA INFIORESCENZA: Cavolfiori, Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Napropamide (1) Pendimetalin	nr 100	(1) Ammesso solo su cavolfiore
	Graminacee e Dicotiledoni	Metazactor (2)	nr	(2) Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva metazactor in un periodo di 3 anni sullo stesso campo
<b>Post trapianto</b>	Dicotiledoni	Clopiralid (3) Piridate (4)	nr 42/49	(3) Verificare registrazione formulati commerciali (4) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
	Graminacee	Propaquizafop Quizalofop-P-ètile	30 30	Tempo di carenza: 49 cavolfiore, 42 broccoli

## CAVOLI A TESTA

### Cavoli cappucci, Cavoli verza – *Brassica oleracea* var. capitata; Cavoletti di Bruxelles - *Brassica oleracea* var. gemmifera

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Per. parassitica</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampie rotazioni - favorire il drenaggio del suolo - allontanare le piante e le foglie infette	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Alternariosi</b> ( <i>Alternaria brassicae</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampie rotazioni; evitare alte densità d'impianto <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Azoxystrobin + Difenconazolo (3) Difenconazolo (3) Fluxapiroxad+Difenconazolo (3, 4)	14/20 14 14 21 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Al massimo 2 interventi all'anno. Registrato per cavolo cappuccio e cavolo Bruxelles. (3) Vedi nota sopra. Con Difeconazolo max 2 interventi anno (4) No su cavolo di Bruxelles
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare ristagni idrici nel terreno <b>Difesa chimica:</b> Intervenire durante le prime fasi vegetative	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> Propamocarb (1)	nr nr nr	(1) Solo nella preparazione substrati di semina
<b>Marciumi basali</b> ( <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Rizoctonia solani</i> , <i>Phoma lingam</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampie rotazioni; eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili; <b>Difesa chimica:</b> Intervenire durante le prime fasi vegetative.	<i>Trichoderma harzianum</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (1) <i>Coniothyrium mimitans</i> (2) <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr nr 1	(1) Indicati per <i>Rhizoctonia</i> (2) Impiego sul terreno in assenza di coltura. Indicato per <i>Sclerotinia</i>
<b>Micosferella del cavolo</b> ( <i>Mycosphaerella brassicicola</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampie rotazioni; eliminare le piante ammalate. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli alta umidità e T 16-20°C.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Difenconazolo (3) Fluxapiroxad+Difenconazolo (3, 4)	3/20 14 21 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Registrato solo per cavolo cappuccio. Con Azoxystrobin al massimo 2 interventi all'anno (3) Con Difeconazolo max 2 interventi anno (4) No su cavolo di Bruxelles
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cruciferarum</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i>	5	
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas campestris</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> impiegare seme sano; ampie rotazioni colturali; concimazioni azotate equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta; evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente umidi; evitare di irrigare per aspersione, in particolare con acque ferme o poco pulite	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**CAVOLAIA TESTA (Cavoli cappucci, Cavoli verza, Cavoletti di Bruxelles)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta; <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa delle infestazioni.	<i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Lambdacialotrina (1) Deltametrina (1) Cipermetrina (1) Taufluvinalate (1) Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 5) Sulfoxaflor Spirotetramat (3) Acetamiprid (4)	7 nr 7c 7 3c 7c 7 3c 7c 3c 14	Max 2 interventi contro questa avversità, 3 per cicli oltre i 70 giorni (1) Con piretroidi ed Etofenprox massimo 2 interventi per ciclo. Max 3 per cicli oltre i 70 giorni. Max 2 anno fra Lambdacialotrina ed Etofenprox. Max 1 anno fra Cipermetrina e Zetacipermetrina (2) Solo su cavolo cappuccio. <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 1 intervento all'anno. Ammesso solo su cavoli di Bruxelles, verificare registrazione formulati (5) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo
<b>Altica</b> <i>Phyllotreta</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo su piante giovani ed in presenza di infestazioni diffuse	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 2) Etofenprox (1)	7 3c 7	(1) Vedi nota su piretroidi. No su cavolo di Bruxelles (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Nottue, Cavolaia</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Mamestra oleracea</i> , <i>Pieris brassicae</i> <i>Plutella xylostella</i> , <i>Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - trattare alla comparsa dei primi danni	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (1, 2) Deltametrina (3, 4) Lambdacialotrina (3) Cipermetrina (3) Zetacipermetrina (2, 3) Betaciflutrin (3, 8) Etofenprox (3) Metaflumizone (4) <i>Spinosad</i> (5) Spinetoram (5) Emamectina (6) Clorantraniliprole (7)	3 7 7 7 7c 3c 7 3c 7 3c 3 7c 3c 3c	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) Registrato solo per cavolo cappuccio. <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) Piretroidi ed Etofenprox, vedi nota sopra. Etofenprox no su cavolo di Bruxelles (4) Max 2 interventi all'anno (5) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (6) Max 2 interventi all'anno. Ammesso solo in pieno campo per <i>Pieris</i> , <i>Plutella</i> , <i>Spodoptera</i> (7) Max 2 interventi all'anno. Solo cappuccio e verza. Su Bruxelles è registrata la miscela con Lambdacialotrina (8) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo
<b>Elateridi</b> ( <i>Agriotes</i> spp.)	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni	Teflutrin (1, 2) Zetacipermetrina (1, 3) Lambdacialotrina (1, 2) Cipermetrina (1)	nr - c 7 nr - c nr	(1) Formulati granulari, massimo 1 intervento anno, localizzato; non rientra nel limite dei piretroidi. (2) No su Bruxelles (4) Solo cavolo cappuccio. <b>Revocato:</b> impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo

### CAVOLI A TESTA (Cavoli cappucci, Cavoli verza, Cavoletti di Bruxelles)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Mosca del cavolo</b> <i>Delia = Hylemya radicum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare le crucifere spontanee; - distruggere i residui delle colture di cavolo <b>Difesa chimica e soglia:</b> - controllare le ovideposizioni	Teflutrin (1)	nr - c	(1) Vedi nota sopra
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<i>Olio essenziale di arancio</i> Spinosad (1) Betaciflutrin (2, 3) Deltametrina (3)	3 3 3c	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021 (3) Nel limite dei piretroidi
<b>Aleurodidi</b> <i>Aleyrodes proletella</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza del 10% di piante infestate	<i>Maltoestrina</i> Deltametrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Cipermetrina (1) Betaciflutrin (1, 4) Spirotetramat (3) <i>Olio essenziale di arancio</i>	nr 7 7 3c 3c 3c 3	(1) Piretroidi, vedi note sopra (2) Solo su cavolo cappuccio. <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) Max 2 interventi all'anno (4) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo
<b>Cimici</b>		Etofenprox (1)	7	(1) Vedi nota su piretroidi. Non ammesso su cavolo di Bruxelles
<b>Tentredini</b> <i>(Athalia rosae)</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1)	7	(1) Piretroidi, vedi nota sopra.
<b>Limacce</b>	<b>Difesa chimica:</b> - trattare alla comparsa	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnellino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

### DISERBO CAVOLI A TESTA (Cavoli cappucci, Cavoli verza, Cavoletti di Bruxelles)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. (1) No su cavolo di Bruxelles
	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Napropamide (1)	100 nr	
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metazachlor (2)	nr	(2) Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva metazachlor in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento
	Dicotiledoni	Piridate (3) Clopiralid	42 nr	(3) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propaquizafop (4) Quizalofop-P-etile Quizalofop-P-etile isomero D (4) Ciclossidim (5)	30 30/60 60 28/42	(4) No su cavolo di Bruxelles (5) Carezza 28 su cappuccio e verza e 42 su cavolo di Bruxelles

## CAVOLI A FOGLIA

**Cavoli cinesi** (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, cavolo cinese/pe-tsai) – *Brassica rapa var. pekinensis*  
**Cavolo nero, a foglie increspate** (Cavolo nero, cavolo portoghese, cavolo riccio) – *Brassica oleracea var. acephala*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora brassicaceae</i> , <i>Peronospora parassitica</i> )	<b>Interventi agronomici</b> - effettuare ampie rotazioni - favorire il drenaggio del suolo - allontanare le piante e le foglie infette - distruggere i residui delle colture malate. - non adottare alte densità d'impianto	<i>Prodotti rameici</i> (1)	14/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo I prodotti rameici sono efficaci anche contro le Batteriosi
<b>Micosferella del cavolo</b> ( <i>Mycosphaerella brassicicola</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampie rotazioni; eliminare le piante ammalate. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e T 16-20°C.	Difenoconazolo (1)	14	(1) Con Difenoconazolo max 2 interventi anno
<b>Marciumi basali</b> ( <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phoma lingam</i> )	<b>Interventi agronomici</b> - arieggiare le serre e i tunnel - effettuare ampie rotazioni - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili; <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative.	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (2) <i>Trichoderma harzianum</i> (2) <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr nr 1	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura. Indicato per <i>Sclerotinia</i> (2) Indicati per <i>Rhizoctonia</i>
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cruciferarum</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i>	5	
<b>Ruggine bianca</b> <i>Albugo candida</i>		<i>Olio essenziale di arancio</i>	3	
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> ( <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta; <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa delle infestazioni.	<i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Deltametrina (1, 2) Betaciflutrin (1) Sulfoxaflor (3)	7 nr 7 7c 7c	(1) Con Piretroidi al massimo 2 interventi per ciclo. Betaciflutrin <b>revocato</b> . Impiego ammesso fino al 20/07/2021 (2) Solo su cavolo nero (3) Solo cavolo cinese c = solo pieno campo
<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<b>Olio essenziale di arancio</b> Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 2)	3 7 7c	(1) Con Piretroidi al massimo 2 interventi per ciclo. Deltametrina solo su cavolo nero (2) <b>Revocato</b> . Ammesso fino al 20/07/2021

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

### CAVOLI A FOGLIA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Altica</b> ( <i>Phyllotreta spp.</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo su piante giovani ed in presenza di infestazioni diffuse.	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 2)	7 7c	(1) Vedi nota piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Tentredini</b> ( <i>Athalia rosae</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 2)	7 7c	(1) Vedi nota piretroidi (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Nottue, Cavolaia</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Mamestra oleracea</i> , <i>Pieris brassicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - trattare alla comparsa dei primi danni	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (1) Deltametrina (2) Betaciflutrin (2, 5) Clorantraniprole (3) Spinetoram (4)	3 7 3 3/7 7c 3c 7c	(1) Al massimo 3 interventi all'anno. Ammesso solo su cavolo cinese (2) Vedi note piretroidi (3) Max 2 interventi anno, solo su cavolo nero (4) Massimo 2 interventi all'anno. (5) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Mosca del cavolo</b> <i>Delia= Hylemya radicum</i>	<b>Interventi agronomici</b> - eliminare le crucifere spontanee - distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno <b>Difesa chimica e soglia:</b> - controllare le ovideposizioni con specifiche trappole per le uova	Deltametrina (1) Lambdacialotrina (2)	7 nr	(1) Vedi nota piretroidi (2) Trattamento granulare localizzato sulla fila.
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus</i> , <i>Helicella</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

### CAVOLI A FOGLIA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Gliosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Gliosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	100	
	Graminacee e Dicotiledoni	Metazaclor (1)	nr	(1) Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto (1 kg si s.a.), sullo stesso appezzamento, ogni tre anni (vedi etichetta)
<b>Post trapianto</b>	Dicotiledoni	Clopiralid	nr	
	Graminacee	Ciclossidim	42	

## CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA - *Cucumis sativus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - favorire l'areggiamento - distruggere i residui delle colture precedenti infette - limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma <b>Difesa chimica:</b> - in serra di norma non sono necessari interventi chimici	<i>Prodotti rameici</i> (1) Cimoxanil (2) Famoxadone + Cimoxanil (2) Fosetil Al Propamocarb Fluopicolide (3) Ametotradina + Dimetomorf (4) Ametotradina (5) Pyraclostrobin + Dimetomorf (6) Metiram (7) Zoxamide (8) Cyazofamid (9)	3/20 3 10 3 3 3 1s 3 3 3 3	(1) Max 4 Kg etaro/anno di rame metallo (2) Famoxadone max 1 intervento anno, Cimoxanil max 3 (3) Max 1 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno. Massimo 4 interventi all'anno con Dimetomorf (5) Max 3 interventi anno con Ametotradina (6) Max 3 interventi all'anno. Vedi anche limitazioni per Dimetomorf e per Pyraclostrobin (QoI) (7) Max 3 interventi anno (8) Max 3 interventi anno (9) Max 2 interventi all'anno s = solo in serra
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fusca</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di varietà resistenti o tolleranti <b>Difesa biologica</b> Impiego di <i>Ampelomyces quisqualis</i> <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Cerevisane</i> <i>COS-OGA</i> IBE (A) (1) Azoxystrobin (2) Trifloxystrobin (2) Meptyldinocap (3) Ciflufenamid (4) Metrafenone (5) Bupirimate (6) Isopyrazam (7) Fluxapiroxad + Difenconazolo (8)	nr nr nr 5 3 1 0 nr 0 (A) 3 3 3 1 3	(1) Non effettuare più di 2 trattamenti all'anno con IBE. Max 1 intervento per IBE in grassetto, in alternativa tra loro.  (2) Con QoI - Azoxystrobin, Famoxadone, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin - max. 3 trattamenti all'anno, in alternativa tra loro  (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno  (7) Max 1 intervento, solo se non si usano Difenconazolo, Miclobutanil e Tebuconazolo.  (8) Max 2 interventi all'anno complessivi con SDHI – Isopyrazam, Fluxapiroxad, Penthiopirad, Fluopyram -.
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare ristagni idrici nel terreno	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D747 Propamocarb (1) Propamocarb + Fosetil (1)	nr nr 3 nr 3 nr	(1) Nelle prime fasi del ciclo

(A) IBE: Difenconazolo (7); Fenbuconazolo (7); Miclobutanil (3/7); Penconazolo (3); Tebuconazolo (3); Tetraconazolo (7)

## CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> -arieggiare le serre, limitare le bagnature	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxonil (1, 2) Pyrimethanil (2) Fenexamide (3) Penthiopirad (4) Fenpirazamina (3)	nr 0 nr 3s 3 3s 3 3 3	Massimo 2 trattamenti per ciclo (1) Max 1 intervento anno con prodotti contenenti Fludioxonil (2) Anilopirimidine – Cyprodinil, Pyrimethanil - max 2 interventi anno (3) Max 2 interventi anno, in alternativa tra loro (4) Max 1 intervento all'anno, nel limite SDHI
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arieggiare le serre	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma spp</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens D747</i> Penthiopirad (2)	nr nr nr 0 nr 3	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura (2) Max 1 intervento all'anno, nel limite SDHI
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> spp, <i>Pythium</i> spp, <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora</i> spp , <i>Fusarium</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Trichoderma</i> spp <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus amyloliquefaciens D747</i> Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3)	3 1 nr nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tachrymans</i> , <i>Erwinia car. sub. carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme controllato; ampi avvicindamenti (almeno 4 anni); eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; utilizzo di acque irrigue non contaminate, acque “ferme” o con residui organici.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIOSI</b>				
CMV Mosaico del cetriolo; ZYMV Mosaico giallo dello zucchino; WMV-2 virus 2 del mosaico del cocomero	Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente - CMV, ZYMV, WMV-2 - valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione. Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in sementali prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi			

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità



## CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp		Zetacipermetrina (1, 2) Cipermetrina (1)	3 nr	(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzato; non rientra nel limite dei piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021
<b>Afide delle cucurbitacee</b> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. <i>Chrysoperla carnea</i> è un predatore di afidi ed altre specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese. Con il parassitoide <i>Aphidius colemani</i> la distribuzione avviene in più lanci da 0,5-2 individui/mq. Altri: <i>Aphidius ervi</i> ; <i>Aphelinus abdominalis</i> ; <i>Praon volucre</i> ; <i>Ephedrus cerasicola</i> <b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza generalizzata. Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Maldetrina</i> Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Flonicamid (2) Deltametrina (3) Lambdacialotrina (3) Zetacipermetrina (3, 5) Spirotetramat (4) Flupyradifurone	1/3 3 3 nr 3 1 3 3 3 3 3 3	(1) Max 2 interventi anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. Max 1 anno fra Lambdacialotrina e Zetacipermetrina. (4) Max 2 interventi all'anno (5) <b>Revocata.</b> Formulazione spray impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Tripide americano</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre, con uno o più lanci, 1-2 predatori/mq, <i>Orius laevigatus</i> , - distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento aficida. Oppure introdurre <i>Amblyseius swirskii</i>	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) <i>Betaciflutrin</i> (2, 4) <i>Acrinatrina</i> (2, 3) Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	0 3 3 nr 3 3 3 3 - s nr - s 14 - s	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno (3) Trattare entro la pre-fioritura (4) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021 s = solo in serra
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra</i> , <i>Heliothis</i> <i>Udea</i> f., <i>Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> Presenza generalizzata	<i>Bacillus T.</i> Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1, 6) Indoxacarb (2) Clorantniliprole (3) Emamectina (4) Spinetoram (5)	3 3 3 3 3 3 3	(1) Piretroidi: vedi nota sopra (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Massimo 2 interventi, max 3 spinosine (6) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Miridi</b> <i>Lygus</i> sp	Mantenere pulito da infestanti le aree esterne. Utile la chiusura con reti anti insetto.			Alcuni prodotti effettuati per altre avversità sono efficaci anche su miridi.

**CETRIOLO IN CULTURA PROTETTA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Controllo biologico:</b> - eseguire 4 - 6 lanci settimanali di 4 - 6 pupari/mq. con <i>Encarsia formosa</i> fino ad una percentuale di parassitizzazione del 60-70% , sufficiente ad assicurare un buon controllo. Si possono effettuare anche lanci di <i>Eretmocerus mundus</i> , <i>E. Eremicus</i> , <i>Amblyseius swirskii</i> e <i>Macrolophus caliginosus</i> . <b>Difesa chimica:</b> - 20 adulti/trappola per settimana, rilevati con trappole cromotropiche (piatti gialli collati) per il monitoraggio (1 trappola ogni 100 mq)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Flonicamid (1) Pyriproxyfen (2) Acetamiprid (3) Sulfoxaflor Deltametrina (4) Betaciflutrin (4, 7) Spiromesifen (5) Spirotetramat (6) <i>Olio essenziale di arancio</i> Flupyradifurone Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3 nr 1/3 3 0 3 3 3 7c/3s 1 3 3 3s 3 3 3 nr - s 14 - s	(1) Max 2 interventi all' anno (2) Max 2 interventi all' anno (3) Max 2 interventi all' anno (4) Con piretroidi max. 2 interventi all' anno (5) Max 2 interventi all' anno (6) Max 2 interventi all' anno (7) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, in relazione al livello d'infestazione, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate. Si consigliano interventi localizzati sui focolai.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> Abamectina (1) Bifenazate Etiptiazox Fenpiroximate Pyridaben Spiromesifen Tebufenpirad Clofentezine (2) Terpenoid blend QRD 460	0 nr 3 3 3 14 3 3s 3 nr s	Al massimo 2 interventi all' anno contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) No in serra da novembre a febbraio (2) Max 1 intervento all' anno
<b>Cimici</b>	Non ci sono prodotti con specifica registrazione. Utilizzo di reti protettive.			
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni con specie poco sensibili; evitare ristagni idrici - utilizzo di ammendanti e/opannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> - solarizzazione del terreno <b>Difesa chimica:</b> accertata presenza e danni negli anni precedenti: presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> <i>Azadiractina</i> Fenamifos (1) Oxamil (2) Fluopyram (3) Abamectina	nr nr 3 60s 50s 1s 0s	(1) Solo per irrigazione a goccia. In alternativa a Dazomet, Metam e Oxamil. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 23/09/2021 (2) Per irrigazione localizzata. In alternativa al Fenamifos. (3) Nel limite dei 2 SDHI

## CETRIOLINO DA INDUSTRIA (PIENO CAMPO) - *Cucumis sativus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - favorire l'arteggiamento - distruggere i residui delle colture precedenti infette - limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma	<i>Prodotti rameici</i> * Fosetil Al Cimoxanil Azoxystrobin (1) Fluopicolide (2) Ametoctradina + Dimetomorf (3) Ametoctradina (3) Pyraclostrobin + Dimetomorf (4) Metiram (5) Metalaxil-M + rame (6) Zoxamide (7) Zoxamide + Dimetomorf (3, 7)	3/20 3 3 3 3 3 1 3 3 14 3 3	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin) massimo 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno. Massimo 3 interventi all'anno con Dimetomorf. Max 3 interventi anno con Ametoctradina. (4) Max 3 interventi all'anno. Vedi anche limitazioni per Dimetomorf e per i QoI. (5) Max 3 interventi all'anno con ditioicarbammati (6) Max 3 interventi anno (7) Max 3 interventi anno con Zoxamide
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fusca</i>	<b>Controllo biologico:</b> interventi con <i>Ampelomyces quisqualis</i> <b>Interventi agronomici</b> - impiego di varietà resistenti o tolleranti <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo MI <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Zolfo</i> <b>COS-OGA</b> IBE (A) (1) Fluxapiroxad + Difenoconazolo Bupirimate (5) Azoxystrobin (2) Trifloxystrobin (2) Meptyldinocap (3) Metrafenone (4) Isopyrazam (5) <i>Trichoderma harzianum</i>	nr 0 nr 1 3 5 <b>0</b> (A) 3 1 3 3 3 3 1	(1) Con IBE massimo 2 interventi all'anno. Max 1 intervento anno con IBE in grassetto, in alternativa tra loro e con Isopyrazam (2) Con QoI massimo 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 1 intervento all'anno, in alternativa a Difenoconazolo, Tebuconazolo.
<b>Tracheofusariosi</b> <i>Fusarium oxysporium</i>	Non sono autorizzati interventi specifici		nr	

(A) IBE: **Difenoconazolo (7); Penconazolo (3); Tebuconazolo (3); Tetraconazolo (7); Fenbuconazolo (7);**

### CETRIOLINO DA INDUSTRIA (PIENO CAMPO)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afide delle cucurbitacee</b> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - si consiglia di intervenire in maniera localizzata sui primi focolai	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Maltodestrina</i> Tauflualinate (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 3) Sulfoxaflor Flupyradifurone	0 1/3 nr 10 3 3 3 3 1 3	(1) Con piretroidi max 2 trattamenti all'anno. Fra Lambdacialotrina e Zetacipermetrina max 1 trattamento anno (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i>		<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) <i>Betaciflutrin</i> (2) <i>Acrinatrina + Abamectina</i> (2, 3)	0 3 3 3 3 3 -	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 (3) Massimo 1 intervento all'anno. Trattare entro la pre-fioritura
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Soglia:</b> presenza di focolai d'infestazione con foglie decolorate <b>Difesa chimica:</b> interventi localizzati	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Abamectina (1) Acrinatrina + Abamectina (2) Clofentezine (3)	nr 0 3 - 3	Al massimo 2 interventi anno contro il ragnetto; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) No in serra da novembre a febbraio (2) Massimo 1 intervento all'anno, prima della fioritura. (3) Massimo 1 intervento all'anno
<b>Cimici</b>	Non ci sono prodotti con specifica registrazione			
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis</i> spp		<i>Beauveria bassiana</i> Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Teflutrin (1) Cipermetrina (1)	nr 3 nr - c nr - c nr	(1) Formulati granulari, ammesso 1 intervento anno, in alternativa tra loro. L'intervento geodisinfestante non rientra nel limite dei piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

### CETRIOLINO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato - in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

## CICORIA

### Cicoria pan di zucchero, Catalogna - *Cichorium intybus* var. *foliosum*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria porri</i>	<b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Difenoconazolo	3/20 21	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 1 intervento anno da solo.
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - ampie rotazioni - ampi sestri di impianto maggiori - uso di varietà resistenti <b>Difesa chimica:</b> - programmare i trattamenti in funzione delle condizioni climatiche favorevoli alla malattia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisane</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Metalaxil-M + Rame (3) Fosetil-AI Mandipropamide (4) Dimetomorf (4)	nr nr - s 3/20 7 10/15 14 7 7	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 2 interventi all'anno (3) Al massimo 2 interventi per ciclo, 3 all'anno (4) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf - max 3 interventi all'anno
<b>Cercospora</b> <i>Cercospora longissima</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici</b> - limitare le irrigazioni; ricorrere alla solarizzazione; effettuare pacciamature <b>Difesa chimica:</b> - durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Coniothyrium niticans</i> (1, 2) <i>Trichoderma</i> spp <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trich. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> (2) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Cyprodinil + Fludioxinil (3) Boscalid + Pyraclostrobin (4) Azoxystrobin (5) Fenexamid (6) Difenoconazolo + Fluxapiroxad (7)	nr nr nr 3 nr nr 0 14 21c 7 3 14	Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo culturale. Max 3 interventi nel periodo autunno invernale con s.a. di sintesi. (1) Impiego sul terreno in assenza di coltura. (2) Indicati per <i>Sclerotinia</i> (3) Al massimo 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento all'anno. (5) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi anno (7) Nel limite di 2 interventi complessivi tra la miscela e il Difenoconazolo da solo c = solo pieno campo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Interventi agronomici</b> sesti d'impianto ampi <b>Difesa chimica:</b> comparsa primi sintomi	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1) Difenoconazolo (2)	5 7 21	(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al max 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Max 1 intervento anno da solo.
<b>Pithium</b> <i>Pythium tracheiphilum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni; - irrigazioni equilibrate	<i>Trichoderma</i> spp Propamocarb + Fosetil AI (1)	nr/3 nr	(1) Ammesso in semenzaio e contenitori alveolati
<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> . <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici</b> - ampie rotazioni (4 anni); concimazione azotate equilibrate; non utilizzare acque "ferme" o contenenti residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)

AVVERSITA' FITOFAGI	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Affidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Taufluvalinate (1) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 3) Spirotetramat (2)	1 0 3/7 nr 14c 7 14 7	(1) Con piretroidi max 2 interventi per ciclo. Con Lambdacialotrina max 1 all'anno. Zetacipermetrina max 1 all'anno. Etofenprox 1 all'anno. (2) Max 2 interventi all'anno. (3) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Triptidi</b> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) Acrinatrina (2) Abamectina (3) Etofenprox (4) Terpenoid blend QRD 460	0 3 14c 7c 7 nr s	(1) Max. 3 interventi all'anno. (2) Vedi nota sopra – piretroidi (3) Max 1 intervento per ciclo, 3 anno (4) Vedi nota sotto. Etofenprox max 2 all'anno
<b>Noftue fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera litoralis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza accertata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Etofenprox (1) Deltametrina (1) Taufluvalinate (1) <i>Spinosad</i> (2) Indoxacarb (3) Emamectina (4) Clorantropilprole (5) Tebufenozide (6)	3 3/7 7 3/7 14c 3 3 3c 3 14c	(1) Vedi nota Piretroidi (2) Max 3 interventi all'anno. (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno. (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 1 intervento all'anno  c = solo pieno campo
<b>Noftue terricole</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - presenza accertata	Deltametrina (1) Zetacipermetrina (1, 2)	3/7 14	(1) Vedi nota Piretroidi. (2) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - accertata presenza	Taufluvalinate (1) Etofenprox (1)	14c 7	(1) Vedi nota Piretroidi. Etofenprox max 1 all'anno

### CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Liriomyza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>	<b>Indicazioni agronomiche</b> - utilizzare trappole cromotropiche, valide in serra	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Abamectina</i> (2)	3/7 3 7c	Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità (1) Al massimo 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo.
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp		<i>Lambdacialotrina</i> (1) <i>Teflutrin</i> (1)	nr - c nr - c	Max 1 intervento anno su elateridi (1) Localizzato; non entra nel limite dei piretroidi. c = solo pieno campo
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	<i>Metaldeide</i> esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

### DISERBO DELLA CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b> <b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.  <b>(1) Solo pieno campo</b>
		<i>Benfluralin</i> (1) Propizamide Pendimetalin	nr nr nr	
<b>Pre emergenza</b>				
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim	21	Per migliorare l'azione miscelare con bagnante
		Quizalofop-P-etile (1)	15	(1) Verificare registrazione F.C.

## CIPOLLA – *Allium cepa*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora schleideni</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - destinare alla riproduzione solamente bulbi sani; raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da peronospora; accurato drenaggio del terreno; uso limitato dei fertilizzanti azotati; ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili <b>Difesa chimica:</b> i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoclimatiche risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa). E' importante l'uso di idoneo bagnante adesivante.	<i>Prodotti rameici</i> * Benalaxil (1, 9) Metalaxil-M (1) Azoxystrobin (2) Pyraclostrobin+Dimetomorf (2, 3) Fluopicolide + Propamocarb (4) Mancozeb (5) Metiram (6) Valifenalate (3) + Mancozeb Zoxamide (7) Zoxamide + Dimetomorf (3, 7) Cimoxanil (8)	3/20 28 20 7/14 14 7c 28 7 28 14 14 10	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Con fenilammidi max 3 interventi anno (2) Con strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin) max 3 interventi anno (3) Con CAA (Dimetomorf, Valiphenal) max 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento anno. (5) Max 3 interventi anno. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022 (6) Max 3 interventi anno (7) Max 3 interventi anno (8) Max 3 interventi anno (9) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 5/10/2021
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire, contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei primi sintomi	Ciprodinil + Fludioxinil Pyrimethanil Boscalid + Pyraclostrobin (1) Fenexamide Boscalid + Pyraclostrobin (1)	7 14 14 7c 14c	Contro questa avversità max. 2 trattamenti l'anno (1) Vedi limite strobilurine. Max 2 anno c = solo pieno campo (1) Vedi limite strobilurine. Max 2 anno.
<b>Ruggine</b> <i>Puccinia</i> sp		<i>Trichoderma harzianum</i>	nr	
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium oxysporum f.sp. cepae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di semi e bulbi sani; per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione immagazzinare i bulbi bene asciutti			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosche dei bulbi</b> <i>Delia antiqua</i> , <i>Delia</i> = <i>Hylemya platura</i>	<b>Difesa chimica:</b> Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire tempestivamente dopo aver accertato la presenza dei primi danni	<i>Azadiractina</i> Deltametrina (1) Cipermetrina (1) Etofenprox (1)	3 7 3c 14	(1) Max 3 interventi anno con Piretroidi. Verificare registrazione FC per la mosca. Max 1 anno con Cipermetrina. Max 1 anno con Etofenprox.
<b>Tripide</b> <i>Thrips tabaci</i>	<b>Soglia:</b> intervenire alla presenza	<i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Formetanato (2) Spirotetramat (3) Acrinatrina (4)	3 3 3 28c 7c 3	Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità (1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento anno. Verificare registrazione formulato commerciale (3) Max 2 interventi anno (4) Max 3 interventi anno con Piretroidi



## CIPOLLA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> per la semina utilizzare <b>bulbi esenti da nematodi</b> ; rotazioni quinquennali <u>con piante non ospiti</u> del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)			
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp	<b>Soglia:</b> accertata presenza mediante specifici monitoraggi	Cipermetrina	nr	Formulazioni granulari Al massimo 1 intervento anno
<b>Mosca dei bulbi</b> <i>Delia antiqua</i>		Cipermetrina	nr	Formulazioni granulari Al massimo 1 intervento anno
<b>Mosca minatrice</b> <i>Napomyza gymnotoma</i>	<b>Difesa chimica:</b> le sostanze attive contro i tripidi e le mosche controllano anche le infestazioni di questo agromizide. Intervenire contro gli adulti			
<b>Afidi</b> <i>Myzus ascalonicus</i>	<b>Soglia:</b> presenza diffusa su giovani impianti	<i>Maldosetrina</i> Betaciflutrin (1)	nr 21	(1) Piretroidi (vedi nota sopra). <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Notturne</b> <i>Agrotis</i> spp. <i>Spodoptera exigua</i>	<b>Soglia:</b> infestazione larvale diffusa a pieno campo	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 3) Etofenprox (1) Cipermetrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (2)	7 21 14 3c 3c 3	(1) Max 3 interventi anno con Piretroidi ed Etofenprox. Max 1 anno con Cipermetrina. Max 1 anno con Etofenprox. Max 1 con Lambdacialotrina (2) Max 3 interventi all'anno (3) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**CIPOLLA TIPOLOGIA BORETTANA E MAGGIOLINA (CIPOLLA DA INDUSTRIA) - *Allium cepa***

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora schleideni</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da peronospora; accurato drenaggio del terreno; uso limitato dei fertilizzanti azotati; ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili <b>Difesa chimica:</b> i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termigrometriche risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa). E' importante l'uso di idoneo bagnante adesivante.	<i>Prodotti rameici</i> * Benalaxil (1, 8) Metalaxil-M (1) Azoxystrobin (2) Pyraclostrobin (3) Fluopicolide + Propamocarb (4) Mancozeb (5) Metiram (5) Valiphenal (3) + Mancozeb (5) Zoxamide (6) Zoxamide + Dimetomorf (3, 6) Cimoxanil (7)	3/20 28 20 7/14 14 7 28 7 28 14 14 10	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Con fenilammidi max 2 interventi anno (2) Con strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin) max 3 interventi anno (3) Con CAA (Dimetomorf, Valiphenal) max 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento anno. No in serra (5) Con ditiocarbammati massimo 4 interventi anno. <b>Mancozeb revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022 (6) Max 3 interventi anno (7) Max 3 interventi anno <b>(8) Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 5/10/2021
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis squamosa,</i> <i>Botrytis allii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire, contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei primi sintomi	Ciprodinil + Fludioxinil Pyrimethanil Boscalid + Pyraclostrobin (1) Fenexamide	7 14 14 7	Contro questa avversità max. 3 trattamenti l'anno (1) Vedi limite strobilurine
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotricum circin.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> rotazione			
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> rotazione con colture non recettive	<i>Trichoderma asperellum</i>	nr	
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium oxysporum</i> <i>f.sp. cepae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di semi e bulbi sicuramente sani - per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione immagazzinare i bulbi bene asciutti	<i>Trichoderma harzianum</i>	nr	
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosche dei bulbi</b> <i>Delia antiqua,</i> <i>Delia = Hylemya platura</i>	<b>Difesa chimica:</b> Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire tempestivamente dopo aver accertato la presenza dei primi danni	<i>Azadiractina</i> Deltametrina (1)	3 7	(1) Max 2 interventi anno con Piretroidi. Verificare la registrazione dei formulati per la mosca.
<b>Tripide</b> <i>Thrips tabaci</i>	<b>Soglia:</b> intervenire alla presenza	<i>Azadiractina</i> <b>Olio essenziale di arancio</b> <i>Spinosad</i> (1) Formetanato (2) Spirotetramat (3) Acrinatrina (4)	3 <b>3</b> 3 28c 7c 3	Massimo 3 interventi all'anno contro l'avversità (1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento anno. Verificare registrazione formulato commerciale (3) Max 2 interventi anno. (4) Max 2 interventi anno con Piretroidi .

## CIPOLLA DA INDUSTRIA

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> rotazioni quinquennali con piante non ospiti del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)			
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp	<b>Soglia :</b> accertata presenza mediante specifici monitoraggi	Cipermetrina	nr	Solo formulazioni granulari. Massimo 1 intervento anno
<b>Afici</b> <i>Myzus ascalonicus</i>	<b>Soglia:</b> presenza diffusa su giovani impianti	<i>Maltodestrina</i>	nr	
<b>Nottue</b> <i>Agrotis</i> spp. <i>Spodoptera exigua</i>	<b>Soglia:</b> infestazione larvale diffusa a pieno campo	Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1) Etofenprox (1) <i>Spinosad</i> (2)	7 3c 3c 3c 3	(1) Con Piretroidi max 2 interventi all'anno. Con Lambdacialotrina max 1 intervento anno. Cipermetrina max 1 all'anno. Etofenprox max 1 all'anno (2) Max 3 interventi all'anno c = solo pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## CIPOLLA E DELLA CIPOLLA DA INDUSTRIA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni da seme	Pendimetalin (1)	75	(1) Attenzione alla ridotta selettività su terreni scolti
	Dicotiledoni Annuali	Bromoxynil	30	Interventi con microdosi. Max 2,25 kg/ha/anno
	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin Aclonifen	75 nr	
	Dicotiledoni Perennanti	Clopiralid	nr	da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera
	Dicotiledoni	Piridate	21	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
<b>Post emergenza</b>		Ciclossidim (2) Proprazafop Quizalofop-P-etile Quizalofop etile isomero D (3) Cletodim	28/42 30 30 60 56	(2) Tempo di carenza diverso a seconda della tipologia produttiva (3) Verificare autorizzazione dei formulati commerciali Per migliorare l'azione dei graminicidi, miscelare con bagnante

## COCOMERO – *Citrullus lanatus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante  <b>Difesa chimica:</b> - interventi si effettuano solo in casi eccezionali	<i>Prodotti rameici</i> * Fosetil Al Propamocarb Metalaxil-M (1) Azoxystrobin (2) Cyazofamid (3) Fluopicolide + Propamocarb (4) Ametoctradina (5) Metiram (6) Zoxamide Cimoxanil (8) Mandipropamide (9)	3/20 3 20 20 3 3 7 1c 3 3 3 3	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Max 2 interventi all'anno. (2) Con QoI (Azoxystrobin e Trifloxystrobin) massimo 2 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento all'anno (5) Max 3 interventi all'anno. (6) Max 3 interventi anno. Solo pieno campo (7) Max 4 interventi anno (8) Max 2 interventi anno (9) Max 3 interventi anno c = solo pieno campo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	<b>Difesa chimica:</b> - si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi, successivi trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili in relazione all'andamento stagionale e alla persistenza dei s.a. utilizzate	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bicarbonato di Potassio</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus anyloliquefaciens</i> <i>Cerevisiane</i> <i>Zolfo</i> <i>COS-OGA</i> Azoxystrobin (1) Trifloxystrobin (1) IBE (A) (2) Bupirimate (3) Meptyldinocap (4) Ciflufenamid (5) Metrafenone (6)	nr nr nr nr - s nr - c 5 0 3 3 - 1 3 1 1 3	(1) Con QoI (vedi sopra) max. 2 interventi all'anno (2) Con IBE max. 2 interventi all'anno. Con IBE in grassetto (A), massimo 1 intervento all'anno, in alternativa tra loro (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno
<b>Cancro gommoso</b> <i>Didymella bryoniae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia <b>Difesa chimica:</b> intervenire tempestivamente in caso di presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Fluxapiraxad + Difenocanazolo (3)	3/20 3 3	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con QoI (vedi sopra) max. 2 interventi all'anno (3) Massimo 1 intervento nel limite dei 2 IBE
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pithium</i>		Propamocarb + Foseetil (1) <i>Pythium oligandrum</i>	0	(1) Trattamento ai semenzai
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arieggiamento delle serre; adottare opportune tecniche irrigue e limitare le irrigazioni; eliminazione della vegetazione infetta.	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asp.</i> + <i>T. gamsii</i>	0 nr nr nr 3	

(A) IBE autorizzati: Fenbuconazolo (t.c. 7 gg); **Miclobutanil (3c)**; Penconazolo (3); Tetraconazolo (7); **Tebuconazolo (7)**; **Difenocanazolo**

## COCOMERO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseud. syringae pv. lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; - è sconsigliato irrigare con acque "ferme"	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV, ZYMV, WMV-2	Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente del mosaico giallo dello zucchini ZYMV, virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi. Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. Con <i>Chrysoperla carnea</i> distribuire 10-20 larve/mq, anche in più riprese. Con il parassitoide <i>Aphidius colemani</i> la distribuzione avviene in più lanci da 0,5-2 individui/mq. Altri: <i>Aphidius ervi</i> ; <i>Aphelinus abdominalis</i> ; <i>Praon volucre</i> ; <i>Ephedrus cerasicola</i> <b>Difesa chimica:</b> - trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati, oppure quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltoestrina</i> Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Flonicamid (2) Spirotetramat (3) Deltametrina (4) Flupyradifurone	3 0 3s nr 14 1 3 3 3 3	(1) Max 1 intervento l'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno; solo pieno campo (4) Con piretroidi max 1 intervento anno e solo pieno campo
<b>Nottue fogliari</b> <i>Mamestra</i> , <i>Heliothis</i> , <i>Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza generalizzata	<i>Bacillus T.</i> Lambdacialotrina (1) Indoxacarb (2) Clorantraniliprole (3) Emamectina (4) Spinetoram (5)	3 3 3 3 3 3	(1) Con piretroidi max 1 intervento anno e solo pieno campo (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Massimo 2 interventi anno.
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - uno o più lanci, in relazione al livello d'infestazione, con 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate	<i>Sali potassici acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> Maltodestrina Abamectina (1) Ectiazox Etoxazole Spiromesifen Bifenazate Tebufenpirad Terpenoid blend QRD 460	0 nr nr 3 3 3 3s 3 3s nr s	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) No in serra da novembre a febbraio. s = solo in serra

## COCOMERO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza accertata	<i>Beauveria bassiana</i> Teflutrin (1) Lambdacialotrina (1)	nr nr - c nr - c	(1) Da impiegarsi localizzati alla semina o al trapianto, in alternativa tra loro. c = solo pieno campo
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	Possono essere dannosi nei terreni prevalentemente sabbiosi <b>Interventi agronomici</b> - effettuare rotazioni con specie poco sensibili; - utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> - solarizzare il terreno con telo P.E. trasparente di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio - agosto per almeno 50 giorni. <b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> Oxamil (1) Fluopyram (2) Abamectina (3)	nr nr 50s 1s 0s	(1) Intervento localizzato tramite impianto di irrigazione con coltura in atto e formulati liquidi. Massimo 30 litri di formulato commerciale per ciclo. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Con irrigazione a goccia o con manichetta s = solo in serra
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Pythium spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Phytophthora spp</i> <i>Fusarium spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr nr 3 1 nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## COCOMERO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Propaquizafop	65	

## DOLCETTA O VALERIANELLA *Valerianella locusta*

AVVERSAITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture ammalate; favorire il drenaggio del suolo; aereare serre e tunnel; uso di varietà resistenti <b>Difesa chimica:</b> I trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia; di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge ripetute.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisane</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) Fosetil AI Azoxystrobin (3) Dimetomorf + rame (4) Dimetomorf (4) Mandipropamide (4) Ametoctradina (5)	nr nr - s 20 10 14 7 7 7 7c	(1) Max 4 kg rame metallo ettaro/anno. (2) Metalaxil-M max 2 interventi per ciclo, 3 all'anno (3) Con QoI (Pyraclostrobin, Azoxistrobin) max 3 interventi all'anno (4) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 2 interventi per ciclo, max 4 all'anno. (5) Max 2 interventi all'anno c = solo pieno campo
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano; allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Phoma</b> <i>Phoma valerianella</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare semente certificata			
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia</i> <i>Sclerotium</i> <i>Sclerotinia minor</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiare le serre; limitare le irrigazioni; evitare ristagni idrici; eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili ed evitare di lesionare le piante; avvicendamenti culturali con specie poco suscettibili; ricorrere alla solarizzazione <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxonil (1) Fenexamide (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Azoxystrobin (3) Penthiopirad (4) Fluxapiraxad + Difenocozololo (5)	nr 3 nr nr nr 0 7 7 3 14 7 7c 14	(1) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento per ciclo, e max 2 interventi all'anno. Con QoI (Pyraclostrobin, Azoxistrobin) max 3 interventi all'anno. (4) Max 1 intervento all'anno. Max 3 all'anno con SDHI – Boscalid, Penthiopirad, Fluxapiraxad - (5) Max 1 intervento anno. c = solo pieno campo
<b>Rizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma</i> spp <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr/3 1	
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo alla comparsa dei sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Azoxystrobin (1)	5 3 7	(1) Con QoI (Pyraclostrobin, Azoxistrobin) max 3 interventi all'anno.

**DOLCETTA O VALERIANELLA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr nr 3	
<b>Fusarium</b> <i>Fusarium oxysporum</i>	Utilizzo di sementi selezionate			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Vedi Sclerotinia <b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Fludioxinil (1) Cyprodinil + Fludioxinil (1) Fenexamid (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Penthiopirad (4)	0 nr 7 7 3 14 7c	(1) Con Fludioxinil max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Vedi nota sopra (4) Max 1 intervento all'anno, nel limite dei 3 SDHI c = solo pieno campo
<b>BATTERIOSI</b> <i>Acidovorax</i> <i>valerianelle</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta, che non va interrata; è sconsigliato irrigare con acque "ferme", con residui organici; non irrigare per aspersione	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> <i>Acyrtosiphon lactucae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Maltodestrina</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (3) Spirotetramat (4)	0 1 nr 3/7 14 10c/5s 7	Max 3 interventi per ciclo contro questa avversità. (1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi ed Etofenprox. Max 2 anno con Etofenprox. Max 2 anno con Lambdacialotrina. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. (3) T.c. 3 gg coltura protette e 7 gg pieno campo. Max 1 intervento per ciclo, 2 all'anno (4) Max 2 interventi all'anno



**DOLCETTA O VALERIANELLA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b> <b>Noctue fogliari</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus t. kurstaki</i> Etofenprox (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4) Metossifenozide (5) Metaflumizone (6)	nr 3 7 3/7 14 3 3 3 3 3c 3	(1) Vedi nota piretroidi. (2) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 1 intervento all'anno. (6) Max 2 interventi all'anno c = solo pieno campo
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza</i> spp.	<b>Controllo biologico:</b> almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, con <i>Dygliphus isaea</i> <b>Difesa chimica:</b> - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Spinosad</i> (1) Abamectina (2) Deltametrina (3)	3 7c/14s 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo, 3 per anno. Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra novembre e febbraio. (3) Vedi nota piretroidi.
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>	<b>Interventi meccanici:</b> - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli aleurodidi; esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti <b>Interventi fisici:</b> utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti <b>Difesa chimica:</b> presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Terpenoid blend QRD 460	0 nr nr - s	s = solo in serra
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire in caso di presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Abamectina (4) Acrinatrina (1) Terpenoid blend QRD 460	0 3/7 14 3 3 7c/14s 14c nr - s	(1) Vedi nota piretroidi (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 all'anno (3) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (4) Max 1 intervento per ciclo, 3 per anno. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale.

## DOLCETTA O VALERIANELLA

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi biologici:</b> lanci con <i>Phytoseiulus persimilis</i>	Terpenoid blend QRD 460	sr s	
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus a.</i> , <i>Helicella v.</i> , <i>Limax spp.</i> <i>Agriolimax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnellino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di presenza accertata nella coltura precedente	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio

## DOLCETTA O VALERIANELLA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico Propizamide	nr nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminato sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e dicotiledoni	Benfluralin (1) Propizamide	nr nr	(1) Solo pieno campo
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim	21	

## ERBE AROMATICHE o ERBE FRESCHE

**Salvia** - *Salvia officinalis*; **Rosmarino** - *Rosmarinus officinalis*; **Alloro** - *Laurus nobilis*; **Cerfoglio** - *Anthriscus cerefolium*; **Timo** - *Thymus spp.*;  
**Erba cipollina** - *Allium schoenoprasum*; **Dragoncello** - *Artemisia dracunculus*; **Coriandolo** *Coriandrum sativum*; **Aneto** - *Anethum graveolens*; altre

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora</i> spp. <i>Bremia</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminazione dei residui colturali; effettuare ampie rotazioni; non adottare alte densità di impianto; corretta sistemazione del terreno; aerazione degli ambienti protetti; corretta gestione dell'irrigazione.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Azoxystrobin</i> (2) <i>Metalaxil-M</i> (3) <i>Mandipropamide</i> (4) <i>Dimetomorf</i> (4) <i>Ametotradina</i> (5) <i>Fluopicolide+ Propamocarb</i> (6) <i>Bacillus amyloliquifaciens</i>	3/20 7 15 7 7 7c 7 / 14 nr - s	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con strobilurine ( <i>Azoxystrobin</i> e <i>Pyraclostrobin</i> ) max 2 interventi per ciclo, max 4 all'anno (3) Max 2 interventi per ciclo (4) Con CAA – <i>Mandipropamide</i> , <i>Dimetomorf</i> - max 4 interventi all'anno (5) Max 2 interventi anno, solo <i>salvia</i> (6) Max 1 interventi anno. T.C. 7 gg pc; 14 serra.
<b>Marciumi basali</b> <i>Sclerotinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> Intervenire durante le prime fasi vegetative. Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.	<i>Coniothyrium minutans</i> <i>Trichoderma</i> sp <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> M1 (1) <i>Pyraclostrobin</i> (2)+ <i>Boscalid</i> <i>Fenexamid</i> (3) <i>Fludioxonil</i> + <i>Ciprodinil</i> (4)	nr 3 nr - s 0 14 3 7	(1) Non autorizzato su coriandolo e aneto (2) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo colturale. Con questa miscela max 2 interventi all'anno (3) Max 2 all'anno (4) Con <i>Fludioxonil</i> massimo 2 all'anno
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.		<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> D747	3 nr - s	
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Fenexamid</i> (1) <i>Fludioxonil</i> (2) <i>Fludioxonil</i> + <i>Ciprodinil</i> (2)	0 nr 3 7 7	(1) Max 2 interventi anno (2) Con <i>Fludioxonil</i> max 2 interventi anno
<b>Rhizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	Prevenzione agronomica, rotazione, substrati e materiale di moltiplicazione sano	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> D747	nr 1 nr - s	
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> in funzione dell'andamento climatico. Trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> (1)	5 1	(1) <b>Coriandolo, aneto, cumino, angelica</b>
<b>Ruggine</b> <i>Puccinia cichorii</i> , <i>Puccinia</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> eliminazione dei residui colturali infetti.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria porri</i> f.sp. <i>cichorii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico	<b>Bicarbonato di potassio</b> (1) <i>Prodotti rameici</i> (2) <i>Metalaxil-M</i> + <i>Rame</i> (3)	1 3/20 20	(1) <b>Coriandolo, aneto, cumino, angelica</b> (2) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (3) Al massimo 2 interventi per ciclo. Ammesso solo in coltura protetta

**ERBE AROMATICHE (o ERBE FRESCHE)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa delle prime infestazioni	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Deltametrina (1)</i> <i>Acetamiprid (2)</i>	1 0 nr 3c 10c/5s	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all'anno
<b>Notte e altri lepidotteri</b> <i>Spodoptera spp.</i> <i>Mamestra brassicae</i> <i>Phalonia contractana</i> <i>Autographa gamma</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa delle prime infestazioni	<i>Bacillus thuringensis</i> <i>Spinosad (1)</i> <i>Spinetoram (1)</i> <i>Deltametrina (2)</i> <i>Metossifenoziide (3)</i> <i>Clorantprilprole (4)</i>	3 3 3 3c 3c 3	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Max 1 intervento all'anno. (3) Max 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti <b>Controllo biologico</b> Installare trappole cromotropiche gialle - Alle prime catture di <i>T. vaporariorum</i> effettuare lanci con 12-20 pupari mq di <i>Encarsia formosa</i> ripartiti in 4 lanci settimanali - Alle prime catture di <i>Bemisia tabaci</i> effettuare: lanci 1 individuo/mq di <i>Macrolophus caliginosus</i> ripartiti in 2-3 lanci settimanali. In caso di utilizzo di <i>Eretmocerus mundus</i> : effettuare i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Terpenoid blend QRD 460	0 nr nr s	
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**ERBE AROMATICHE o ERBE FRESCHE - DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Preemergenza Pretrapianto</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Piridate	42	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti.
	Graminacee	Ciclossidim	28	

## FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO – *Phaseolus vulgaris*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Patogeni tellurici</b> <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Sclerotinia</i>	Si consiglia di impiegare seme conciato	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> (2) <i>Trichoderma asperellum</i> (2) <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ Cyprodinil + Fludioxonil (3) Flutolanil	nr 3  nr 1 14c 3	(1) Indicato per Sclerotinia (2) Indicati solo su Rhizoctonia (3) Autorizzato su sclerotinia, solo pieno campo. Max 2 interventi anno
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	<b>Interventi agronomici</b> : ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato; ricorso a varietà resistenti o poco sensibili; ampie rotazioni colturali; distruzione dei residui colturali <b>Difesa chimica:</b> - 2 - 3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)	<i>Prodotti rameici</i> (1) Cyprodinil + Fludioxonil (2)	3/20 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi anno  c = solo pieno campo
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces appendiculatus</i>	<b>Difesa chimica:</b> condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e temperature da 20° a 24°C)	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Zolfo</i> Azoxystrobin (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3)	3/20 5 7/14 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Difesa chimica:</b> - interventi da effettuarsi in caso di persistente umidità e piogge frequenti	<i>Pythium oligandrum</i> ceppo MI <i>Prodotti rameici</i> (1) Pyrimethanil Fenexamid Boscalid + Pyraclostrobin (2) Cyprodinil + Fludioxonil (3) Fludioxonil (3)	0 3/20 14s 7s 7c 14c 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo Al massimo 2 trattamenti per ciclo con prodotti di sintesi contro questa avversità. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Con Fludioxonil max 2 interventi anno  s = solo in serra
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i> <i>pv. phaseolicola</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> <i>pv. phaseoli</i>	<b>Interventi agronomici:</b> impiego di seme controllato; uso di varietà tolleranti; ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); è sconsigliato irrigare con acque "ferme" o contenenti residui organici; concimazioni azotate e potassiche equilibrate <b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV, BYMV, BCMV	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, va utilizzato seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti			

## FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i>	Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virus <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa delle prime colonie in accrescimento	<i>Piretine pure</i> <i>Maltodestrina</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 4) <b>Tafluvalinato (1)</b> Betaciflutrin (1, 5) Acetamiprid (2) Spirotetramat (3)	4 nr 3 3c 3 <b>7c</b> 7c 14 7s	Max 2 interventi per ciclo contro questa avversità (1) Con Piretroidi ed Etofenprox massimo 3 interventi per ciclo culturale. Con Deltametrina, Betaciflutrin, Con Etofenprox max 1. Lambdacialotrina max 1. Max 1 fra Cipermetrina e Zetacipermetrina. (2) Massimo 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (5) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire nei periodi e nelle zone soggette ad infestazione, dalla fase di formazione del baccello fino in prossimità della raccolta.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) <b>Tafluvalinato (1)</b> Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 5) Etofenprox (1) <i>Spinosad</i> (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	3 7 3 <b>7c</b> 3c 7 3 3c 3c 3	Max 2 interventi per ciclo contro questa avversità (escluso il <i>Bacillus thuringiensis</i> ). (1) Piretroidi vedi nota sopra. (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max. 2 interventi all'anno. (4) Max. 2 interventi all'anno (5) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 c = solo pieno campo
<b>Mosca</b> <i>Delia = Hylemya platura</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme con buona energia germinativa; semine non troppo precoci; seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina; adottare semine non profonde <b>Difesa chimica:</b> - dove le infestazioni sono ricorrenti	Teflutrin (1)	nr - c	(1) Applicazioni al terreno al momento della semina. Non entra nel cumulo dei piretroidi. c = solo pieno campo
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: attacchi precoci con 2-3 forme mobili/foglia	<i>Maltodestrina</i> Fenprosimato Spiromesifen Abamectina (1)	nr 7s 3s 3	Ammesso un solo trattamento acaricida l'anno; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) Non utilizzare in serra tra novembre e febbraio s = solo in serra

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Tripide</b> <i>Frankliniella intonsa</i> <i>Thrips sp</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire solo con infestazione generalizzata; indicativamente nel periodo agosto - settembre. Soglia: 8-10 individui per fiore	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) <b>Taufluvinalinate (1)</b> Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1, 2) Acrinatrina (1) Etofenprox (1)	<b>nr - s</b> 7 3 <b>7c</b> 3c 7c * 7	(1) Piretroidi: vedi nota sopra. (2) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo  * intervento in prefioritura
<b>Nottue fogliari</b> Mamestra oleracea, Polia pisi, Autographa gamma	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza accertata	<i>Bacillus thuringiensis</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 5) Etofenprox (1) <i>Spinosad</i> (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	3 7 3 3c 7 3 3c 3c 3	Max 2 interventi per ciclo contro questa avversità (escluso il <i>Bacillus thuringiensis</i> ). (1) Piretroidi vedi nota sopra. (2) Max 3 interventi all'anno. (3) Max. 2 interventi all'anno. (4) Max. 2 interventi all'anno (5) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021  c = solo pieno campo
<b>Calcoride</b> <i>Calocoris norvegicus</i>	Non si rendono necessari trattamenti specifici. I piretroidi effettuati su altre avversità controllano anche il calcoride			

**FAGIOLINO - DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	nr	
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee Annuali estive e numerose Dicotiledoni	Clomazone (1) Pendimetalin	nr 60	(1) Distribuire su seme ben coperto, meglio su terreno umido.
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Imazamox Bentazone	35 30	
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-P-etile Quizalofop etile isomero D Propaquizafop	28 42 20/21 40	Per migliorare l'azione dei graminicidi miscelare con bagnante

## FAGIOLO DA GRANELLA - *Phaseolus vulgaris*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Patogeni tellurici</b> <i>Rhizoctonia</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Sclerotinia</i>	Si consiglia di impiegare seme conciato	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp Pyraclostrobin (1, 2)	nr nr 28	(1) Indicati per Sclerotinia (2) Max 3 interventi anno con strobilurine – Azoxystrobin e Pyraclostrobin
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	<b>Interventi agronomici</b> - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato; ricorso a varietà resistenti o poco sensibili; ampie rotazioni colturali; distruzione dei residui colturali <b>Difesa chimica:</b> - 2 - 3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces appendiculatus</i>	<b>Difesa chimica:</b> - condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e temperature da 20° a 24°C)	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Pyraclostrobin (2)	3/20 14 7c 28	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 3 interventi anno con strobilurine – Azoxystrobin e Pyraclostrobin c = solo pieno campo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe</i> spp.		Azoxystrobin + Difenocanazolo (1)	14c	(1) Max 2 interventi anno. Solo pieno campo
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Difesa chimica:</b> - da effettuarsi in caso di persistente umidità e piogge frequenti.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Fludioxonil + Ciprodinil (3) Pyraclostrobin (4)	3/20 7c 28 28	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi anno (3) Solo su fagiolo da granella, raccolto secco. Max 1 intervento (4) Nel limite di 3 strobilurine
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Phaseolicola</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Phaseoli</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme controllato; uso di varietà tolleranti; ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); è sconsigliato irrigare con acque “ferme” o contenenti residui organici; concimazioni azotate e potassiche equilibrate <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV, BYMV, BCMV	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-essente) e varietà resistenti			



**FAGIOLO DA GRANELLA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i>	Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virusi <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa delle prime colonie in accrescimento	<i>Piretrine pure</i> <i>Maltodestrina</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Taufluvinalinate (1) Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1, 2) Acetamiprid (3) Spirotetramat (4) <i>Olio minerale</i> (5)	4 nr 3/7c 3 7c 7c 7c 14 7s 20	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Con Lambdacialotrina max 1 intervento anno. Max 1 anno con Cipermetrina. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 (3) Massimo 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi all'anno. Solo in serra (5) Formulati registrati per impiego in vegetazione  c = solo pieno campo s = solo in serra
<b>Mosca</b> <i>Delia = Hylemya platura</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme con buona energia germinativa; effettuare semine non troppo precoci; seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina; adottare semine non profonde <b>Difesa chimica:</b> - nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti	Teflutrin (1)	nr - c	(1) Applicazioni al terreno al momento della semina.  c = solo pieno campo
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	Adottare strategie di difesa che non favoriscono lo sviluppo dell'avversità	<i>Maltodestrina</i> <i>Olio minerale</i> (1) Taufluvinalinate (2)	nr 20 7c	(1) Formulati registrati per impiego in vegetazione (2) Nel limite dei piretroidi
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione diffusa a pieno campo su larve giovani ancora in piena attività, se non si sono approfondite nel terreno.	<i>Bacillus thuringensis</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1)	3 3 7c	(1) Contro questa avversità max. 1 trattamento con piretroidi. Max 1 all'anno con Lambdacialotrina c = solo pieno campo
<b>Nottue fogliari, Piralide</b>		<i>Spinosad</i> (1) Emamectina (2) Cipermetrina (3) Deltametrina (3) Taufluvinalinate (3) Betaciflutrin (3, 4)	3 3c 3/7c 7 7c 7c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno. (3) Vedi nota piretroidi (4) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Tripide</b> <i>Frankliniella intonsa</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire solo con infestazione generalizzata. Soglia: 8-10 individui per fiore	<i>Olio essenziale di arancio</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Taufluvinalinate (1) Betaciflutrin (1, 4)	3 3 7c 7c 7c	Contro questa avversità 1 intervento dopo la formazione del baccello, e comunque non superare cumulativamente i 2 interventi nel corso dell'annata. (1) Con Piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 all'anno con Lambdacialotrina (4) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021

**Nota bene:** non possono essere effettuati più di tre interventi con insetticidi per ciclo colturale

## FAGIOLO DA GRANELLA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	nr	
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee Annuali estive e numerose Dicotiledoni	S-metolaclor (1) Clomazone Pendimetalin Aclonifen	nr nr 60 nr	(1) Impiegabile solo tra febbraio ed agosto
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Imazamox Bentazone Piridate (2)	35 30 45	(2) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim Quizalofop-p-etile	40 28 42	

## FINOCCHIO - *Foeniculum vulgare*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Phytophthora syringae</i> , <i>Plasmopora nivea</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - ampi avvicendamenti; - impiego di seme sano o conciato; evitare una prolungata bagnatura delle piante con le irrigazioni <b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bicarbonato di potassio</i>	3/20 <b>1</b>	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Septoria</b>		Boscalid + Pyraclostrobin (1)	14c	(1) Max 2 interventi anno c = solo pieno campo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe umbelliferarum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi - presenza più frequente su coltivazioni autunnali	<i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i>	5 <b>1</b>	
<b>Ramularia</b>		Difenoconazolo (1)	3c	(1) Max 2 interventi all'anno con Difenzonazolo
<b>Marciumi basali</b> <i>Sclerotinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare avvicendamenti ampi; evitare eccessi di azoto <b>Difesa chimica:</b> - intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> Fludioxonil + Cyprodinil (1) Fluxapyroxad + Difenoconazolo (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3)	nr nr 3 7c 7c 14c	(1) Al massimo 2 interventi all'anno (2) Max 1 trattamento/anno in alternativa a Fludioxonil+Cyprodinil e a Difenoconazolo (3) Max 2 interventi anno
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp. <b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i> <b>Fitoftora</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare avvicendamenti ampi; evitare ristagni di umidità; utilizzare seme sano; allontanare e distruggere le piante malate	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr 3	
<b>BATTERIOSI</b> <b>Marciume batterico</b> <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni colturali; concimazioni azotate equilibrate; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infette <b>Difesa chimica:</b> - trattamenti pre-rincalzatura	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

## FINOCCHIO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Dysaphis</i> spp.	Soglia: comparsa delle prime infestazioni con interventi localizzati Difesa chimica: ammesso un solo trattamento	<i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Olio minerale</i> Lambdacialotrina (1)	7 nr 20 3c	(1) Al massimo 1 intervento all'anno. c = solo pieno campo
<b>Nottue fogliari</b>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in presenza di larve giovani	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Azadiractina</i>	3 7 7	(1) Max 3 interventi all'anno
<b>Tripidi</b>		Terpenoid blend QRD 460	- s	s = solo in serra
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis</i> spp		<i>Spinosad</i> (1) Teflutrin (2)	7 nr - c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento all'anno
<b>Limacce e Lumache</b> <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Arion</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnellino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Elateridi</b>		Teflutrin	nr	Max 1 intervento per ciclo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## FINOCCHIO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b> <b>Pre trapianto</b>	Graminacee annuali e Dicotiledoni	Pendimetalin Clomazone (1) Aclonifen	75 nr - c nr	(1) Da utilizzare subito dopo la semina
<b>Post emergenza</b> <b>Post trapianto</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin Metribuzin (2)	75 40	(2) Post trapianto
<b>Post emergenza</b> <b>Post trapianto</b>	Graminacee	Propaquizafop	30	

**FRAGOLA – *Fragaria spp* (pieno campo, protetta, fuori suolo)  
FRAGOLA – Fase di PREIMPIANTO**

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp</i>	I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni sabbiosi. <b>Interventi agronomici</b> -utilizzare materiale vivaistico sano e certificato	<i>Paecilomyces lilacinus</i> (1)	nr	(1) Indicato solo per i nematodi del genere <i>Meloidogyne spp.</i>
<b>Nematodi fogliari</b> <i>D. dispaci, Aphelenchoides</i>				
<b>Patogeni tellurici</b>		Dazomet (1) Metam Sodio, Metam Potassio (1, 2)	nr nr	(1) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (2) Massimo complessivi 1000 litri ettaro/anno

**FRAGOLA – Fase di POST IMPIANTO**

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca macularis,</i> <i>Oidium fragariae</i>	<b>Difesa biologica:</b> sono disponibili diversi prodotti, indicati in corsivo  <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi - sulle varietà più sensibili intervenire preventivamente	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Laminarina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <b>COS-OGA</b> Miclbutanil (1) Penconazolo (1) Flutriafol (1) Tetrazonazolo (1) Azoxystrobin (2) Boscalid+ Pyraclostrobin (2) Meptyldinocap (3) Azoxystr. + Difenconazolo (4) Fluopyram + Trifloxystrobin (5) Bupirimate (6) Ciflufenamid + Difenconazolo (7) Fluxapiroxad + Difenconazolo (1)	nr nr nr 5 1 nr 3 <b>nr - s</b> 3 <b>3</b> 3c 1 3 3 3 7 3s 3 3 1	(1) Con IBE max 2 trattamenti all'anno (2) Con strobilurine max. 2 trattamenti all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Nei limiti di IBE e strobilurine (5) Max 2 interventi all'anno. (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno, nel limite IBE  c = solo pieno campo s = solo in serra
<b>Necrosi del colletto e del rizoma</b> <i>Phytophthora fragariae</i> <i>Phytophthora cactorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale di propagazione sano e certificato; evitare ristagni idrici; eliminare le piante infette <b>Difesa chimica:</b> - intervenire su varietà sensibili o su impianti dove si è verificato l'attacco l'anno precedente.	<i>Trichoderma sp</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (2) Metalaxil-M Fosetil Al	- nr - s 3/20 40 <b>14</b>	(1) Da utilizzare in pretrapianto (2) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

## FRAGOLA – Fase di POST IMPIANTO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Vaiolatura</b> <i>Mycosphaerella fragariae</i> , <i>Ramularia t.</i> ; <i>Phomopsis o.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa sintomi; -il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivars sensibili, o nel caso di andamento stagionale piovoso.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Ciflufenamid + Difenoconazolo (2)	3/20 3	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi all'anno, nel limite dei 2 IBE
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum acutatum</i>	<b>Difesa agronomica:</b> eliminazione delle piante infette - evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette); <b>Difesa chimica:</b> alla comparsa dei sintomi	Boscalid + Pyraclostrobin (1)	3	(1) Con strobilurine – Pyraclostrobin Azoxystrobin, Trifloxystrobin - max. 2 trattamenti all'anno
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas fragariae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nottue fogliari</b> <i>Mamestra spp.</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Acronicta rumicis</i>	<b>Soglia:</b> - intervenire solo con infestazione generalizzata. <b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Emamectina (2)	3 3c/7 3 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Oziorrinco</b> <i>Othiorrhynchus spp.</i>	<b>Difesa biologica:</b> con i nematodi intervenire in presenza di larve e distribuire la sospensione su terreno sufficientemente umido.	<i>Heterorhabditis spp</i> <i>Metarhizium anisopliae</i>	nr nr	Il <i>Metarhizium</i> va usato esclusivamente per trattamenti al substrato di coltivazione
<b>Cicaline</b>	<b>Soglia:</b> intervenire solo in caso di forte attacco	Acetamiprid (1)	3	(1) Max 2 interventi anno
<b>Afidi</b> <i>Macrosiphus euphorbiae</i> , <i>Choetosiphon fragaefolii</i> , <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. La <i>Chrysoperla carnea</i> è un predatore di afidi ed altre specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più infestate. Altri utili: <i>Aphidius colemani</i> , <i>Aphidoletes aphidomyza</i> <b>Difesa chimica.</b> Soglia: alla comparsa dei focolai Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Taufluvalinate (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Pirimicarb (3) Flupyradifurone <b>Spirotetramat</b>	nr 2/4 3c/7 0 7c 3 7 3 7 3s -s	(1) Con piretroidi max 2 interventi per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1 per raccolta solo primaverile. Lambdacialotrina max 1 all'anno. (2) Max 2 interventi anno (3) Max 1 intervento anno c = solo pieno campo s = solo in serra

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## FRAGOLA – Fase di POST IMPIANTO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Altica</b> <i>Haltica oleracea</i>	<b>Soglia:</b> intervenire solo in caso di forte attacco	Deltametrina (1)	3	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Tripidi</b> <i>T. tabaci, F. occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> effettuare lanci di <i>Ortius laevigatus</i> , a partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con <i>Amblyseius swirskii</i> . Con temperature non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche <i>Amblyseius cucumeris</i> . <b>Difesa chimica:</b> presenza accertata	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Abamectina (1) Azadiractina <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Sali potassici acidi grassi Terpenoid blend QRD 460	nr 3s 2c 3 3 3 0 nr s	(1) No in serra da novembre a febbraio (2) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram  c = solo pieno campo s = solo in serra
<b>Miridi</b> <i>Ligus rugulipennis</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire localmente alla comparsa lungo i bordi. Evitare di sfalciare infestanti in prossimità quando la fragola è in fioritura.			
<b>Sputacchine</b> <i>Philaenus spumarius</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: infestazione generalizzata;			
<b>Lumache, Limacce, Grillotalpa</b>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo nelle prime fasi vegetative con accertata presenza dell'acaro	Sali potassici acidi grassi Clofentezine Exitiazox Fenprosimate Abamectina (1) Bifenazate Milbemectina Etoxazole <b>Piridaben</b> Spiromesifen Tebufenpirad Cyflumetofen <i>Olio minerale</i> (2)	0 3 3 7 3 3 3 3 7s 3s 3s 1s 20	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate  (1) No in serra da novembre a febbraio (2) Verificare registrazione formulati commerciali  s = solo in serra

## FRAGOLA – Fase di PRODUZIONE AUTUNNALE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum acutatum</i>	<b>Difesa agronomica:</b> eliminazione delle piante infette - evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette); <b>Difesa chimica:</b> alla comparsa dei sintomi	Boscalid + Pyraclostrobin (1)	3	(1) Con strobilurine (Pyraclostrobin e Azoxistrobin) max. 2 trattamenti all'anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> utilizzo delle manichette per l'irrigazione -evitare eccessive concimazioni azotate; -asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti; <b>Difesa chimica:</b> - da uno a tre interventi in funzione della sensibilità varietale e delle condizioni di piovosità e umidità da inizio fioritura alla raccolta	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Laminarina</i> Pirimetamil (1) Cyprodinil (1) + Fludioxonil (5) Fludioxonil (5) Mepanipyrim (1) Fenexamid (2) Fenpirazamina (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3, 6) Fluopyram+Trifloxystrobin (3, 6) Penthiopirad (6) Isofetamid (6) <i>Cerevisane</i>	nr nr 0 nr nr 3 <b>2c/1s</b> 3 3 3 3 3 3s 3 1 – c nr - s	Max. 3 trattamenti antibotritici (esclusi i prodotti biologici) (1) Con anilino pirimidine max 2 trattamenti all'anno (2) Max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro (3) Con strobilurine – Pyraclostrobin, Trifloxystrobin - max. 2 trattamenti all'anno (4) Max 2 interventi all'anno. (5) Max 2 interventi (6) Max 2 interventi all'anno con prodotti contenenti SDHI: Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad, Isofetamid
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophyla suzuki</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Spinetoram (3)	2 c 7 3 3	(1) Max 1 trattamento all'anno, nel limite dei piretroidi. (2) Max 2 interventi anno (3) Massimo 2 interventi anno, max 3 con spinosine

*Per altre avversità e relativo controllo, valgono le stesse indicazioni riportate nelle fasi successive, a cui si rimanda.*



## FRAGOLA PIENO CAMPO – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Oidium fragariae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare eccessive concimazioni azotate  <b>Difesa biologica:</b> sono disponibili diverse sostanze attive, indicate in corsivo  <b>Difesa chimica:</b> - si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a partire dalla fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili, con minore frequenza sulle altre.	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Zolfo</i> <i>Laminarina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Miclobutanil (1) Penconazolo (1) Flutriafol (1) Tetrazonazolo (1) Azoxystrobin (2) Boscalid+ Pyraclostrobin (2) Mepytidinocap (3) Azoxystr. + Difenconazolo (4) Bupirimate (5) Ciflufenamid + Difenconazolo (6) Fluxapirroxad + Difenconazolo (1)	nr 1 nr nr 5 nr 3 3 3 3c 1 3 3 3 7 3 3 1	(1) Con IBE max 2 interventi all'anno. (2) Con strobilurine max. 2 trattamenti all'anno (3) max 2 interventi all'anno (4) Nei limiti di IBE e strobilurine (5) max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno, nel limite IBE
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> utilizzo delle manichette per l'irrigazione; evitare eccessive concimazioni azotate; asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti; <b>Difesa chimica:</b> - da uno a tre interventi in funzione della sensibilità varietale e delle condizioni di piovosità e umidità da inizio fioritura alla raccolta	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Laminarina</i> Primetanil (1) Cyprodinil (1) + Fludioxonil (4) Fludioxonil (4) Mepanipyrim (1) Fenexamide (2) Fenpirazamina (2) Boscalid+Pyraclostrobin (3, 5) Penthiopirad (5) Isofetamid (5)	nr nr 0 nr nr 3 2 3 3 3 3 3 1 - c	Max 3 trattamenti antibiotrici in questa fase (esclusi i prodotti biologici) (1) Con anilinoipirimidine max 2 interventi anno (2) Max 3 interventi anno, in alternativa tra loro (3) Con strobilurine max. 2 trattamenti all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno con SDHI: Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Isofetamid
<b>Vaiolatura</b> <i>Mycosphaerella fragariae</i> , <i>Ramularia tulasnei</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa sintomi; il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivars sensibili, o nel caso di andamento stagionale piovoso.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Ciflufenamid + Difenconazolo (2)	3/20 3	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi all'anno, nel limite IBE

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## FRAGOLA PIENO CAMPO – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Necrosi del colletto e del rizoma</b> <i>Phytophthora fragariae</i> <i>Phytophthora cactorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale di propagazione sano e certificato; evitare ristagni idrici; eliminare le piante infette <b>Difesa chimica:</b> su varietà sensibili o danni anno precedente. <b>Difesa agronomica:</b> eliminazione delle piante infette - evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette); <b>Difesa chimica:</b> alla comparsa dei sintomi	<i>Bacillus amyloliquefaciens D747</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M Fosetil Al	nr - s 3/20 40 <b>14</b>	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum acutatum</i>	<b>Difesa agronomica:</b> eliminazione delle piante infette - evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette); <b>Difesa chimica:</b> alla comparsa dei sintomi	Boscalid + Pyraclostrobin (1)	3	(1) Nel limite strobilurine e SDHI
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas fragariae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra</i> spp, <i>Spodoptera</i> spp, <i>Heliothis armigera</i> , <i>Acrionicta rumicis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo con infestazione generalizzata.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Deltametrina (2) Emamectina (3)	3 3c/7 3 3 3/7 3	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Con piretroidi max 2 interventi per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1 per raccolta solo primaverile (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Oziorrinco</b> <i>Othiorrhynchus</i> spp.	<b>Difesa biologica:</b> - intervenire in presenza di larve. - distribuire la sospensione su terreno umido o irrigare	<i>Heterorhabditis</i> spp 30.000 - 50.000/pianta	nr	
<b>Cicaline</b>	<b>Soglia:</b> intervenire solo in caso di forte attacco	Acetamiprid (1)	3	(1) Max 2 interventi anno
<b>Altica</b> <i>Haltica oleracea</i>	<b>Soglia:</b> intervenire solo in caso di forte attacco	Deltametrina (1)	3	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Afidi</b> <i>Macrosiphus euphorbiae</i> , <i>Choetosiphon fragaefolii</i> , <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. La <i>Chrysoperla carnea</i> è un predatore di afidi ed altre specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più infestate. <b>Difesa chimica.</b> Soglia: alla comparsa dei focolai Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Taufluvinalate (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Pirimicarb (3) <i>Olio minerale</i> (4)	2/4 3c/7 0 7 3 7 3 7 20	(1) Con piretroidi max 2 interventi per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1 per raccolta solo primaverile. Lambdacialotrina max 1 all'anno. (2) Max 2 interventi anno (3) Max 1 intervento anno (4) Verificare registrazione formulati commerciali

## FRAGOLA PIENO CAMPO – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Miridi</b> <i>Ligus rugulipennis</i>				
<b>Tripidi</b> <i>T. tabaci, F. occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i> , a partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con <i>Amblyseius swirskii</i> . Con temperature non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche <i>Amblyseius cucumeris</i> . <b>Difesa chimica:</b> presenza accertata	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Spinosad (1) Spinetoram (1) Abamectina (2) Acrinatrina (3) Sali potassici acidi grassi	nr 3c/7 2/4 3 3 3 3 - 0	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Max 2 trattamenti all'anno (3) Max 1 intervento anno, nei limiti dei piretroidi. Trattamenti entro prefioritura.
<b>Sputacchine</b> <i>Philaenus spumarius</i>	<b>Soglia:</b> infestazione generalizzata;			
<b>Lumache, Limacce, Grillotalpa</b>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> intervenire solo nelle prime fasi vegetative con accertata presenza dell'acaro	<i>Beauveria bassiana</i> Sali potassici acidi grassi Clofentezine Exitiazox Fenpiroximate Abamectina Bifenazate Milbemectina Etoxazole <i>Olio minerale</i> (1)	nr 0 3 3 7 3 3 3 3 20	Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno con p.a. di sintesi; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate  (1) Verificare registrazione formulati commerciali
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophyla suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> Lambdacialotrina (1) Acetamidrid (2) Spinetoram (3)	2/4 7 3 3	(1) Max 1 trattamento all'anno, nel limite dei piretroidi. (2) Max 2 interventi anno (3) Massimo 2 interventi all'anno. Max 3 con spinosine

## FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA – Fase di: RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Oidio</b> <i>Sphaeroteca macularis</i> , <i>Oidium fragariae</i>	<p><b>Interventi agronomici</b> - evitare eccessive concimazioni azotate</p> <p><b>Difesa biologica:</b> sono disponibili diverse sostanze attive, indicate in corsivo</p> <p><b>Difesa chimica:</b> - si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a partire dalla fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili, con minore frequenza sulle altre.</p>	<p><i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Laminarina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <b>COS-OGA</b> Miclobutanil (1) Penconazolo (1) Tetrazonazolo (1) Azoxystrobin (2) Boscalid+Pyraclostrobin (2) Meptyldinocap (3) Azoxystr. + Difenoconazolo (4) Fluopyram + Trifloxystr. (2, 5) Bupirimate (6) Ciflufenamid + Difenoconazolo (7) Fluxapiroxad+Difenoconazolo (1, 5)</p>	<p>nr nr nr 5 1 nr 3 nr 3 3 3 7 3 3 3 1 3 3 3 1</p>	<p>(1) Con IBE max 2 interventi all'anno. (2) Con strobilurine – Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin - max. 2 trattamenti all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Nei limiti IBE e strobilurine (5) Max 2 interventi anno con prodotti contenenti SDHI – Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Fluxapiroxad. (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno, nel limite IBE</p>
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<p><b>Difesa biologica:</b> è possibile utilizzare prodotti a base di <i>Bacillus subtilis</i></p> <p><b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiamento del tunnel fin dalle prime ore del mattino; - asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti</p>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo MI <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Laminarina</i> <i>Cerevisane</i> Pirimetanil (1) Ciprodinil (1) + Fludioxonil (5) Mepanipyrim (1) Fenexamide (2) Fenpirazamina (2) Boscalid+Pyraclostrobin (3, 4) Fluopyram + Trifloxystr. (3, 54) Penthiopirad (4) Fludioxonil (5)</p>	<p>nr nr 0 nr nr nr 3 1 3 3 3 3 3 nr nr 0 nr nr nr 3 1 3 3 3 3 3 3 3</p>	<p>Nella fase ripresa vegetativa – raccolta, max 3 trattamenti antibotritici, elevabili a 4 in caso di andamenti climatici favorevoli alla botrite (esclusi i prodotti biologici) (1) Con anilinoipirimidine max 2 interventi anno (2) Max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro (3) Con strobilurine - Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin - max. 2 trattamenti anno (4) Max 2 interventi anno con prodotti contenenti SDHI – Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Fluxapiroxad. (5) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil</p>

## FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Vaiolatura</b> <i>Mycosphaerella fragariae</i> <i>Ramularia t., Phomopsis o.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi - il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivar sensibili con andamento stagionale piovoso. <b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale di propagazione certificato; evitare ristagni idrici; eliminare le piante infette; arieggiamento del tunnel fin dalle prime ore del mattino	<i>Prodotti rameici</i> (1) Ciflufenamid + Difenoconazolo (2) <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M Fosetil Al	3/20 3 nr 3/20 40 <b>14</b>	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi all'anno, nel limite IBE  (1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo Difesa chimica su varietà sensibili o negli impianti dove si sono verificati attacchi negli anni precedenti. (1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas fragariae</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Miridi</b> <i>Ligus rugulipennis</i>				
<b>Afidi</b> <i>Macrosiphum euphorbiae,</i> <i>Chaetosiphon fragaefolii,</i> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. Con <i>Chrysoperla carnea</i> distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese. Altri utili: <i>Aphidius colemani, Aphidoletes aphidomyza.</i> <b>Difesa chimica.</b> Soglia: infestazione generalizzata Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (1) Acetamiprid (2) Spirotetramat (3) Pirimicarb (4) Flupyradifurone	nr 2/4 7 0 3 3 - 7 3	(1) Con piretroidi max 2 interventi per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1 per raccolta solo primaverile (2) Max 2 interventi anno (3) Impiegabile solo in prefioritura, max 2 interventi (4) Max 1 intervento anno
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra spp., Spodoptera spp., Heliothis armigera,</i> <i>Acronicta rumicis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza di infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Virus SplitNPV</i> (1) Emamectina (2) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3)	3 7 3 3 3 3	(1) Specifico per <i>Spodoptera littoralis</i> (2) Max 2 interventi all'anno (3) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Tripidi</b> <i>T. tabaci</i> , <i>F. occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i> , a partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con <i>Amblyseius swirskii</i> . Con temperature non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche <i>Amblyseius cucumeris</i> . <b>Difesa chimica:</b> presenza accertata	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Abamectina (1) Spinosad (2) Spinetoram (2) <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> Terpenoid blend QRD 460	nr 3 3 3 3 3 7 0 nr	(1) No in serra da novembre a febbraio (2) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire con accertata presenza dell'acaro	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> Abamectina (1) Bifenazate Milbemeccina Clofentezine Fenpiroximate Etoxazole Exitiazox <b>Piridaben</b> Spiromesifen Tebufenpirad Cyflumetofen <i>Olio minerale</i> (2)	nr 0 3 3 3 3 7 3 3 7 3 7 20	Contro questa aversità al massimo 2 interventi all'anno; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) No in serra da novembre a febbraio (2) Verificare registrazione formulati commerciali
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophyla suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Spinetoram (3)	7 3 3	(1) Max 1 trattam. anno, nel limite piretroidi. (2) Max 2 interventi anno (3) Massimo 2 interventi anno. Max 3 con spinosine

### FRAGOLA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Interventi localizzati nelle interfile</b>	Graminacee	Quizalofop etile isomero D (1) Quizalofop-P-etile (1)	30 30/42	(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

## INDIVIA RICCIA E SCAROLA

**Indivia scarola - *Cichorium endiva* var. *latifolium*; Indivia riccia - *Cichorium endiva* var. *crispum***

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - ampie rotazioni; uso di varietà resistenti - arieggiare serre e tunnel <b>Difesa chimica:</b> - per questa avversità non effettuare più di 2 trattamenti - programmare i trattamenti in funzione delle condizioni climatiche favorevoli alla malattia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisiae</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) Azoxystrobin (3) Mandipropamide (4) Dimetomorf (4) Ametoctradina (5)	nr nr - s 3/20 20 7 7 7 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi per ciclo, 3 all'anno. (3) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2 interventi all'anno. Azoxystrobin anche in serra, verificare registrazione. (4) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf, – max 2 interventi per ciclo, 4 interventi all'anno (5) Max 2 interventi anno c = solo pieno campo
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arieggiare serre e tunnel; limitare le irrigazioni <b>Difesa biologica:</b> utilizzo di prodotti microbiologici <b>Difesa chimica:</b> - durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp (1) <i>Bacillus subtilis</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Boscalid + Pyraclostrobin (2) Azoxystrobin (3) Fludioxonil (4) Cyprodinil + Fludioxonil (4, 5) Pyrimethanil (5) Fenexamid (6) Fluxapiraxad + Difenoconaz. (7)	nr nr/3 nr nr 0 21c 7 14 14 3 14	Contro questa avversità max 2 interventi per ciclo, 3 con cicli lunghi, con s.a. di sintesi (1) Ammessi contro <i>Sclerotinia</i> (2) Max 1 intervento all'anno. (3) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2 interventi all'anno (4) Fludioxonil max 2 interventi anno (5) Max 3 interventi all'anno tra Cyprodinil e Pyrimethanil. (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 1 intervento all'anno c = solo pieno campo
<b>Moria piantine</b> <i>Pythium</i> spp		<i>Trichoderma</i> spp <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D747 Propamocarb + Fosetil	nr nr - s nr	Trattamento ai semenzai
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1)	3 5 7	(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2 interventi all'anno.
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni; concimazione azotate equilibrate; non utilizzare acque "ferme". <b>Difesa chimica:</b> - comparsa primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV, LeMV				

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**INDIVIA RICCIA E SCAROLA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Zetacipermetrina (1, 3) Lambdacialotrina (1) Spirotetramat (2)	1 nr 0 3/7 nr 7 14c 7	(1) Con Piretroidi max. 2 interventi per ciclo. Con Lambdacialotrina max 1 intervento all'anno. Zetacipermetrina max 1 all'anno. Etofenprox max 1 all'anno. (2) Max 2 interventi all'anno. (3) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 c = solo pieno campo
<b>Tripidi</b>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire alla presenza (in genere presenza elevata che giustifica l'intervento si ha nel ciclo estivo)	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) Taufluvallinate (2) Acrinatrina (2) Etofenprox (2) Abamectina (3) Formetanate (4) Terpenoid blend QRD 460	0 3s 14c 14c 7 7c nr - c nr - s	(1) Max 3 interventi all'anno s = solo in serra (2) Vedi nota piretroidi (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 1 intervento all'anno. Trattare entro la fase di 4 – 6 foglie della coltura
<b>Noctue</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Agrotis spp.</i> ecc. <i>Heliothis armigera</i> <i>Spodoptera</i> <i>Mamestra</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Indoxacarb (2) Taufluvallinate (3) Etofenprox (3) Emamectina (4) Clorantniliprole (5) Tebufenozide (6)	3 3/7 3s 3 14c 7 3c 3 14c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Al massimo 3 interventi all'anno (3) Vedi nota piretroidi (4) Max 2 interventi all'anno. (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 1 intervento all'anno  c = solo pieno campo
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza	Taufluvallinate (1) Etofenprox (1)	14c 7	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Limacce</b>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Liriomyza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	In serra installare trappole cromotopiche gialle <b>Controllo biologico:</b> lanci di <i>Diglyphus isaea</i> , alla comparsa di <i>Liriomyza</i> . N.B.: l'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Abamectina (2)	3/7 3s 7c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno.  c = solo pieno campo
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp</i>		Lambdacialotrina (1) Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2)	nr - c nr - c 7	(1) Max 1 intervento anno, localizzati, in alternativa tra loro. Non entra nel cumulo dei piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021



## INDIVIA RICCIA E SCAROLA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
Pre semina Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminati sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
	Graminacee annuali e numerose dicotiledoni	Propizamide	nr	
		Benfluralin (1) Pendimetalin	nr	
Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-P-etile	30 28	Per migliorare l'azione dei graminicidi è consigliata l'aggiunta di bagnante

## LATTUGA - *Lactuca sativa*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aerare serre e tunnel</li> <li>- ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture ammalate; favorire un buon drenaggio del suolo; uso di varietà resistenti</li> </ul> <p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia</li> <li>- di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cvs sensibili in caso di piogge ripetute</li> </ul>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i></p> <p><i>Cerevisane</i></p> <p>Laminarina</p> <p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p> <p>Propamocarb (2)</p> <p>Fosetil AI</p> <p>Metalaxil-M + Rame (1, 3)</p> <p>Cimoxanil (4)</p> <p>Mandipropamide (5)</p> <p>Dimetomorf (5)</p> <p>Azoxystrobin (6)</p> <p>Pyraclostrobin (6) + Dimetomorf (5)</p> <p>Ametoctradina (7)</p> <p>Fluopicolide + Propamocarb (8)</p> <p>Amisulbrom (9)</p> <p>Metiram (10)</p> <p>Propamocarb + Fosetil AI (11)</p> <p>Oxathiapiprolin (12)</p>	<p>nr</p> <p>nr - s</p> <p>nr</p> <p>3/20</p> <p>14c</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>7c</p> <p>7 / 14</p> <p>3</p> <p>7/14 c</p> <p>21/7</p> <p>7c</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo</p> <p>(2) Max 2 interventi per ciclo, 3 all'anno.</p> <p>(3) Max 3 interventi all'anno.</p> <p>(4) Max 3 interventi anno</p> <p>(5) Con CAA (Mandipropamide, Dimetomorf) max 2 interventi per ciclo. Max 4 anno</p> <p>(6) Con QoI (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin) max 3 interventi anno.</p> <p>(7) Max 2 interventi all'anno.</p> <p>(8) Max 1 intervento all'anno. Carenza 7 gg p.c; 14 gg in serra.</p> <p>(9) Max 3 interventi anno.</p> <p>(10) Max 3 interventi anno con prodotti contenenti Metiram.</p> <p>(11) Massimo 2 interventi anno</p> <p>(12) Massimo 3 interventi anno</p> <p>c = solo pieno campo</p> <p>Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo con sostanze di sintesi</p> <p>(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.</p> <p>(2) Indicati per <i>Sclerotinia</i></p> <p>(3) Max 3 interventi anno, max 4 tra Pyrimethanil e Cyprodinil</p> <p>(4) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil</p> <p>(5) Con QoI – Pyraclostrobin, Azoxystrobin, Trifloxystrobin - max 3 interventi all'anno.</p> <p>(6) Max 2 interventi all'anno</p> <p>(7) Max 2 anno con Difenoconazolo</p> <p>(8) Con SDHI – Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad, Fluxapiraxad - max 3 interventi all'anno. Max 1 con Penthiopirad</p> <p>(9) Max 1 anno, nel limite Difenoconazolo (2 anno)</p>
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aerare serre e tunnel; limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili; effettuare pacciamature e prosature alte.</li> </ul> <p><b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante</p> <p><b>Controllo biologico:</b> utilizzo di prodotti microbiologici</p>	<p><i>Coniothyrium militans</i> (1, 2)</p> <p><i>Trichoderma</i> spp</p> <p><i>Bacillus subtilis</i> (2)</p> <p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i></p> <p><i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1</p> <p>Pyrimetanil (3)</p> <p>Fludioxonil (4)</p> <p>Cyprodinil + Fludioxonil (4)</p> <p>Pyraclostrobin + Boscalid (5, 8)</p> <p>Fenexamid (6)</p> <p>Azoxystrobin + Difenoconazolo (5, 7)</p> <p>Fluopyram + Trifloxystrobin (8)</p> <p>Penthiopirad (8)</p> <p>Fluxapiraxad + Difenoconazolo (9)</p> <p>Azoxystrobin (5)</p>	<p>nr</p> <p>nr/3</p> <p>nr</p> <p>nr</p> <p>0</p> <p>14</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>14</p> <p>3</p> <p>7c</p> <p>7c</p> <p>7c</p> <p>14</p> <p>7</p>	<p>Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo con sostanze di sintesi</p> <p>(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.</p> <p>(2) Indicati per <i>Sclerotinia</i></p> <p>(3) Max 3 interventi anno, max 4 tra Pyrimethanil e Cyprodinil</p> <p>(4) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil</p> <p>(5) Con QoI – Pyraclostrobin, Azoxystrobin, Trifloxystrobin - max 3 interventi all'anno.</p> <p>(6) Max 2 interventi all'anno</p> <p>(7) Max 2 anno con Difenoconazolo</p> <p>(8) Con SDHI – Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad, Fluxapiraxad - max 3 interventi all'anno. Max 1 con Penthiopirad</p> <p>(9) Max 1 anno, nel limite Difenoconazolo (2 anno)</p>

## LATTUGA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Marciume del colletto</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Trichoderma</i> spp <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D747	nr/3 0 1 nr - s	s = solo in serra (1) Max 2 interventi per ciclo, 3 all'anno. (2) Trattamento ai semenzai, in alternativa al propamocarb (3) Max 3 interventi anno con Metalaxil-M s = solo in serra
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp		<i>Trichoderma</i> sp <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D747 Propamocarb (1) Propamocarb + Fosetil (2) Metalaxil-M (3)	- nr - s nr 14c nr 15	
<b>VIROSI CMV, LeMV</b>	Interventi di prevenzione			
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta; è sconsigliabile irrigare con acque "ferme"; evitare l'irrigazione per aspersione <b>Difesa chimica:</b> dopo operazioni che possano causare ferite alle piante	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>	Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Deltametrina (1) Taufluvinate (1) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 4) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor Spirotetramat (3)	1 0 nr 3/7 nr 3/7 14c 7c 3 10c/8s 7c 7	Max 3 interventi per ciclo contro gli afidi (1) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo. Lambdacialotrina max 2 all'anno. Max 1 anno con Zetacipermetrina. Etofenprox max 2 all'anno (2) Max 1 per ciclo, max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno. (4) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 c = solo pieno campo s = solo in serra

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## LATTUGA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Agrotis spp.</i> ecc. <i>Heliothis armigera</i> <i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata  I piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi se distribuiti prima che la vegetazione copra l'interfila.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Virus</i> (1) Deltametrina (2) Tauflualinate (2) Etofenprox (2) Indoxacarb (3) <i>Spinosad</i> (4) Spinetoram (4) Metaflumizone (5) Emamectina (6) Clorantniliprole (7) Metossifenoziide (8) Tebufenozide (8)	3 3/7 3 3/7 14c 7 3 3 3 3 3 3 3c 14c	(1) Specifici per <i>Spodoptera o Heliothis</i> (2) Piretroidi vedi nota sopra. (3) Max 3 interventi all'anno (4) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno (8) Max 1 intervento all'anno, in alternativa tra loro  c = solo pieno campo
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Abamectina (2) Etofenprox (3) Acetamiprid (4) Formetanato (5) Terpenoid blend QRD 460	0 3 3 7c/14s 7 10c/8s nr - c nr - s	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno. No in serra da novembre a febbraio (3) Piretroidi: vedi nota sopra (4) Max 1 intervento per ciclo, 2 all'anno (5) Max 1 intervento all'anno. Trattamento entro la fase di 4 - 6 foglie
<b>Ragno rosso</b>		<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Abamectina (1) Terpenoid blend QRD 460	0 nr 7c/14s nr - s	(1) Max 1 intervento per ciclo. Verificare registrazione formulati commerciali.
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio- Agosto. <b>Soglia:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Etofenprox (1)	7	(1) Vedi nota piretroidi, max 2 all'anno
<b>Limacce</b>		Metaldeide-esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Liriomyza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	<b>Controllo biologico:</b> lanci di 0,2 individui/mq., <i>Diglyphus isaea</i> alla comparsa della Liriomyza (consigliata in coltura protetta). In serra, installare trappole cromotropiche gialle <b>Difesa chimica:</b> accertata presenza	<i>Azadiractina</i> Abamectina (1) <i>Spinosad</i> (2)	3/7 7c/14s 3	L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari (1) Max 1 intervento per ciclo. No in serra da novembre a febbraio (2) Max 3 interventi all'anno

## LATTUGA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> -utilizzo pannelli di semi di brassica	<i>Pacilomyces liliacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	(1) Contro questa avversità uso ammesso solo in serra
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Metam Sodio e Metam Potassio (1)	nr	(1) Ammesso solo in coltura protetta. Massimo complessivo 1000 litri per ettaro/anno; impiegabile una volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp</i>	<b>Difesa chimica:</b>	Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1)	nr - c 7 nr - c	Massimo 1 intervento all'anno per elateridi (1) Localizzati e in alternativa tra loro. L'intervento non rientra nel limite dei piretroidi. (2) <b>Revocata.</b> Formulato granulare impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo

## LATTUGA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e pretrapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre trapianto Pre semina</b>	Graminacee annuali e numerose Dicotiledoni	Propizamide Benfluralin (1) Pendimetalin	nr nr nr	(1) <b>Solo pieno campo</b>
<b>Pre trapianto e Post trapianto</b>	Graminacee annuali e perenni e alcune Dicotiledoni			
<b>Post trapianto</b>	Graminacee	Propanilazafop Ciclossidim Quizalofop-P-etile (1)	15 21 28	Per migliorare l'azione dei gramincidi, è consigliato, miscelare un bagnante (1) Verificare registrazione formulati commerciali

## MAIS DOLCE – *Zea mays* var. *sacharata*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Carbone comune</b> <i>Ustilago maydis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - concimazione equilibrata; ampie rotazioni			
<b>Marcume del fusto</b> <i>Gibberella zeae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare le semine troppo fitte; evitare eccessi di azoto e squilibri idrici; ricorso a ibridi resistenti o tolleranti			
<b>BATTERIOSI</b> <i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Erwinia stewartii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> evitare l'uso di acque stagnanti per l'irrigazione a pioggia. Si consiglia la rotazione dove si sono verificati danni da <i>E. chrysanthemi</i> . Per <i>E. stewartii</i> è importante l'uso di seme esente.			
<b>VIROSI:</b> MDMV Nanismo maculato del Mais; BYDV Nanismo giallo dell'orzo	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti del virus)			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare la coltura in successione a prati stabili per almeno 2 anni	Cipermetrina (1) Lambdacialotrina (1) Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) <i>Spinosad</i>	nr nr - c nr - c nr nr	(1) Intervento localizzati alla semina. Non entra nel cumulo dei piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021
<b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - sfibatura degli stocchi e aratura <b>Difesa chimica:</b> - intervenire in funzione dei voli rilevati con le trappole a feromoni <b>Difesa biologica:</b> è possibile l'intervento con formulati a base di <i>Bacillus Thuringiensis</i> che si sono dimostrati efficaci, e il lancio di parassitoidi oofagi, <i>Trichogramma brassicae</i> .	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> Indoxacarb Clorantraniliprole Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1)	3 3 7 7 3 15 14	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 all'anno con Lambdacialotrina I piretroidi possono favorire lo sviluppo di infestazioni di ragno rosso, in particolare su colture in stress idrico o in condizioni di elevate temperature. <b>Betaciflutrin revocato;</b> impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Diabrotica</b> <i>Diabrotica virgifera</i> <i>virgifera</i>	La rotazione colturale è sufficiente a contenere la diabrotica. In altre situazioni installare trappole cromotropiche gialle e seguire le indicazioni dei bollettini per eventuali trattamenti. Vincolante: Il trattamento si giustifica con catture di 50 adulti settimanali consecutivi per due settimane solo nel caso in cui si preveda la coltura del mais anche nell'anno successivo	Indoxacarb Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1)	7 3 15 14	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 all'anno con Lambdacialotrina edi anche nota sopra.

## MAIS DOLCE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>Afidi</b> <i>Rhopalosiphum</i> , <i>Metopolophium</i> , <i>Sitobion</i> , <i>Schizaphis</i>		<i>Maltodestrina</i> Pirimicarb	nr 7	(1) Massimo 1 intervento anno
<b>Notte terrocole</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza diffusa di attacchi iniziali Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo localizzato.	Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1)	3 15	Infestazioni occasionali. (1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 all'anno con Lambdacialotrina Vedi anche nota sopra.
<b>Afidi dei cereali</b> <i>Rhopalosiphum</i> , <i>Metopolophium</i> , <i>Sitobion</i> a.,, <i>Schizaphis graminum</i>	non sono ammessi interventi chimici			

## MAIS DOLCE - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre-emergenza o Post-emergenza precoce</b>	Dicotiledoni e alcune graminacee	Mesotrione Isoxafutole Pendimetalin	nr nr nr	
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Piridate Tembotrione	nr 60	

MELANZANA - *Solanum melongena*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - aerare le serre; sestì d'impianto non troppo fitti - irrigazione per manichetta; <b>Difesa chimica</b> - in caso di andamento climatico particolarmente umido	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Cerevisane</i> Cyprodinil + Fludioxinil (1) Pyraclostrobin + Boscalid (2, 6) Fenexamide (3) Fenpirazamina (3) Penthiopirad (4, 6) Pyrimethanil (5)	nr nr 0 nr nr - s 7 3 3 3s 3 3	Contro questa avversità massimo 2 interventi all'anno con prodotti chimici (1) Max 2 interventi anno (2) Con QoI (Pyraclostrobin e Azoxistrobina) max 2 interventi anno (3) Max 2 interventi anno tra i 2 prodotti (4) Max 1 intervento anno. (5) Max 2 interventi anno (6) Max 2 interventi anno con SDHI – Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram, Isopyrazam -.
<b>Tracheoverticilliosi</b> <i>Verticillium dahliae</i> , <i>Verticillium albo-atrum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> raccolta e distruzione delle piante infette; innesto su cultivar di pomodoro resistenti; ampie rotazioni colturali	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamisii</i>	3	
<b>Marciumi basali</b> <i>Phoma</i> , <i>Sclerotinia</i> <i>Thielaviopsis basicola</i> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> accurato drenaggio <b>Difesa chimica:</b> intervenire dopo la comparsa dei sintomi - irrorare accuratamente la base del fusto	<i>Coniothyrium mimitans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp <i>Pythium oligandrum</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> D747 <i>Prodotti rameici</i> (2) Penthiopirad (3)	nr - 0 1 nr - s 3/20 3	(1) Indicato per <i>Sclerotinia</i> , su terreno in assenza di coltura (2) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (3) Max 1 intervento anno, nel limite dei 2 SDHI
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe</i> spp.)	<b>Difesa chimica</b> Intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo COS-OGA <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bicarbonato di Potassio</i> Azoxystrobin (1) Ciflutenamid (2) Metrafenone (3) Tetraconazolo (4) Flutriafol (4) Azoxistrobina + Difenoconazolo (5) Difenoconazolo + Fluxapyroxad (5) Isopyrazam (6)	nr 5 0 nr nr 1 s 3 1 3 7c 3 7 3c 1s	(1) Vedi nota sopra: QoI max 2 anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Triazoli, max 2 all'anno (5) Max 1 all'anno, nel limite dei 2 triazoli (6) Max 1 all'anno s = solo in serra c = solo pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità



MELANZANA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp Penthiopirad (2)	nr nr 3	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura (2) Max 1 intervento all'anno, nel limite dei 2 SDHI
<b>Marcume pedale</b> <i>Phytophthora capsici</i> <i>Pythium</i>	<b>Difesa chimica:</b> irrorare la base del fusto alla comparsa dei primi sintomi	<i>Trichoderma</i> spp <i>Bacillus amyloliquefaciens D747</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Propamocarb (2) Propamocarb + Fosecil (3)	nr/3 nr - s 3/20 3s 20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con irrigazione a goccia. (3) Max 2 interventi, nelle fasi iniziali s = solo in serra
<b>VIROSI</b> CMV; AMV	<b>CMV</b> - Virus del Mosaico del Cetriolo - e <b>AMV</b> - Virus Mosaico dell'Erba medica - sono trasmessi da afidi in tempi brevissimi, perciò i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o entrambi. Utilizzare piante prodotte in vivaio con protezione dai tripidi vettori di virus			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. La <i>Chrysoperla carnea</i> è un predatore di afidi ed altre specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Il parassitoide <i>Aphidius colemani</i> controlla diverse specie di afidi compreso <i>A. gossypii</i> . Per il controllo principalmente di <i>A. gossypii</i> , con temperature più elevate, è impiegabile anche il parassitoide <i>Lysiphlebus testaceipes</i> . <b>Difesa chimica:</b> Soglia di intervento: - in pieno campo: più del 50% di piante con colonie di <i>Aphis gossypii</i> , più del 10% di piante infestate dagli altri afidi. - in serra: interventi chimici ai primi focolai di infestazione. Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Maltodetrina Pirimicarb (1) Deltametrina (2) Zetacipermetrina (2, 5) Acetamiprid (3) Sulfoxaflor Spirotetramat (4) Flupyradifurone	2 3 0 nr 3/7 3 3 7c/3s 1 3 3	(1) Buona selettività verso gli ausiliari. (2) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 intervento anno con Zetacipermetrina (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno. (5) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	<b>Interventi meccanici:</b> si possono installare idonee reti all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti <b>Controllo biologico:</b> posizionare trappole cromotropiche gialle Alle prime catture di <i>T. vaporariorum</i> effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> . Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare lanci di <i>Macrolophus caliginosus</i> o di <i>Eretmocerus mundus</i> . Anche <i>Amblyseius swirskii</i> è utile per aleurodidi e tripidi <b>Difesa chimica</b> Soglia: 10 stadi giovanili/foglia	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <b><i>Paeclomyces fumosoroseus</i></b> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Maltodetrina Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Pyriproxyfen (2) Spiromesifen (3) Spirotetramat (4) Flupyradifurone Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3s <b>nr - s</b> 2 3 0 3 nr 7c/3s 1 3s 3s 3s 3 nr - s 3 - s	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno. . s = solo in serra

MELANZANA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUS.	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Triptide americano</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> - effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i> , a partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con <i>Amblyseius swirskii</i> , quest'ultimo efficace anche su aleurodidi. Con temperature non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche <i>Amblyseius cucumeris</i> . <b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Betaciflutrin (1, 5) Taufluvinate (1) Acrinatrina (1) <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Formetanate (3) Abamectina (4) Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3s nr - s 3 0 3 3c 3c - 3 3 14 3 nr - s 3 - s	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. (2) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (3) Max 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi anno (5) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> - presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate	<i>Beauveria bassiana</i> Maltodestrina <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i> Abamectina (1) Bifenazate Exitiazox (2) Fenpiroximate Etoxazole (3) Pyridaben Spiromesifen Acequinocil Tebufenpirad Terpenoid blend QRD 460	nr nr 0 20 3 3 7c 3 3s 3s 3 3s nr - s	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) Max 2 interventi anno (2) Buona selettività nei confronti dei fitoseidi (3) Max 1 intervento all'anno  s = solo in serra
<b>Tignola del pomodoro</b> <i>Tuta absoluta</i>	<b>Interventi meccanici, biologici e biotecnici:</b> - schermare con idonee reti antinsetti le aperture delle serre; monitorare con trappole a feromone il volo; cattura massale con trappole elettrofluorescenti; salvaguardare i nemici naturali, tra i quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova ( <i>Tricogramma</i> spp.) <b>Difesa chimica:</b> soglia: presenza del fitofago con le prime gallerte sulle foglie; alternare le s.a. disponibili per evitare fenomeni di resistenza	<i>Confusioe sessuale</i> <i>Azadiractina</i> (1) <i>Bacillus thuringensis</i> Indoxacarb (2) <i>Spinosad</i> (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6) <i>Spinosad</i> (7) Spinetoram (7)	- 3 3 3 3 3 3 3 nr - s	(1) Formulati commerciali impiegabili in fertirrigazione (2) Max 4 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 3 interventi all'anno in presenza di tuta assoluta. Max 3 complessivi con Abamectina. (6) Max 2 interventi all'anno (7) Vedi nota spinosine

MELANZANA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte fogliari</b> <i>Spodoptera</i> spp. <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Heliothis armigera</i>	Si consiglia di controllare l'andamento dei voli con trappole a feromoni <b>Difesa chimica</b> Presenza	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Virus</i> (2) Indoxacarb (3) Metaflumizone (4) Deltametrina (5) <b>Lambdacialotrina</b> (5) Emamectina (6) Clorantraniliprole (7) Metossifenoziide (8) Spinetoram (1)	3 3 3 3 3 3 <b>3</b> 3 3 3 3	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine. Max 2 con Spinetoram. (2) Specifici per <i>Spodoptera</i> o <i>Helicoverpa</i> (3) Max 4 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Con piretroidi max 2 interventi anno; <b>max 1 con Lambdacialotrina</b> (6) Max 2 interventi all'anno (in assenza di Tuta assoluta) (7) Max 2 interventi all'anno (8) Max 2 interventi terra; 1 pieno campo
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>	Va considerato che i miridi spesso sono utili predatori. In qualche caso possono provocare danni sui fiori, con conseguente mancata allegagione. <b>Difesa chimica</b> Intervenire solo in caso di danno accertato	Acetamiprid (1) Betaciflutrin (2, 3)	7c/3s 3	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Con piretroidi max 2 interventi all'anno (3) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Cimici</b>	Consigliate reti antiinsetto.	Acetamiprid (1)	7c/3s	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Dorifora</b> <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	<b>Controllo biologico:</b> in presenza di larve giovani. E' possibile l'impiego di <i>Bacillus thuringiensis</i> var <i>tenebrionis</i> <b>Difesa chimica:</b> si consiglia di intervenire sulle larve giovani	<i>Azadiractina</i> (1) Acetamiprid (2) Metaflumizone (3) Clorantraniliprole (4) Deltametrina (5) <b>Lambdacialotrina</b> (5) Betaciflutrin (1, 2)	3 7c/3s 3 3 3 <b>3</b> 3c	(1) Prodotto efficace su larve giovani. (2) Max. 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Con piretroidi max 2 interventi all'anno; <b>max 1 con Lambdacialotrina</b> (1) Con piretroidi max 1 intervento all'anno (2) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Altica</b>	<b>Difesa chimica</b> Intervenire solo in caso di danno accertato	<i>Betaciflutrin</i> (1, 2)	3c	(1) Con piretroidi max 1 intervento all'anno (2) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Liriomiza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	<b>Controllo biologico:</b> con catture di 20 adulti/trappola (cromotropiche gialle) e/ o alla comparsa prime mine o punture di suzione lanciare 0,2-0,5 individui/mq di <i>Diglyphus isaea</i> ripartiti in 2-3 lanci <b>Difesa chimica:</b> accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture di nutrizione o ovodeposizioni e scarsa parassitizzazione	<i>Spinosad</i> (1) <i>Azadiractina</i> Ciomazina (2) Acetamiprid (3) Abamectina (4)	3 3 14s 7c/3s <b>3</b>	(1) Max. 3 interventi all'anno (2) <b>Revocato</b> . Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Massimo 1 intervento. (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi anno

## MELANZANA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> evitare ristagni idrici utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> solarizzare il terreno con telo P.E trasparente, di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio e agosto per almeno 50 giorni. <b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Esiratto d'aglio</i> Fenamifos (1, 2) Oxamil (1, 3) Fluopyram (1) Fosthiazate (1, 4) Abamectina (1)	nr nr 60 28 3	(1) Utilizzo ammesso solo in coltura protetta (2) Solo applicazioni per irrigazione a goccia. In alternativa al Metam, Dazomet e Oxamil, Fostiazate. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 23/09/2021 (3) In alternativa al Fenamifos (4) In alternativa a Fenamifos e Oxamil
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> spp, <i>Pythium</i> spp, <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora</i> spp , <i>Fusarium</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis</i> spp	<b>Difesa chimica</b>	<i>Beauveria bassiana</i> Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1)	nr nr - c nr nr - c nr	(1) Max 1 intervento anno, localizzato; non entra nel limite dei piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Formulato granulare impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo

## MELANZANA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Napropamide	75 nr	
<b>Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Propaquizafop	42 15/30 30	

MELONE - Cucumis melo

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette; favorire l'arieggiamento delle piante coltivate in ambienti confinati; limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea <b>Difesa chimica:</b> - <u>in pieno campo</u> i trattamenti vanno effettuati solo in caso di condizioni climatiche favorevoli al patogeno (periodi molto umidi con temperature comprese tra 10 e 30°C) - <u>in serra</u> di norma non sono necessari interventi chimici	<i>Prodotti rameici</i> * Fosetil Al Propamocarb Metalaxil-M (1) Cimoxanil (2) Famoxadone (3) Pyraclostrobin + Dimetomorf (3, 4) Dimetomorf (4) Mandipropamide (4) Cyazofamid (5) Ametoctradina + Dimetomorf (4, 6) Ametoctradina (6) Metiram (7) Fluopicolide + Propamocarb (8) Zoxamide (9)	3/20 3 3c 20 10 10 3c 20 3 3 3 1c 3 7 3	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Max 3 interventi all'anno. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Con QoI (Azoxystrobin, Famoxadone, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin) max 3 interventi all'anno. Con Famoxadone max 1 all'anno (4) Con prodotti CAA (Dimetomorf, Mandipropamide) max 4 interventi all'anno (5) Max 3 interventi all'anno (6) Max 3 interventi all'anno con Ametoctradina. (7) Max 2 interventi all'anno (8) Max 1 intervento all'anno (9) Max 3 interventi all'anno
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di varietà resistenti, specie per cicli tardivi <b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno effettuati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale - è ottima norma alternare fungicidi a differente meccanismo d'azione	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Zolfo</i> IBE (A, 1) Isopyrazam (1) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1,3) Azoxystrobin (2) Trifloxystrobin (2) Meptyldinocap (4) Ciflufenamid (5) Metrafenone (6) Bupirimate (7) Propamocarb + Fosetil (1) <i>Pythium oligandrum</i>	nr nr nr- s nr nr- c 0 3 5 - 7 3 1/3 3 3 1 3 3 1	(1) Con IBE al massimo 3 interventi all'anno. Max 1 anno fra Tebuconazolo, Miclobutanil, Difenoconazolo e Isopyrazam (SDHI). (2) Con QoI max. 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi anno con SDHI - Isopyrazam, Fluxapiroxad, Fluopyram - (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno s = solo in serra c = solo pieno campo
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i>			nr 0	(1) Trattamento ai semenzai

(A) IBE autorizzati: Fenbuconazolo (t.c. 7 gg); Tebuconazolo (7); Miclobutanil (3c); Difenoconazolo (14); Penconazolo (3); Tetraconazolo (7)

MELONE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Tracheofusariosi</b> <i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ricorso a varietà resistenti; innesto su specie resistenti. <b>Difesa chimica:</b> concia	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr 0 nr	
<b>Cancro gommoso</b> <i>Didymella bryoniae</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Fluxaproxad + Difenoconazolo (3)	3/20 3 3	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con QoI max 3 interventi all'anno (3) Max 1 intervento con Difenoconazolo, max 2 con SDHI
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - limitare le irrigazioni; eliminare immediatamente le piante ammalate; evitare lesioni alle piante; in serra arrieggiare di frequente	<i>Coniothirium minitans</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma</i> spp <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr nr nr/3 0 nr	
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae pv. lachrymans,</i> <i>Erwinia carotovora caro</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme controllato; rotazioni; concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; - è sconsigliato irrigare con acque "ferme" o contenenti residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV; WMV-2; ZYMV	<b>CMV</b> - Virus del Mosaico del Cetriolo -; <b>WMV-2</b> Virus 2 del Mosaico del Coconero; <b>ZYMV</b> Virosi trasmesse da afidi in modo non persistente, perciò i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o entrambi. Impiegare piantine sane			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - in serra effettuare lanci di <i>Chrysoperla carnea</i> distribuendo 10-20 larve per mq in 1 - 2 lanci. Con popolazioni di afidi più elevate impiegare <i>Aphidoletes aphidimiza</i> e <i>Aphidius colemani</i> . Altri: <i>Aphidius ervi</i> ; <i>Aphelinus abdominalis</i> ; <i>Praon volucre</i> ; <i>Ephedrus cerasicola</i> <b>Difesa chimica:</b> Soglia: alla comparsa delle prime colonie intervenire in maniera localizzata, e comunque prima della comparsa di accartocciamenti fogliari	<i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Maltodestrina Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Taufluvalinate (2) Flonicamid (3) Spirotetramat (4) Cipermetrina (1)	1/3 nr 3s 0 nr 14 1 7c 3 3 3c	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Con Piretroidi max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno s = solo in serra c = solo pieno campo  (1) Piretroidi, max 1 intervento anno
<b>Diabrotica</b> <i>Diabrotica virgifera</i>			3c	(1) Piretroidi, max 1 intervento anno

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

MELONE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUS.	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> , <i>Heliothrips</i> <i>haemorrhoidales</i>	<b>Controllo biologico:</b> - installare trappole cromotropiche azzurre. Alla comparsa dei primi adulti effettuare uno o più lanci di <i>Orius laevigatus</i> con 1-2 individui/mq. Altri ausiliari: <i>Amblyseius swirskii</i> e <i>A. cucumeris</i>  - Utilizzo di formulati a base di <i>Beauveria bassiana</i>	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <b><i>Paecilomyces fumosoroseus</i></b> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) <i>Azadiractina</i> <i>Abamectina</i> (2) Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	0 3 3s <b>nr - s</b> 3 3 3s 3 nr - s 3 - s	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) No in serra da novembre a febbraio. Max 2 interventi anno  s = solo in serra
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq, in funzione del livello di infestazione. - Utilizzo di formulati a base di <i>Beauveria bassiana</i>  <b>Difesa chimica:</b> - presenza di focolai con foglie decolorate	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> Maltodetrina Abamectina (1) Clofentezine Exitiазox Etoazole Spiromesifen Bifenazate Tebufenpirad Terpenoid blend QRD 460	0 nr 3 3 <b>3</b> 3 3s 3 3s nr - s	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) No in serra da novembre a febbraio. Max 2 interventi anno  s = solo in serra
<b>Notte fogliari</b> <i>Autographa, Mamestra</i> , <i>Heliothis, Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza generalizzata .	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) Indoxacarb (2) Lambdacialotrina (3) Cipermetrina (3) Clorantniliprole (4) Emamectina (5)	3 3 3 3 3 3c 3 3	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Max 3 interventi all'anno (3) Con Piretroidi max 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>	<b>Controllo biologico</b> Installare trappole cromotropiche gialle. Alla comparsa dei primi adulti si consiglia di effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> , quando la temperatura notturna in serra è di almeno 16°C. Tra gli ausiliari si ricordano anche <i>Amblyseius swirskii</i> e <i>Macrolophus caliginosus</i> . <b>Difesa chimica.</b> Soglia: almeno 10 stadi giovanili per foglia	<i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarum</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> Maltodetrina Flonicamid (1) Sulfoxaflor <i>Olio essenziale di arancio</i> Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	1/3 nr 3 - s nr - s 3 nr 3 1 3 nr - s 3 - s	(1) Max 2 interventi all'anno  c = solo pieno campo  s = solo in serra

## MELONE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Minatori fogliari</b> <i>Liriomyza trifolii</i>	<b>Controllo biologico:</b> installare trappole cromotropiche gialle. Alle prime catture o comparsa prime mine fogliari effettuare lanci con <i>Dygitifus isaea</i> <b>Difesa chimica:</b> 2 – 3 mine per foglia <b>Interventi agronomici:</b> la calciocianamide presenta un'azione repellente verso le larve <b>Difesa chimica:</b> - presenza accertata mediante specifici monitoraggi	Ciromazina (1) <i>Spinosad</i> (2) <i>Azadiractina</i> Abamectina (3) <i>Beauveria bassiana</i> Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1)	14s 3 3s 3	(1) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento (2) Max 3 interventi anno con spinosine (3) No in serra da novembre a febbraio (1) Max 1 intervento all'anno. Da applicare solo al terreno al momento del trapianto lungo la fila. Non rientra nel limite dei piretroidi (2) <b>Revocata.</b> Formulato granulare impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	Possono essere dannosi nei terreni prevalentemente sabbiosi <b>Interventi agronomici</b> - effettuare rotazioni con specie poco sensibili; utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> - solarizzare il terreno con telo P.E di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 giorni. <b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Paeclomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> Fenamifos (1) Oxamil (1, 2) Fluopyram Abamectina (3)	nr nr 60 50 nr - s <b>nr</b>	(1) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti, e distribuito per irrigazione. Al massimo 1 intervento all'anno, in alternativa a Oxamil, Dazomet, Metam. <b>Fenamifos revocato.</b> Impiego ammesso fino al 23/09/2021. (2) Solo in coltura protetta. Intervento localizzato tramite irrigazione con coltura in atto e formulati liquidi. (3) Solo in coltura protetta con irrigazione a goccia o con manichetta, in alternativa agli altri nematocidi
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Phytophthora spp., Fusarium spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr 3 1	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impieghi una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio

## MELONE - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Propaquizafop Quizalofop-P-etile (1) Quizalofop etile isomero D (1)	65 30 30	Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso a mezzi meccanici. Per migliorare l'azione miscelare con bagnante (1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati



**PATATA - Solanum tuberosum**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Phytophthora infestans</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta di varietà poco suscettibili</li> <li>- ampie rotazioni</li> <li>- concimazione equilibrata</li> </ul> <p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il primo trattamento va effettuato quando le condizioni ambientali e colturali risultano favorevoli all'infezione</li> </ul>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1) Cimoxanil (2) Benalaxil (3) Benalaxil-M (3) Metalaxil-M (3) Dimetomorf (4) Mandipropamide (4) Zoxamide (5) Pyraclostrobin (7) + Dimetomorf (4) Propamocarb (5) Fluopicolide (8) Famoxadone (7) + Cimoxanil (2) Fosetil Al Cyazofamid (9) Amisulbrom (9) Ametoctradina + Dimetomorf (10) Dimetomorf + Metiram (11, 12) Metiram (12) Ametoctradina (13) Fluazinam (14) Fluazinam (14) + Valifenalate (4) Oxathiapiprolin (15)</p>	<p>3/20 7/20 7 14 20 20 3 7 3 7/14 7 20 20 7 7 7 14 14 7 7 7 3</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Al massimo 3 interventi all'anno (3) Con Fenilammidi massimo 3 interventi anno. Benalaxil <b>revocato</b>. Impiego ammesso fino al 5/10/2021 (4) Con CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valifenalate) max 4 interventi all'anno (5) Al massimo 4 interventi all'anno (5) Solo miscele con Cimoxanil e Fluopicolide. Con Fluopicolide max 1 intervento all'anno (7) Con QoI (Famoxadone, Pyraclostrobin) max 3 trattamenti all'anno. Famoxadone massimo 1 all'anno (8) Max 1 intervento, solo in miscela con Propamocarb (9) Max 3 interventi all'anno in alternativa tra loro (10) Massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA (Dimetomorf) (11) Massimo 3 interventi all'anno. Nei limiti dei CAA (Dimetomorf) (12) Max 3 interventi anno con Metiram. (13) Max 3 interventi anno con Ametoctradina (14) Fluazinam max 2 interventi anno. (15) max 3 interventi anno</p>
<b>Alternariosi</b> <i>Alternaria solani</i>	<p><b>Difesa chimica:</b> - interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso di infezioni su piante giovani, poichè i prodotti antiperonosporici usualmente impiegati sono efficaci anche contro l'alternariosi</p>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1) Pyraclostrobin + Dimetomorf (2) Difenocozolo (3) Zoxamide (4)</p>	<p>3/20 3 14 7</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 3 interventi anno. Vedi anche nota sopra relativa a Dimetomorf e a Pyraclostrobin (3) Max 1 intervento anno. Solo varietà sensibili e condizioni climatiche predisponenti (4) Al massimo 4 interventi all'anno</p>
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b> impiego di tuberi-seme sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata o altre colture altamente recettive</p>	<p><i>Trichoderma asperellum</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Tolclofos metil (1) Azoxystrobin (2) Flutolanil (3) Fluxapyroxad (4)</p>	<p>nr 1 nr nr nr nr nr nr</p>	<p>(1) Ammesso solo per la concia dei tuberi (2) Applicare sui solchi di semina (3) Concina tuberi o spray nel solco di semina (4) Massimo 2 interventi con SDHI – Fluxapyroxad e Fluopyram</p>

**PATATA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Marciume secco</b> <i>Fusarium solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta - non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti			
<b>Cancrena secca</b> <i>Phoma exigua</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti			
<b>Oidio</b>	La malattia può comparire in particolari areali e su varietà sensibili	<i>Zolfo</i>	5	
<b>VIROSI</b> PVX, PVY, PLRV	<b>Interventi agronomici:</b> - uso di tuberi seme certificati; eliminazione delle piante originate da tuberi residui di colture precedenti; rotazioni colturali			
<b>BATTERIOSI</b> Avvizzimento batterico delle solanacee o marciume bruno <i>Ralstonia solanacearum</i>	In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria segnalare al Servizio Fitosanitario l'eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme, nonché sulla coltura in campo e sui tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio.			
<b>Marciumi batterici</b> <i>Erwinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> rotazioni; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infette			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Dorifora</b> <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Acetamiprid (1) Metaflumizone (2) <i>Spinosad</i> (3) Cloraniliprole (4) Deltametrina (5) Tauflualinate (5)	0/1 3 7/14 14 7 14 7 14c	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi anno. Max 1 con Lambdaclalotrina.
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi; la concimazione con calcioammonide ha un'azione repellente nei confronti delle larve <b>Difesa chimica</b> Soglia alla semina: presenza accertata di larve nel terreno nell'autunno precedente mediante specifici monitoraggi	<i>Beauveria bassiana</i> Teflutrin (1) Lambdaclalotrina (1) Cipermetrina (1)	nr nr - c nr - c nr	(1) I trattamenti geodisinfestanti con piretroidi non sono da considerare nel limite numerico dei trattamenti fogliari

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**PATATA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Tignola</b> <i>Phthorimaea operculella</i>	<b>Interventi agronomici</b> - distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali <b>Difesa chimica</b> Soglia: impiegare trappole a feromoni per rilievi dei voli.	<i>Azadiractina</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1) Cipermetrina (1) Etofenprox (1) <i>Spinosad</i> (2) Clorantpriliprole (3) Emamectina (4) Fosmet (5)	3 7 15c 3 3 7 7 14 3 14	Ammessi 4 interventi anno nelle aziende con gravi problemi di tignola negli anni precedenti (1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi anno. Max 1 con Lambdacialotrina. Max 1 con Etofenprox. Max 1 Cipermetrina. Betaciflutrin <b>revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021 (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 1 intervento all'anno
<b>Limacce</b>	<b>Difesa chimica:</b> interventi localizzati lungo i bordi del campo alla comparsa dei primi parassiti	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Difesa chimica</b> <b>Soglia:</b> presenza diffusa delle prime larve giovani	Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Etofenprox (1)	14 3 14 7	(1) Piretroidi: vedi nota sopra (2) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Afidi</b> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	<b>Difesa chimica</b> <b>Soglia:</b> infestazione generalizzata	<i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Acetamiprid (1) Sulfoxaflor	3 nr 7/14 7	(1) Max 1 intervento all'anno
<b>Nematodi a cisti</b> <i>Globodera rostochiensis</i> , <i>Globodera pallida</i>	Evitare di coltivare la patata in rotazione con piante ospiti (melanzana e pomodoro). Effettuare l'analisi del terreno nei casi sospetti.	Fluopyram (1)	nr	(1) Massimo 2 interventi anno con SDHI – Fluxapyroxad e Fluopyram

## PATATA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate Napropamide Acido pelargonico	nr nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
	<b>Pre emergenza (post-precoce)</b>	Clomazone Metribuzin (1) Metribuzin (1) + Clomazone Metribuzin (1) + Flufenacet Flufenacet Pendimetalin Aclonifen (2) Metobromuron Prosulfocarb	60c 60 nr nr nr nr nr nr nr 80	(1) Verificare la sensibilità della varietà al Metribuzin, per evitare danni da fitotossicità  (2) Prodotto pericoloso per le acque. Nella rotazione con mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento (nella rotazione tra patata e le altre colture orticole dove è impiegabile, es. carota, utilizzabile 1 volta all'anno).
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Rimsulfuron (3) Metribuzin (1)	30 60	(3) intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute.
	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim	40 56	(4) Verificare registrazione formulati commerciali
		Quizalofop-p-etile (4)	30	
		Quizalofop etile isomero D (4) Cletodim	45 56	
<b>Pre raccolta</b>	Disseccamento parte aerea	Carfentrazone Pyraflufen-ethyl Acido pelargonico	3 nr nr	In caso di varietà particolarmente vigorose può essere necessario ripetere il trattamento

## PATATA DOLCE - *Ipomea batata*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria spp</i> <b>Cercospora</b> <i>Cercospora spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> - interventi specifici contro questi patogeni sono necessari solo in caso di infezioni su piante giovani.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i> <b>Marciume secco</b> <i>Fusarium solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di tuberi-seme sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata o altre colture altamente recettive; evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta; non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti			
<b>Batteriosi</b> <i>Erwinia chrysanthemini</i>	<b>Interventi agronomici</b> - ampie rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; non utilizzare acque ferme o contenenti residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis spp</i>	<b>Interventi agronomici:</b> evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi; la concimazione con calcioamamide ha un'azione repellente nei confronti delle larve			
<b>Afidi</b> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	<b>Difesa:</b> - infestazione generalizzata	Maltodetrina	nr	
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare stress idrici alla coltura	Maltodetrina	nr	
<b>Nematodi a cisti</b> <i>Meloidogyne spp</i>	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni con specie poco sensibili; evitare ristagni idrici; utilizzo di ammendanti e/o pannelli di semi di brassica o piante biocide			

## PATATA DOLCE - DISERBO

Nessuna sostanza attiva ammessa

**PEPERONE – Capsicum annuum**

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Cancrena pedale</b> <i>Phytophthora capsici</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare acqua di irrigazione non contaminata - utilizzo di cv resistenti - innesto di cv sensibili su portainnesti resistenti <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi con trattamenti localizzati alla base del fusto; - si può intervenire direttamente sulla pianta per prevenire infezioni all'apparato aereo.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M (2) Propamocarb	nr 3 3/20 20 3s	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max. 2 interventi all'anno
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp.		<i>Trichoderma</i> spp <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> Propamocarb Propamocarb + Fosetil (1)	nr/3 nr - s 3s nr	(1) Max 2 interventi, nelle prime due settimane dal trapianto
<b>Oidio</b> <i>Leveillula taurica</i>	Presente soprattutto in serra. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ripetendo eventualmente gli interventi a distanza di 8 – 10 giorni	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <b>COS-OGA</b> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Zolfo</i> Azoxistrobin (1) Boscalid+Pyraclostrobin (1, 2) Ciflufenamid (3) Azoxyst. + Difencnazolo (1, 3) Fluxapirxad + Difenoconaz. (2, 3) Trifloxystrob + Tebuconaz. (1, 3) Tetraconazolo (3) Flutriafol (3) Penconazolo (3) Metrafenone (4) Bupirimate (5)	nr nr nr <b>0</b> 1s 5 3 3 1 7 3 3 7c 3 3 3 3	(1) Con strobilurine - Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin - massimo 2 interventi all'anno (2) Con SDHI - Boscalid, Fluxapirxad, Penthiopirad, Fluopyram - max 2 interventi all'anno (3) IBE max 2 all'anno. Max 1 all'anno fra Difencnazolo e Tebuconazolo. (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno s = solo in serra c = solo pieno campo
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - aerare gli ambienti protetti; allontanare e distruggere le parti colpite; limitare le concimazioni azotate; evitare l'irrigazione sopra chioma <b>Difesa chimica:</b> - intervenire ai primi sintomi	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fluodixonil (1) Pyrimethanil (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Fenexamide (4) Fenpirazamina (4) Penthiopirad (5)	nr nr 0 3s <b>3</b> 3s 3 3 3s 3s	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità con prodotti di sintesi (1) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 3 interventi anno tra Cyprodinil e Pyrimethanil (3) Max 2 interventi all'anno, nel limite SDHI e strobilurine (4) Max 2 interventi all'anno tra i due prodotti (5) Con SDHI max 2 interventi all'anno

**PEPERONE**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Difesa chimica:</b> in caso di presenza di sintomi	<i>Trichoder. asper.</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> ceppo DSM <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> Flutolanil	nr 1 nr - s 47	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vesicatoria</i> <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme controllato; controllare la sanità delle piante al trapianto; rotazioni; concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta; è sconsigliato irrigare con acque "ferme" o con residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	
<b>VIROSI</b> CMV, Virus del Mosaico del Cetriolo - <b>PVY</b> , Virus Y della patata - <b>TMV</b> , Virus del Mosaico del Tabacco - <b>ToMV</b> , Virus del Mosaico del Pomodoro	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente, CMV e PVY, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o entrambi Per le virosi trasmesse per contatto, TMV e ToMV, è fondamentale l'impiego di seme esente da virus o sottoposto a disinfestazione mediante trattamenti chimici o fisici.			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Piralidi</b> <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Udea ferrugalis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - è importante allontanare e distruggere le bacche infestate - utilizzo di reti antiinsetto sulle aperture dei tunnel <b>Soglia:</b> presenza di ovodeposizioni o fori larvali o adulti nelle trappole <b>Difesa chimica:</b> - sulla prima generazione intervenire quando si registra un aumento nel numero di individui catturati (solitamente verso metà giugno); - sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto) eseguire trattamenti cautelativi subito dopo le prime catture e ripeterli con cadenza quindicinale;	<i>Feromoni</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Zetaciopermetrina (1, 7) Betaciflutrin (1, 8) Indoxacarb (2) <i>Spinosad</i> (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6)	nr 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(1) Con piretroidi max. 3 interventi all'anno. Max 1 con Zetaciopermetrina, max 1 Lambdacialotrina (2) Max 4 interventi all'anno (3) Max 3 interventi anno con spinosine (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (8) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. La <i>Chrysoperla carnea</i> è un predatore di afidi ed altre specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più infestate. Il parassitoide <i>Aphidius colemani</i> controlla diverse specie di afidi compreso <i>A. gossypii</i> . La distribuzione avviene in più lanci da 0,5-2 individui/mq. Per il controllo principalmente di <i>A. gossypii</i> , con temperature più elevate, è impiegabile anche il parassitoide <i>Lysiphlebus testaceipes</i> . <b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza generalizzata. Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i> <i>Maltodestrina</i> Acetamidrid (1) Sulfoxaflor Spirotetramat (2) Pirimicarb (3) Flupyradifurone Lambdacialotrina (4)	1/3 3/7 3 20 nr 7c/7s/3s 1 3 3 3 3	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità (1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento anno (4) Vedi nota sopra

**PEPERONE**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b> <b>Tripide americano</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> Installare trappole cromotropiche di colore azzurro, 1 ogni 50 mq - effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i> o <i>Orius majusculus</i> a partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con <i>Amblyseius swirskii</i> , quest'ultimo efficace anche su aleurodidi. Con temperature non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche <i>Amblyseius cucumeris</i> . <b>Difesa chimica:</b> - in pieno campo intervenire alla comparsa dei primi individui; in serra intervenire solo in caso di insufficiente presenza di predatori o limitatamente ai principali focolai di infestazione	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potas. di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Lufenuron (2) Acrinatrina (3) Abamectina (4) Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3s <b>nr - s</b> 1/3 3/7 3 3 3 3 7s 7 3 nr - s 14 - s	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità (1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento (3) Nei limiti dei piretroidi (max 3 interventi all'anno) (4) Max 2 interventi anno. In serra non impiegabile da novembre a febbraio
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Interventi meccanici</b> Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti <b>Controllo biologico:</b> Installare trappole cromotropiche gialle - alle prime catture di <i>T. vaporariorum</i> effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> ; - alle prime catture di <i>Bemisia tabaci</i> effettuare lanci di <i>Macrolophus caliginosus</i> o di <i>Eretmocerus mundus</i> Anche <i>Amblyseius swirskii</i> è utile per aleurodidi e tripidi <b>Difesa chimica</b> - Soglia: 10 stadi giovanili/foglia	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium musc.</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Azadiractina</i> Maltodetrina Pyriproxyfen (1) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor Spiromesifen (3) Spirotetramat (4) Flupyradifurone Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3s nr - s 1/3 3 3 3/7 nr 3s 7c/3s 1 3s 3 3 nr - s 14 - s	(1) Al massimo 1 intervento all'anno (2) Massimo 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi anno (4) Max 2 interventi anno  s = solo in serra c = in pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità



**PEPERONE**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> - in pieno campo: 20-30% di foglie con forme mobili - in serra: presenza di focolai d'infestazione con foglie decolorate	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> Maltodestrina <i>Olio minerale</i> Abamectina (1) Bifenazate Exitiabox Fenpiroximate Spiromesifen (2) Terpenoid blend QRD 460	nr 3 nr 20 3 3 3s 7s 3s nr-s	Massimo 1 intervento all'anno in pieno campo; massimo 2 interventi in coltura protetta. Ammissa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) Max 2 interventi anno. No in serra da novembre a febbraio (2) Max 2 interventi anno s = solo in serra
<b>Notte fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> <i>Spodoptera</i> <i>Helicoverpa armigera</i>	Il <i>Bacillus t.</i> è efficace se applicato su larve giovani <b>Difesa chimica:</b> - presenza generalizzata Gli interventi che si eseguono per il controllo della piralide servono anche per contenere gli attacchi da parte di questi Lepidotteri.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1) Lufenuron (2) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Deltametrina (4) Betaciflutrin (4, 10) Metaflumizone (5) Emamectina (6) Clorantniliprole (7) <i>Virus</i> (8) Metossifenozide (9) Tebufenozide (9)	3 3 7s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7s	(1) Max 4 interventi all'anno (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento. (3) Tra <i>Spinosad</i> e <i>Spinetoram</i> massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con <i>Spinetoram</i> (4) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. Max 1 anno per <i>Lambdacialotrina</i> . (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno (8) Specifici per <i>Spodoptera</i> o <i>Helicoverpa</i> (9) Max 2 interventi in alternativa tra loro. Metossifenozide max 1 intervento anno. (10) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Tignola del pomodoro</b> <i>Tuta absoluta</i>	<b>Interventi meccanici, biologici e biotecnici:</b> - schermare con idonee reti anti insetto le aperture delle serre; monitorare con trappole a feromone il volo dei maschi; esporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti; salvaguardare i nemici naturali, tra i quali alcuni Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma) <b>Difesa chimica</b> Soglia: presenza del fofago con le prime gallerie sulle foglie; alternare le s.a. disponibili per evitare fenomeni di resistenza	<i>Confusione sessuale</i> <i>Azadiractina</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1) <i>Spinosad</i> (2) Metaflumizone (3) Emamectina (4) Clorantniliprole (5) Tebufenozide (6)	nr 3/7 nr 3 3 3 3 3 3 3 7s	(1) Max 4 interventi all'anno (2) Max 3 interventi all'anno con spinosine (3) Max 2 interventi all'anno. (4) Max 3 interventi all'anno in presenza di Tuta absoluta (5) Max 2 interventi all'anno (6) Vedi nota sopra s = solo in serra
<b>Tarsonemidi</b> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>		<i>Sali K di acidi grassi</i>	3	

**PEPERONE**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Cimici</b> <i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> , <i>Halyomorpha halys</i>		Acetamiprid (1) <b>Deltametrina</b> Lambdacialotrina (2)	7c/3s 3 3	(1) In presenza di cimici sono ammessi 2 interventi con Acetamiprid. (2) In presenza di cimice asiatica massimo 3 piretroidi max 2 Lambdacialotrina
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare ristagni idrici - utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> - solarizzare il terreno con telo P.E trasparente di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 giorni. <b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> <b>Azadiractina</b> Fenamifos (1, 2) Oxamil (1, 3) Fluopyram (1, 4) Abamectina (5)	nr nr <b>3c / 7s</b> 60 35 3 nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Ammesso solo distribuito per irrigazione. In alternativa a Metam, Dazomet, Oxamil. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 23/09/2021 (3) Intervento localizzato tramite irrigazione con coltura in atto e formulati liquidi. Max 30 litri di f. commerciale per ciclo. In alternativa al Fenamifos. (4) Nel limite dei 2 SDHI (5) solo in coltura protetta per manichetta, in alternativa agli altri nematocidi
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis spp</i>		<i>Beauveria bassiana</i> Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1)	nr 3 nr - c	(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzati; non entrano nel limite dei piretroidi. (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo

**PEPERONE - DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Aclonifen	75 nr	(1) Vietato in coltura protetta
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone	nr - c	
<b>Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim	21	

## PISELLO - *Pisum sativum*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Patogeni tellurici</b> <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., ecc.	<b>Difesa chimica:</b> impiegare seme conciato.			
<b>Peronospora e Antracnosi</b> <i>Peronospora pisi</i> , <i>Ascochyta</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> rotazioni; impiego di varietà tolleranti o poco suscettibili; ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato; <b>Difesa chimica:</b> solo in caso di attacchi precoci	<i>Prodotti rameici</i> (1) Cimoxanil (2) Azoxystrobin (3) Fluxapiroxad (5) + Difenocin. (4) Boscalid (5)+ Pyraclostrobin (3) Pyraclostrobin (3)	3/20 10/14 14 7c 7c 28	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno con strobilurine – Azoxystrobin e Pyraclostrobin. (4) Max 2 interventi all'anno con IBE. (5) Max 2 interventi anno con SDHI – Boscalid e Fluxapiroxad
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe polygoni</i>	<b>Difesa agronomica:</b> impiego di varietà resistenti. <b>Difesa chimica:</b> solo in caso di attacco elevato.	<i>Zolfo</i> <i>Bacillus pumilus</i> Azoxystrobin (1) Penconazolo (2) Tebuconazolo (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3)	5 nr 14 14 14 7c	(1) Max 2 interventi all'anno con strobilurine (2) Max 2 interventi all'anno con IBE. Max 2 con Penconazolo; max 1, in alternativa tra loro, tra Difenocinazolo e Tebuconazolo. (3) Nel limite SDHI e strobilurine
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>		Fludioxonil Fludioxonil + Ciprodinil (1)	14c 14c	Massimo 2 interventi anno con Fludioxonil. (1) La miscela è ammessa solo su "taccola" o pisello mangiatutto, max 1 intervento anno. c = solo pieno campo
<b>VIROSI</b> PSBMV virus del mosaico trasmissibile per seme	Per il PSBMV è di fondamentale importanza l'uso di seme sano (virus-esente). Per le altre virosi, trasmissibili da afidi in tempi brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi			

## PISELLO - *Pisum sativum*

FITOFAGI				
<b>Afide verde e Afide nero</b> <i>Acythosiphon pisum</i> <i>Aphis fabae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in presenza di infestazioni diffuse e colonie in accrescimento.	<i>Piretrine pure</i> <i>Maltoestrina</i> Pirimicarb (1) Cipermetrina (2) Deltametrina (2) Lambdacialotrina (2) Tauflualinate (2) Betaciflutrin (2, 5) Spirotetramat (3) Acetamiprid (4)	4 nr 7c 7 3 7c 7c 7c 7s 14	(1) Max 1 intervento anno (2) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. Max 1 anno con Lambdacialotrina (3) Massimo 2 interventi all'anno, (4) Massimo 1 intervento anno (5) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo s = solo in serra
<b>Mamestra</b> <i>Mamestra brassicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in presenza di infestazioni diffuse, indicativamente una larva/mq.	Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1, 2) <i>Spinosad</i> (3) Emamectina (4)	7 7 7c 7c 3 3c	(1) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. Max 1 anno con Lambdacialotrina (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021 (3) Al massimo 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno

## PISELLO - **DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Gliofosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Gliofosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	nr	
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Clomazone Aclonifen Metribuzin	nr nr - c nr nr	
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Imazamox Bentazone (1) Piridate (2)	35 30 45	(1) Si sconsiglia di trattare quando la temperatura è sotto 8°-10°C o supera i 25°C. (2) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Propanil Quizalofop Quizalofop-P-etile Quizalofop etile isomero D Ciclossidim	40 42 30 35	

## POMODORO DA INDUSTRIA – *Solanum lycopersicum*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Phytophthora infestans</i>	<b>Difesa chimica:</b> - privilegiare, in fase iniziale, prodotti rameici che oltre a combattere la peronospora possiedono anche una certa azione batteriostatica; - in condizioni di elevata umidità è opportuno ricorrere a prodotti sistemici mentre in prossimità della raccolta è preferibile impiegare prodotti a breve intervallo di sicurezza.	<i>Prodotti rameici</i> * Fosetil alluminio (1) Metalaxil-M (2) Benalaxil (2) Metiram (1, 3) Cimoxanil (4) Pyraclostrobin (5) Famoxadone (5) Azoxystrobin (5) Dimetomorf (6) Mandipropamide (6) Zoxamide (7) Cyazofamid (8) Amisulbrom (8) Ametoctradina + Dimetomorf (6, 9) Ametoctradina (9) Fluazinam (10) Oxathiapiprolin (12) Propamocarb (13)	3/20 20 20 14 7 10 - 10 3 20 3 3 3 3 3 1 7 3 3	* Max 28 Kg ettaro in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 Kg di rame per ettaro all'anno (1) Impiegabile fino all'allegagione del secondo palco (2) Con fenilamidi max. 3 interventi anno. <b>Benalaxil revocato</b> . Impiego ammesso fino al 5/10/2021 (3) Max 3 interventi all'anno. (4) Max 3 interventi all'anno, in miscele (5) Con QoI (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone) max. 3 trattamenti all'anno. Con Famoxadone max 1 anno. Pyraclostrobin in miscele. (6) Con CAA (Dimetomorf, Mandipropamide) max 4 interventi all'anno. (7) Max 4 interventi all'anno (8) Max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro (9) Max 3 interventi all'anno (10) Max 2 interventi anno (12) Max 3 interventi anno (13) Solo in miscela con Cimoxanil
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> sp. <b>Septoria</b> <i>Septoria lycopersici</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano - ampie rotazioni colturali - evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni <b>Difesa chimica:</b> In zone particolarmente umide è consigliabile un trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da un altro dopo 8-10 giorni.	<i>Prodotti rameici</i> * <i>Bacillus subtilis</i> Difenoconazolo (1) Difenoconazolo + Fluxapiroxad (1) Isopyrazam (1) Metiram (2) Pyraclostrobin + Metiram (2, 3) Azoxystrobin (3, 4) Pyraclostrobin (3) + Dimetomorf (5) Zoxamide (4, 6)	3/20 nr 7 3 1 7 3 3 3 1	* Vedi nota sopra (1) Max 2 interventi all'anno con prodotti contenenti Difenoconazolo, Fluxapiroxad o Isopyrazam (2) Metiram max 3 interventi anno, fino allegagione. (3) Con QoI max. 3 trattamenti all'anno (4) Autorizzati solo per alternaria (no septoria) (5) Dimetomorf vedi nota sopra (CAA) (6) Max 4 interventi all'anno
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum coccodes</i>	<b>Criteri intervento</b> , vedi Alternaria e Septoria	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 Kg di rame per ettaro all'anno
<b>Oidio</b>		Zolfo <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <b>COS-OGA</b>	5 nr nr 0	

**Uso dei fungicidi:** nelle miscele estemporanee di fungicidi non vanno mai impiegate più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per la stessa avversità (da questa limitazione sono esclusi i prodotti rameici, Fosetil Al e i prodotti biologici). Non è ammesso in nessun caso miscelare due prodotti commerciali che contengono lo stesso principio attivo o principi attivi con lo stesso meccanismo d'azione.

## POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.		<i>Trichoderma</i> spp Propamocarb	nr/3 3 s	
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseud. syringae</i> <i>pv.tomato</i> ; <i>Xanth. campestris</i> <i>pv. Vesicat.</i> ; <i>Clavibacter michiganensis</i> <i>Pseudomonas corrugata</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano e certificato; ampie rotazioni; - concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infesta; non irrigare con acque "ferme" o con residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1) Acibenzolar S metil (2) <i>Bacillus subtilis</i>	3/20 3 nr	(1) Vedi nota sopra (2) Max. 4 interventi all'anno
<b>Avvizzimento batterico</b> <i>Ralstonia solanacearum</i> )	In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro <i>Ralstonia solanacearum</i> , segnalare ai Servizi Fitosanitari l'eventuale presenza di sintomi sospetti per eseguire accertamenti di laboratorio.			
<b>VIROSI</b> CMV, PVY, ToMV	<b>Interventi agronomici:</b> Per il trapianto impiegare piante certificate virus esenti o virus controllate o varietà tolleranti. Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (afidi e tripidi) per un loro tempestivo controllo. Accurato controllo delle erbe infestanti			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Soglia:</b> superamento della soglia di 15 larve/mq, rilevate tramite monitoraggio, o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente.	Lambdaialotrina (1) Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Cipermetrina (1)	nr - c nr - c 14 nr	(1) Max 1 trattamento localizzato l'anno, in alternativa tra loro. Questo intervento non entra nel limite dei piretroidi (2) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 30/11/2021
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	In generale, le infestazioni afidiche si esauriscono nell'arco di 10 giorni e sono controllate dagli ausiliari presenti in natura <b>Difesa chimica:</b> Zone ad alto rischio per le virosi - interventi alla comparsa delle prime colonie Zone a basso rischio di virosi - almeno il 10% delle piante infestate da colonie	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i> <i>Maltodestrina</i> Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Flonicamid (2) Spirotetramat (3) Flupyradifurone	1/3 3 3 20 nr 7 1 3 3 3	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Al massimo 2 interventi all'anno (3) Al massimo 2 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Bemisia</i> , <i>Trioleturodes</i>		<i>Piretrine pure</i> <i>Olio di arancio</i>	1/3 3	
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips</i> spp.	<b>Controllo biologico</b> Lanci di <i>Orius levigatus</i>	<i>Piretrine pure</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Beauveria bassiana</i> Spinetoram (1)	1/3 3 nr 3	(1) Massimo 2 interventi all'anno. Max 3 con spinosine.

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte terricole</b> <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: 1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari	<i>Azadiractina</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1)	3 3 3 3	(1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 trattamenti all'anno. Massimo 1 tra Lambdacialotrina, Cipermetrina, Zetacipermetrina. Max 1 anno con Etofenprox.
<b>Notte fogliari</b> <i>Heliothis o Helicoverpa armigera</i> <i>Spodoptera littoralis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in presenza delle prime larve	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 8) Cipermetrina (1) Etofenprox (1) Indoxacarb (2) Metaflumizone (3) Emamectina (4) <i>Spinosad</i> (5) Spinetoram (5) Clorantniliprole (6) <i>Virus HearNPV</i> Metossifenozide (7)	3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromoni (1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 trattamenti all'anno. Vedi nota sopra. (2) Max 4 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 1 intervento all'anno (8) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa chimica:</b> L'intervento è giustificato solo in presenza di focolai precoci di infestazioni con evidenti aree decolorate delle foglie e in assenza di predatori <b>Controllo biologico</b> Utilizzare prodotti selettivi verso i fitoseidi. Effettuare lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i>	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Olio minerale</i> Clofentezine Exitiazox Fenpiroximate Abamectina Bifenazate Etoxazole (1) Acequinocil Cyflumetofen <i>Zolfo</i> (2)	nr 3 nr 20 3 3 7 3 3 3 3 3 3	Al massimo 3 interventi all'anno - escluso Beauveria, Sali di potassio, Maltodestrine, Zolfo - contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate (1) Max 1 intervento anno  (2) Verificare la registrazione dei formulati commerciali

## POMODORO DA INDUSTRIA

AVVERSITÀ'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Cimici</b> <i>Nezara viridula</i> , <i>Palomena prasina</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	<b>Difesa chimica:</b> solo in caso di presenza diffusa e significativa. Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento, soprattutto su quelle ai lati di fossi, capezzagne e incolti.	Acetamiprid (1) Deltametrina (2) Etofenprox (2) Lambdacialotrina (2)	7 3 3 3	Limitare il trattamento, quando possibile, alle fasce perimetrali dell'appezzamento. (1) Max 1 intervento all'anno (2) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 trattamenti all'anno. Vedi nota sopra.
<b>Dorifora</b> <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	L'uso del <i>Bacillus thuringiensis</i> contro altre avversità è attivo contro le giovani larve di dorifora			
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	Possono raggiungere soglie di danno nei terreni sabbiosi. <b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni con specie poco sensibili	<i>Estratto d'aglio</i> <i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Azadiractina</i>	nr nr 3	

## POMODORO DA INDUSTRIA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Napropamide Acido pelargonico Benfluralin	nr nr nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza (Localizzato)</b>	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen (1)	Nr	(1) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, impieghabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento. In pre emergenza il diserbo deve essere localizzato sulla fila.
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Metribuzin + Flufenacet Aclonifen (1) Metribuzin Pendimetalin S-Metolaclof (2)	nr nr 30 75 nr	(1) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, impieghabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento. (2) Impieghabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.
<b>Post-emergenza e post-trapianto (localizzato)</b>	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Rimsulfuron Metribuzin	nr - 30 30	
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop etile isomero D Quizalofop-P-etile Propaquizafop Cletodim	42 21/60 30/60 30 30	



## POMODORO IN COLTURA PROTETTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Phytophthora infestans</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - in coltura protetta con pacciamatura ed irrigazione per manichetta non sono necessari trattamenti specifici. <b>Difesa chimica:</b> - inizio dei trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Fosetil-Al Metalaxil-M (2) Benalaxil (2) Metiram (3) Cimoxanil (4) Pyraclostrobin (5) Famoxadone (5) + Cimoxanil (3) Dimetomorf (6) + Rameici Mandipropamide (6) Dimetomorf (6) + Pyraclostrobin (5) Zoxamide (7) Cyazofamid (8) Amisulbrom (8) Ametotradin + Dimetomorf (6, 9) Ametotradina (9) Oxathiapiprolin (10)	3/20 20 20 14 7 10 7 10 7 3 3 3 3 3 3 1 3	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con fenilammidi max. 3 trattamenti all'anno. Benalaxil <b>revocato</b> , impiego ammesso fino al 5/10/2021 (3) Max 3 interventi all'anno. Sospendere i trattamenti 28 giorni dalla raccolta (4) Con Cimoxanil max 3 interventi all'anno (5) Con QoI (Pyraclostrobin, Famoxadone) max. 3 interventi all'anno, max 1 con Famoxadone (6) Con CAA (Dimetomorf, Mandipropamide) max. 4 interventi all'anno. (7) Max 4 interventi anno (8) Max 3 anno tra Cyazofamid e Amisulbrom (9) Ametotradina max 3 interventi anno (10) Max 3 interventi anno
<b>Alternariosi</b> <i>Alternaria solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni - eliminare la vegetazione infetta <b>Difesa chimica:</b> - inizio trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Difenocozolo (2) Pyraclostrobin (4) + Metiram (3) Azoxystrobin (4) Metiram (3)	nr 3/20 7 7 3 7	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 1, nel limite 2 IBE all'anno (3) Massimo 3 interventi all'anno. (4) QoI max 3 all'anno, vedi nota sopra
<b>Septoriosi</b> <i>Septoria lycopersici</i>	<b>Difesa chimica:</b> inizio trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Tracheomicosi</b> <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Lycopersici</i> , <i>Verticillium</i> spp		<i>Trichoderma harzianum</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (2) <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> (2)	nr nr 3	(1) Indicato per Fusarium (2) Indicati per Verticillium
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma</i> spp <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Penthiopirad (1)	nr nr/3 0 nr 3	(1) Max 1 intervento all'anno, nel limite dei 3 interventi all'anno con SDHI
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo nei semenzai.	<i>Trichoderma</i> spp Propamocarb (1) Propamocarb + Fosetil Al (1)	nr/3 3 nr	(1) Nelle prime fasi colturali

**POMODORO IN COLTURA PROTETTA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Cladosporiosi</b> <i>Cladosporium fulvum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - disinfezione delle strutture della serra - arrieggiare bene e costantemente le serre - non adottare sesti di impianto troppo fitti	Boscalid + Pyraclostrobin (1) Difenoconazolo (2) Metiram (3)	3 7 7	(1) Nel limite QoI e SDHI. (2) Con IBE max 2 interventi all'anno (3) Con ditiocarbammati max 3 interventi all'anno. Sospendere i trattamenti a 28 giorni dalla raccolta
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi.	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> COS-OGA <i>Bicarbonato di Potassio</i> <i>Zolfo</i> Boscalid (5) + Pyraclostrobin (1) Trifloxystrobin (1) + Tebuconaz. (2) Azoxystrobin (1) Difenoconazolo (2) Fluxapiroxad (5) + Difenocon. (2) Miclobutanil (2) Tebuconazolo (2) Penconazolo (2) Flutriafol (2) Ciflufenamid (3) Metrafenone (4) Bupirimate (6) Isopyrazam (5)	nr nr nr 0 1 5 3 3 3 3 7 3 3 3 3 1 3 3 1	(1) Con QoI (Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin) Fomoxadone) max 3 interventi all'anno. Vedi nota sopra (2) Con IBE max 2 interventi all'anno . Max 1 intervento in alternativa fra loro fra Difenoconazolo, Miclobutanil, Tebuconazolo. (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 3 interventi all'anno con SDHI – Boscalid, Fluxapiroxad, Fluopyram, Penthiopirad, Isopyrazam -. (6) Max 2 interventi all'anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiamento della serra. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Cerevisane</i> <i>Trichoderma atroviride</i> SC1 Fenexamide (1) Fenpirazamina (1) Fludioxonil (2) Ciprodinil + Fludioxinil (2) Pyrimethanil (3) Boscalid (6) + Pyraclostrobin (4) Penthiopirad (5, 6) <i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bacillus subtilis</i>	nr nr 0 nr nr nr - s 3 3 3 3 3 3 3 3 3/20 nr	Max 2 interventi su botrite con prodotti di sintesi (1) Max 2 interventi anno fra Fenexamide e Fenpirazamina (2) Max 2 interventi anno con Fludioxonil (3) Max 3 interventi anno, nel limite dei 3 interventi tra Ciprodinil e Pyrimethanil. (4) Con QoI max 3 interventi all'anno. (5) Max 1 intervento all'anno (6) Max 3 interventi all'anno con SDHI – Boscalid, Fluxapiroxad, Fluopyram, Penthiopirad -.
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> , <i>Clavibacter michiganensis</i> , <i>Pseudomonas corrugata</i>				(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

## POMODORO IN CULTURA PROTETTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>VIROSI</b> CMV, PVY, ToMV	Non sono previsti trattamenti specifici			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Minatrici fogliari</b> <i>Liriomyza</i> spp.	<b>Difesa biologica:</b> introduzione precoce del parassitoide <i>Dyglyphis isaea</i> , con lanci ripetuti, fino ad un totale di 0,5 – 2 individui al mq. <b>Difesa chimica:</b> in caso di scarsa parassitizzazione	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Cirimazina (2) Abamectina (3)	3 3 14s 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) <b>Revocato</b> . Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento. (3) Max 2 interventi all'anno. Max 3 complessivi tra Emamectina e Abamectina
<b>Cimice verde</b> <i>Nezara viridula</i>	<b>Difesa chimica:</b> solo in caso di presenza diffusa e significativa. Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento, soprattutto su quelle ai lati di fossi, capezzagne e incolti.	Acetamiprid (1) Lambdacialotrina (2)	3 3	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno. Max 1 anno per Lambdacialotrina
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natura. Per l'afide verde è efficace il parassitoide <i>Aphidius colemani</i> . <b>Difesa chimica:</b> Zone ad alto rischio per le virosi - interventi alla comparsa delle prime colonie Zone a basso rischio di virosi - almeno il 10% delle piante infestate da colonie	<i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> Maltodetrina Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Flonicamid (2) Spirotetramat (3) Flupyradifurone	3 1/3 nr 3 1 3 3 3	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Interventi meccanici:</b> si possono installare idonee reti all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti <b>Controllo biologico:</b> posizionare trappole cromotropiche gialle, 1 ogni 100 mq. Alle prime catture di <i>T. vaporariorum</i> effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> . Alle prime catture di <i>Bemisia tabaci</i> effettuare lanci di <i>Macrolophus caliginosus</i> o di <i>Eretmocerus mundus</i> . Anche <i>Amblyseius swirskii</i> è utile per aleurodidi e tripidi <b>Difesa chimica:</b> - nelle aree a forte rischio di virosi, intervenire all'inizio delle infestazioni - nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Maltodetrina Acetamiprid (1) Sulfoxaflor Pyriproxyfen (2) Flonicamid (3) Spiromesifen (4) Spirotetramat (5) <i>Olio essenziale di arancio</i> Flupyradifurone Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3 nr 3 1/3 3 3 nr 3 1 3 3 3 3 nr 3 s	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi anno (5) Max 2 interventi all'anno

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## POMODORO IN CULTURA PROTETTA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Controllo biologico:</b> installare trappole cromotropiche di colore azzurro, 1 ogni 50 mq; effettuare lanci con <i>Amblyseius swirskii</i> , efficace anche su aleurodidi. Efficaci anche <i>Ortus</i> spp <b>Difesa chimica:</b> intervenire con insufficiente presenza di predatori	<i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Lufenuron (2) Abamectina (3) Acrinatrina (4) Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	1/3 nr 3 nr 3 3 3 7 3 - nr 3 s	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento. (3) Max 2 interventi all'anno. Max 3 complessivi tra Emamectina e Abamectina (4) Nel limite dei 2 piretroidi all'anno
<b>Nottue fogliari</b> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Heliothis armigera</i> (o <i>Helicoverpa armigera</i> ) <i>Chrysodeix calcite</i>	Si consiglia di controllare l'andamento dei voli con trappole a feromoni posizionate una per serra e per specie per segnalare l'inizio dell'infestazione <b>Difesa chimica:</b> - si consiglia di intervenire all'inizio dell'infestazione	<i>Bacillus thuringensis</i> Indoxacarb (1) <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Deltametrina (3) Lambdacialotrina (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6) <i>Virus SpltNPV</i> (7) <i>Virus HaNPV</i> (8) Lufenuron (9) Metossifenozide (10) Tebufenozide (10)	3 3	(1) Max 4 interventi all'anno (2) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (3) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 con Lambdacialotrina. (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno in assenza di Tuta assoluta (6) Max 2 interventi all'anno (7) Specifico per <i>Spodoptera littoralis</i> (8) Specifico per <i>Heliothis armigera</i> (9) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento. (10) Max 2 interventi, in alternativa tra loro. Metossifenozide max 1 intervento
<b>Tignola del pomodoro</b> <i>Tuta absoluta</i>	<b>Interventi meccanici, biologici e biotecnici:</b> - schermare con idonee reti antiinsetto le aperture delle serre - monitorare con trappole a feromone il volo dei maschi - eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti - salvaguardare i nemici naturali, tra i quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassito idi, <i>Tricogramma</i> spp.. Lanci di <i>Nesidiocoris tenuis</i> <b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza del fitofago con le prime gallerie sulle foglie Alternare le s.a. disponibili per evitare fenomeni di resistenza	<i>Confusioe sessuale</i> <i>Azadiractina</i> (1) <i>Bacillus thuringensis</i> Indoxacarb (2) <i>Spinosad</i> (3) Emamectina (4) Metaflumizone (5) Clorantraniliprole (6) Tebufenozide (7) Cyantraniliprole + Acibenzolar	nr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(1) Impiegabile in fertirrigazione (2) Max 4 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 3 interventi all'anno con presenza di Tuta assoluta. Max 3 complessivi tra Emamectina e Abamectina (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Vedi nota sopra

**POMODORO IN COLTURA PROTETTA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa biologica:</b> - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie; almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta e per lancio. Distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento aficida <b>Difesa chimica:</b> - in presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di predatori	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali K di acidi grassi</i> Maltodestrina Exitiatoz (1) Bifenazate Clofentezine Etoxazole (2) Pyridaben Spiromesifen (3) Acequinocil Tebufenpirad Abamectina (4) Terpenoid blend QRD 460	nr 3 nr 3 15 3 3 3 3 3 3 nr - s	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate  (1) Presenta buona selettività nei confronti dei fitoseidi. (2) Max 1 intervento anno (3) Max 2 interventi anno (4) Massimo 3 interventi anno tra Abamectina ed Enamectina
<b>Eriofidi</b> <i>Aculops lycopersici</i>		Abamectina (1) Spiromesifen (2)	3 3	(1) Vedi nota sopra (2) Max 2 interventi anno
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare ristagni idrici - utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> - solarizzare il terreno con telo P.E trasparente dello spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 giorni. <b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Paeclomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i> <i>Azadiractina</i> Fenamifos (1, 2) Oxamil (1, 3) Fosthiazate (1, 4) Fluopyram (1, 5) Abamectina (6)	nr nr 3 60 28 nr 3 nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Applicazioni per irrigazione a goccia, in alternativa a Dazomet, Metam, Oxamil, Fosthiazate. Fenamifos <b>revocato</b> . Impiego ammesso fino al 23/09/2021 (3) In alternativa al Fenamifos e Fosthiazate (4) Intervento localizzato in alternativa a Dazomet, Metam, Oxamil, Fenamifos. (5) Max 3 interventi anno con SDHI (6) Impiego per irrigazione a goccia o manichetta in alternativa agli altri nematocidi
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Pseudomonas ceppo DSMZ</i>	nr nr 3 1	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio

**POMODORO CULTURA PROTETTA - DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

## PORRO - *Allium porrum*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUS.	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Phytophthora porri</i>	<b>Interventi agronomici:</b> limitare le concimazioni azotate; ridurre le irrigazioni; distruggere i residui colturali infetti <b>Difesa chimica:</b> - va iniziata quando si verificano condizioni meteorologiche favorevoli all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare, umidità relativa elevata, temperatura media sui 20°C).	<i>Prodotti rameici</i> (6) Azoxystrobin (2) Cymoxanil (3) Mancozeb (4) Pyraclostrobin (2) + Dimetomorf	3/20 15 10 28 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 3 interventi anno con strobilurine - Azoxystrobin e Pyraclostrobin - (3) Max 3 interventi all'anno (4) <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. Max 3 interventi anno.
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i>	<b>Interventi agronomici</b> - concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo c = solo pieno campo
<b>Ruggine</b> <i>Puccinia porri</i>	<b>Interventi agronomici</b> - lunghe rotazioni; distruzione residui infetti	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2)	3/20 15	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 3 interventi anno con strobilurine
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria porri</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3)	3/20 15 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 3 interventi anno con strobilurine (3) Max 2 anno, nel limite 3 strobilurine.
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca</b> <i>Delia antiqua</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: primi danni	Deltametrina (1)	7	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno
<b>Mosca</b> <i>Napomyza gymnotoma</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: primi danni	<i>Spinosad</i> (1)	7	(1) Max 3 interventi all'anno
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i>	<b>Soglia:</b> presenza di focolai su piantine giovani, in colture estivo-autunnali	<i>Olio essenziale di arancio</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Abamectina (3)	3 7 14c/21c 7 7c	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 con Lambdacialotrina (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Ragno rosso</b>		Abamectina (1)	7c	(1) Max 2 interventi anno
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis spp</i>	<b>Interventi agronomici :</b> rotazioni. L'uso di calcio cianamide come fertilizzante riduce il rischio di danni			

## PORRO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>				
<b>Pre trapianto</b>	Dicotiledoni e monocotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato - in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre-trapianto, preemergenza, postemergenza</b>	Dicotiledoni e monocotiledoni	Pendimetalin	nr	Verificare registrazione formulati commerciali
<b>Post trapianto</b>	Dicotiledoni	Piridate	28	Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
<b>Post emergenza</b>	Graminacee annuali	Ciclossidim	42	

**PREZZEMOLO – *Petroselinum crispum* (sinonimi: *P. sativum*; *P. ortense*)**

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Septoriosi</b> <i>Septoria petroselini</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare avvicendamenti di almeno 2 anni; utilizzare varietà tolleranti; utilizzare seme sano o conciato; allontanare i residui colturali infetti <b>Difesa chimica:</b> - intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura fogliare) o ai primi sintomi; - dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando turni di 7 - 10 gg. in relazione all'andamento climatico	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Pyraclostrobin (2) + Dimetomorf	3/20 7 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 3 interventi all'anno
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe umbrelliferarum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare varietà tolleranti <b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Bicarbonato di potassio</i>	5 3 1	
<b>Alternariosi</b> <i>Alternaria radicina</i> <i>var. petroselini</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare elevate densità d'impianto - utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano <b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) <i>Bicarbonato di potassio</i>	3/20 10 1	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 1 intervento per ciclo colturale.
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare avvicendamenti ampi - evitare eccessi di azoto - evitare elevate densità d'impianto	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Pyraclostrobin (1) + Boscalid Fenexamide (2) Fludioxonil (3) Fludioxonil (3) + Ciprodinil	nr nr 3 nr nr - s 14 3 7 7	(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 3 interventi all'anno. Max 2 interventi all'anno con la miscela (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare avvicendamenti ampi; evitare ristagni idrici; - allontanare e distruggere le piante malate - ricorrere alla solarizzazione	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr nr nr - s nr 1	s = solo in serra
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Propamocarb (1)	nr nr - s nr	(1) Preparazione dei semenzai

## PREZZEMOLO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>BATTERIOSI</b> ( <i>Erwinia carotovora subsp. caratovora</i> , <i>Pseudomonas marginalis</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infette; concimazioni azotate equilibrate; sconsigliato irrigare con acque "ferme" o che contengono residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV Virus del Mosaico del Cetriolo CeMV Virus del Mosaico del Sedano RLV	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare piante sane; eliminare le piantine virosate - eliminare le ombrellifere spontanee - effettuare ampie rotazioni colturali Per le virosi CMV e CeMV, trasmesse da afidi in tempi brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca del sedano</b> <i>Philophylla heraclei</i>	<b>Difesa chimica:</b> - non sono ammessi interventi			
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	<b>Controllo biologico:</b> Introdurre <i>Diglyphus isaea</i> , con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq <b>Difesa chimica:</b> - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione. Si consiglia di installare trappole cromotropiche i colore giallo per il monitoraggio	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Acetamiprid (2)	7 3 10c/5s	(1) Al massimo 3 interventi all'anno con spinosine (2) Max 1 per ciclo, max 2 all'anno
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra</i> spp., <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Heliothis armigera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Deltametrina (2) Clorantnilprole (3) Metossifenozide (4)	3 7 3 3 3c 3 3c	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno. (4) Max 1 intervento all'anno c = solo pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità



## PREZZEMOLO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte terricole</b> <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. segetum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Azadiractina</i>	7	
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Dysaphis spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di forte infestazione	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Acetamiprid (1)	1 7 nr 10c/5s	(1) Max 1 per ciclo, max 2 all'anno
<b>Limacce e Lumache</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Tripidi</b>		<i>Spinosad</i> (1) Terpenoid blend QRD 460	3 nr - s	(1) Al massimo 3 interventi anno, nel limite 3 spinosine
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i> <b>Nematodi fogliari</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampi avvicendamenti; impiegare piante sane; - utilizzo di panelli di semi di brassica <b>Interventi fisici:</b> - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	nr	

## PREZZEMOLO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico <b>Benfluralin (1)</b>	nr nr nr - c	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. <b>c = solo pieno campo</b>
<b>Post emergenza</b> <b>Post trapianto</b>	Graminacee	Quizalofop-p-etil Ciclossidim	28 28	

**RADICCHIO - *Cichorium intybus***  
**Radicchio rosso di Chioggia, R. variegato di Lusina, R. variegato di Castelfranco, R. rosso di Verona, R. rosso di Treviso**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria porrii</i> f. sp. <i>cichorii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - si consiglia la concia delle sementi con prodotti biologici nel caso di utilizzo di seme aziendale.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Cercosporiosi</b> <i>Cercospora longissima</i>	<b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - comparsa primi sintomi	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1) Fluxapyroxad + Difenoconazolo (2)	5 7 14c	(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 3 interventi all'anno. (2) Max 1 intervento anno
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - aerare serre e tunnel; limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; eliminare le piante ammalate;	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma</i> spp <i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1	nr nr nr 3 nr nr	Contro questa avversità, max 2 interventi per ciclo, 3 per cicli lunghi, con sostanze di sintesi  (1) Max 1 intervento anno (da etichetta) (2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 3 interventi all'anno.
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ Boscalid + Pyraclostrobin (1) Azoxystrobin (2) Fenexamid (3) Fludioxonil (4) Cyprodinil + Fludioxonil (4) Fluxapyroxad + Difenoconazolo (5)	nr 1 21c 7 3 7 7 14c	(3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil (5) Max 1 intervento anno
<b>Rizotonia</b> <i>Rhizoctonia</i> spp				
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium tracheiphilum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni - irrigazioni equilibrate	<i>Trichoderma</i> spp Propamocarb + Fosetil AI (1)	nr/3 nr	(1) Ammesso in semenzaio e contenitori alveolari
<b>Peronospora</b> <i>(Bremia lactucae)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni, ampi sestri di impianto, uso di varietà resistenti. <b>Difesa chimica:</b> Può essere necessaria solo in condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisane</i> Fosetil-AI Azoxystrobin (2) Metalaxil-M + Rame (3) Mandipropamide (4) Dimetomorf (4) Ametotradina (5)	3/20 nr nr 14 7 10/15 7 7 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 3 interventi all'anno. (3) Massimo 3 interventi all'anno, nel limite dei rameici (4) Max 4 interventi all'anno con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf. (5) Massimo 2 interventi all'anno c = solo pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## RADICCHIO

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>BATTERIOSI</b> <i>Erwinia carotovora</i> <i>Pseudomonas cichorii</i>	<b>Interventi agronomici</b> - ampie rotazioni (4 anni); concimazione azotate equilibrate; non utilizzare acque "ferme" o contenenti residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (2)	3/20 nr	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Indicato per <i>Pseudomonas cichorii</i>
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in caso di necessità, con 4-6 individui per foglia	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Maltodestrina</i> Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 3) Deltametrina (1) Spirotetramat (2)	0 nr 1 nr 14c 14 3c 7	(1) Con Piretroidi max. 4 interventi per ciclo. Con Lambdacialotrina max 1 intervento all'anno. Etofenprox max 2 all'anno. Zetacipermetrina max 1 all'anno. (2) Max 2 interventi all'anno. (3) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire con presenza accertata	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) Acrinatrina (2) Etofenprox (2) Abamectina (3) Terpenoid blend QRD 460 Formetanato (4)	0 3s 14c 7 7c nr - s nr - c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Piretroidi vedi nota sopra (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 1 intervento all'anno  s = solo in serra c = solo pieno campo
<b>Ragno rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: 4 individui per foglia fino alla VIII <sup>a</sup> foglia.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> Abamectina (1) Terpenoid blend QRD 460 Etofenprox (1)	0 nr 7c nr - s 7	(1) Max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno  c = solo pieno campo s = solo in serra (1) Piretroidi max 4 per ciclo. Etofenprox max 2 all'anno
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: presenza	Etofenprox (1)	7	(1) Piretroidi max 4 per ciclo. Etofenprox max 2 all'anno
<b>Noctue</b> <i>Agrotis segetum</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> <i>Spodoptera spp</i>	<b>Interventi agronomici</b> - monitorare le popolazioni con trappole a feromoni <b>Difesa chimica:</b> - intervenire nelle prime fasi di infestazione Soglia: 5% di piante colpite	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) Zetacipermetrina (2, 7) Etofenprox (2) Indoxacarb (3) Emamectina (4) Clorantprilprole (5) Tebufenozide (6)	3 3s 14 7 3 3 3 14c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Piretroidi, vedi nota sopra (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 1 intervento all'anno (7) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021  s = solo in serra
<b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>		Emamectina (1)	3	(1) Max 2 interventi all'anno

## RADICCHIO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Liriomyza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>	<b>Interventi agronomici</b> - utilizzare trappole cromotropiche in serra	<i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Abamectina</i> (2)	7 3s 7c	(1) Max 3 interventi anno con spinosine (2) Max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato Ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp		Lambdacialotrina (1) Teflutrin (1)	nr - c nr - c	(1) Localizzati. Max 1 all'anno in alternativa tra loro. Non rientra nel limite dei piretroidi. c = solo pieno campo

## RADICCHIO IN PIENO CAMPO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre semina</b> <b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre semina</b> <b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin (1) Propizamide (2) Pendimetalin	nr nr nr	(1) Solo pieno campo (2) Anche post semina. Per indicazioni più precise relative alle epoche di impiego, vedi etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-P-etile Quizalofop etile isomero D (2)	21 15/60 60	Per migliorare l'azione miscelare con bagnante. (2) Verificare autorizzazione formulati commerciali

## RAPA BIANCA E ROSSA – Brassica rapa

AVVERSAITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora brassicae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; favorire il drenaggio; impiegare sementi sane; impiegare varietà resistenti; allontanare le piante e le foglie infette; distruggere i residui della vegetazione <b>Difesa chimica</b> I trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti, alta umidità, temperature non molto alte)	<i>Prodotti rameici (1)</i>	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo.
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; impiegare seme conciato; concimazioni equilibrate - distruggere i residui delle piante infette <b>Difesa chimica</b> - si può intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici (1)</i>	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Marciumi Basali</b> <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma</i> spp	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; impiegare seme conciato; concimazioni equilibrate; limitare le irrigazioni ed evitare i ristagni idrici; distruggere i residui della vegetazione; densità delle piante non elevata	<i>Coniothyrium minitans (1)</i> <i>Trichoderma asperellum</i>	nr nr	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura. Indicato per <i>Sclerotinia</i>
<b>Ruggine Bianca</b> <i>Albugo candida</i>		<i>Prodotti rameici (1)</i>	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>BATTERIOSI</b> <i>Xanthomonas campestris</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per aspersione - evitare ferite alle piante durante i periodi umidi; - eliminare la vegetazione infetta	<i>Prodotti rameici (1)</i>	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca</b> <i>Delia = Hylemya radicum</i>	<b>Interventi agronomici</b> - distruzione dei residui della coltura invernale; eliminazione delle crucifere infestanti - lavorazione dell'interfila per limitare la fuoriuscita degli adulti in aprile <b>Difesa chimica</b> - bagnare la base della pianta			

### RAPA BIANCA E ROSSA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile	nr 30	

## RAVANELLO – *Raphanus sativus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora brassicae</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampi avvicendamenti colturali; impiegare seme sano; allontanare le piante ammalate <b>Difesa chimica:</b> in caso di attacchi precoci	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>olio essenziale di arancio</i> <i>Mandipropamide</i> (2)	3/20 3	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) <b>Massimo 2 interventi per ciclo</b>
<b>Alternariosi</b> <i>Alternaria raphani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> rotazioni; impiego di seme sano allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca del cavolo</b> <i>Delia = Hylemya radicum</i>	Non ci sono prodotti registrati per questa avversità			Interventi contro gli afidi e nottue sono efficaci anche contro questa avversità
<b>Afidi</b>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in caso di infestazione generalizzata	<i>Maltodestrina</i> <i>Deltametrina</i> (1) <i>Lambdacialotrina</i> (1) <i>Cipermetrina</i> (1)	nr 7 3c 3	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Max 1 con Lambdacialotrina. Max 1 con Cipermetrina c = solo pieno campo
<b>Nottue fogliari</b>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in caso di infestazione generalizzata	<i>Lambdacialotrina</i> (1) <i>Cipermetrina</i> (1) <i>Clorantropilprole</i> (2)	3c 3 21c	(1) Piretroidi vedi nota sopra (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Altica</b> <i>Phyllotreta</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire In caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino	<i>Deltametrina</i> (1)	7	(1) Piretroidi vedi nota sopra
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Cantareus a. Helicella</i> , <i>Limax</i> spp. <i>Agriolimax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - trattare alla comparsa	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	
<b>Nematodi a cisti</b> <i>Heterodera schachtii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - il ravanello è una pianta ospite di <i>H. schachtii</i> e quindi non può essere coltivata in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero. Utilizzare terreni esenti da <i>H. schachtii</i>			

## RAVANELLO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Fluazifop-p-butile Ciclossidim Quizalofop-p-etile	30 35 30	Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti consigliati in etichetta.

## RUCOLA – *Eruca sativa*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora</i> spp <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni; favorire il drenaggio del suolo; uso di varietà resistenti; distruggere i residui delle colture ammalate - aerare serre e tunnel <b>Difesa chimica:</b> In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisane</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Mandipropamide (3) Metalaxil-M + Rame (1, 4) Dimetomorf + Rame (3) Dimetomorf (3) Ametoctradina (5)	nr - s 3/20 7 7 20 7c 7 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo. Efficaci anche contro le batteriosi (2) Con strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin) max 3 interventi anno. (3) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf - max 4 interventi all'anno, in alternativa tra loro (4) Massimo 2 interventi per ciclo, 3 anno (5) Massimo 2 interventi anno
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni; impiego di seme sano - allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (2)	3/20 20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Al massimo 2 interventi per ciclo, 3 anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiamento della serra; irrigazione per manichetta; <b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Pythium oligandrum</i> ceppo MI <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Pyraclostrobin + Boscalid (1) Fenexamid (2) Fludioxonil (3) Cyprodinil + Fludioxonil (3) Penthiopirad (4)	0 nr 14 3 7 7 7c	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil (4) Max 1 intervento all'anno. Massimo 3 interventi all'anno con SDHI – Boscalid, Penthiopirad - c = solo pieno campo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1)	5 7	(1) Con strobilurine massimo 3 interventi anno
<b>Fusarium</b> <i>Fusarium oxysporum</i>		<i>Trichoderma harzianum</i>	nr	
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia</i> spp. <b>Rhizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare varietà poco suscettibili; rotazioni con specie poco suscettibili; aerare le serre; limitare le irrigazioni; evitare ristagni idrici; evitare di lesionare le piante; eliminare le piante ammalate; ricorrere alla solarizzazione; effettuare pacciamature e prosature alte <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> (2) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (2) <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3) Fenexamid (2, 4) Cyprodinil + Fludioxonil (5)	nr nr nr 3 nr nr 1 14 3 7	(1) Indicato per <i>Sclerotinia</i> (2) Autorizzati solo per <i>Sclerotinia</i> (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil

## RUCOLA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Fusarium</b> <i>Fusarium oxysporum</i>	Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr nr - s	
<b>Pythium</b> <i>Pythium</i> spp		<i>Trichoderma asperellum</i> Propamocarb + Fosetil (1)	nr nr	(1) Trattamento ai semenzai
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Deltametrina (1) Acetamiprid (2) Spirotetramat (3)	1 0 7 nr 3 10c/5s 7	(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi per ciclo. Etofenprox max 2 anno. Lambdacialotrina max 1 anno. (2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Altiche</b> <i>Phyllotreta</i> spp.	<b>Difesa chimica</b> Soglia: Presenza	Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1, 2) Acetamiprid (3)	3 7 10c/5s	(1) Vedi nota piretroidi (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Interventi meccanici:</b> - utilizzare idonee reti per schermare le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli aleurodidi; esporre pannelli gialli in vischiati di colla per il monitoraggio degli adulti <b>Interventi fisici:</b> - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti <b>Difesa chimica:</b> - presenza	<i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Terpenoid blend QRD 460	nr 0 7 nr - s	s = solo in serra
<b>Tentredini</b> <i>Athalia rosae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1)	3	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Nottue fogliari</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Phalonia contractana</i> , <i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1) Etofenprox (1) <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Metaflumizone (3) Emamectina (4) Clorantraniliprole (5) Metossifenozide (6) Tebufenozide (6)	3 7 3 7 3 3 3 3 3c 14c	(1) Vedi nota piretroidi (2) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 1 intervento all'anno, in alternativa tra loro



## RUCOLA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acrinatrina (1) Abamectina (2) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Etofenprox (4) Terpenoid blend QRD 460 Terpenoid blend QRD 460	0 14c 14 3 3 7 nr - s nr - s	(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi per ciclo. (2) Al max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno (3) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (4) Max 2 interventi anno. Vedi anche nota piretroidi
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i>	Non ci sono prodotti registrati per questa avversità			
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. <b>Difesa chimica</b> Soglia: presenza.	Etofenprox (1)	7	(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi per ciclo. Etofenprox max 2 all'anno
<b>Liriomiza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle <b>Difesa chimica</b> - accertata presenza di mine sottopidermiche o punture di nutrizione e/o ovodeposizioni.	Abamectina (1) <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (2)	14c 7 3	Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale (1) Max 1 intervento per ciclo colturale (2) Max 3 interventi all'anno con spinosine
<b>Mosca</b> <i>Delia= Hylemya radicum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate	Deltametrina (1)	3	(1) Con piretroidi ed etofenprox max 2 interventi per ciclo
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Cantareus a.</i> <i>Helicella</i> , <i>Limax</i> spp. <i>Agriolimax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

## RUCOLA – DISERBO (ammesso solo in pieno campo)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b> <b>Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin (1) Glifosate Acido pelargonico	nr nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. <b>(1) Solo pieno campo</b>
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim	21	

## SCALOGNO – *Allium ascalonium*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora schleideni</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accurato drenaggio del terreno</li> <li>- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili</li> <li>- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani</li> </ul> <p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni di temperatura e umidità risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-10 giorni in relazione alla persistenza del prodotto e all'andamento climatico</li> </ul>	<p><i>Prodotti rameici</i> *</p> <p>Azoxystrobin (1) Pyraclostrobin(1) + Dimetomorf (3) Zoxamide (2) Zoxamide (2) + Dimetomorf (3)</p>	<p>3/20 7 14 14 14c</p>	<p>* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo. Prodotti rameici efficaci anche contro la ruggine (1) Con strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin) max 3 interventi all'anno in alternativa tra loro (2) Max 3 interventi anno con prodotti contenenti Zoxamide (3) Max 3 interventi anno con prodotti contenenti Dimetomorf.</p>
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis squamosa</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accurato drenaggio del terreno</li> <li>- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani</li> <li>- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili</li> </ul>	<p>Boscalid + Pyraclostrobin (1) Fludioxonil + Ciprodinil (2)</p>	<p>14 21c</p>	<p>(1) Con strobilurine (Azoxystrobin, Pyraclostrobin) max 3 interventi all'anno in alternativa tra loro (2) Massimo 1 intervento anno. c = solo pieno campo</p>
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - evitare il ritorno della coltura su terreno contaminato per almeno 8-10 anni - impiego di semi e bulbi sani - ricorso a varietà tolleranti</p> <p>- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati</p>			
<b>Batteriosi</b> <i>Erwinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rotazioni; effettuare concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per asperione; non irrigare con acque "ferme" o contenenti residui organici; allontanare e distruggere le piante infette</li> <li>- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta prima della loro conservazione in magazzino</li> </ul>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p>	<p>3/20</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo</p>

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## SCALOGNO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosche dei bulbi</b> <i>Delia antiqua</i> , <i>Delia platura</i>	Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni, su coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccettabili diradamenti della coltura.			
<b>Tripide</b> <i>Thrips tabaci</i>	<b>Intervenire chimici</b> Intervenire alla presenza	<i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Spinosad</i> (1) Cipermetrina (2) Deltametrina (2) Betaciflutrin (2, 4) Acrinatrina (2) Spirotetramat (3)	3 7 3c 7 21c 3 7c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. Cipermetrina max 1 anno. (3) Max 2 interventi anno (4) <b>Revocato</b> . Impiego ammesso fino al 20/07/2021 c = solo pieno campo
<b>Afidi</b> <i>Myzus ascalonicus</i>	<b>Soglia</b> Presenza diffusa su giovani impianti.	<i>Maltodestrina</i> Betaciflutrin (1)	nr 21c	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno. <b>Revocato</b> . Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Nematodi fogliari</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi - si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) - si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)			

## SCALOGNO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Gliofosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Gliofosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre o post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen	nr	
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Bromoxynil (1) Clopiralid Piridate	nr nr 21c	(1) Interventi con microdosi. Max 2,25 kg/ha/anno
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Propaquizafop	28 30 30	

**SEDANO – *Apium graveolens* var. *dulce***

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Septoriosi</b> <i>Septoria apiicola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni (almeno 2 anni); - utilizzare seme sano e varietà tolleranti; - eliminare la vegetazione infetta <b>Difesa chimica:</b> - intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C e prolungata bagnatura fogliare), dalla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Difenocanazolo (3) Boscalid+Pyraclostrobin (2)	3/20 7 21 14c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo, max 4 all'anno. (3) Max 2 interventi per ciclo e massimo 3 all'anno c = solo pieno campo
<b>Cercosporiosi</b> <i>Cercospora apii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Azoxystrobin (2) Azoxystrobin + Difenocanazolo (3)	3/20 7 21c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Nel limite strobilurine (Azoxystrobin e Pyraclostrobin) (3) Nel limite Difenocanazolo e strobilurine
<b>Marciumi</b> <i>Sclerotinia</i> spp <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni; evitare eccessi di azoto; evitare ristagni idrici; evitare elevate densità d'impianto; allontanare le piante colpite	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr nr nr 3	(1) Indicato per <i>Sclerotinia</i>
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pithium</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici, rotazioni	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr nr 3	
<b>BATTERIOSI</b> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> , <i>Pseudomonas marginalis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infette-sconsigliato irrigare con acque "ferme" o contenenti residui organici <b>Interventi chimici:</b> - intervenire prima della chiusura del cespo	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIOSI</b> CMV, CeMV	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare piante sane; eliminare le piantine virosate; eliminare le ombrellifere spontanee, per CeMV; effettuare ampie rotazioni colturali, con interruzione della coltura per CeMV Per le virosi CMV e CeMV, trasmesse da afidi in tempi brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi			

**SEDANO**

AVVERSA' FITOFAGI	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Afidi</b> <i>Semiotaphis dauci</i> , <i>Cavariella aegopodi</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di infestazione diffusa	<i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Lambdacialotrina (1)	7 nr 7c	(1) Max. 1 intervento anno. Efficace anche nei confronti dei Miridi
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	Adottare strategie di difesa che non favoriscono lo sviluppo dell'avversità	Abamectina Terpenoid blend QRD 460	10c nr - s	Max 3 interventi per anno c = solo pieno campo
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in presenza del parassita	<i>Spinosad</i> (1) Abamectina (2) Terpenoid blend QRD 460	7 10c nr - s	(1) Al massimo 3 interventi all'anno (2) Max 3 interventi per anno
<b>Mosca del sedano</b> <i>Philophylla heraclei</i>	<b>Difesa chimica:</b> solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate	<i>Azadiractina</i> Abamectina (1)	7 10c	(1) Max 3 interventi anno
<b>Mosca minatrice</b> <i>Lyriomyza</i> spp	<b>Controllo biologico:</b> lanci del parassita <i>Diglyphis isaea</i> Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio <b>Difesa chimica:</b> se si riscontrano mine o punture di ovo deposizione e/o alimentazione	<i>Azadiractina</i>	7	Al massimo 2 interventi contro questa avversità
<b>Nottue fogliari</b> <i>Mamestra</i> spp <i>Spodoptera</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Clorantniliprole (2)	3 7 7 3c	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Massimo 2 interventi all'anno. c = solo pieno campo
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. segetum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata			
<b>Limacce e Lumache</b> <i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

**SEDANO IN PIENO CAMPO - DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina o Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre trapianto</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin	60	

## SPINACIO – *Spinacia oleracea*

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora farinosa</i>	<b>Interventi agronomici:</b> rotazioni; impiego di seme sano o conciato; allontanamento delle piante o delle foglie colpite; ricorso a varietà resistenti ; distruzione dei residui delle colture ammalate <b>Difesa chimica:</b> la difesa va iniziata quando si verificano condizioni meteorologiche favorevoli all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare) <b>Interventi agronomici:</b> aerare le serre; irrigazione per manichetta; sesti d'impianto non fitti <b>Difesa chimica:</b> i trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico e delle condizioni predisponenti	<i>Prodotti rameici</i> (1) Cimoxanil (2) Fosetil Al (3) Fluopicolide + Propamocarb (4) Pyraclostrobin+Dimetomorf (5) Mandipropamide (5) Ametoctradina (6)	3/20 10 20 14c 14c 7 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Massimo 2 interventi per ciclo (3) Solo in miscele (4) Al massimo 2 interventi all'anno (5) Nel limite di 3 interventi anno tra Dimetomorf e Mandipropamide (6) Massimo 2 interventi anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> aerare le serre; irrigazione per manichetta; sesti d'impianto non fitti <b>Difesa chimica:</b> i trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico e delle condizioni predisponenti	<i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Pyraclostrobin + Boscalid (1) Penthiopirad (2) Fludioxonil (3)	0 14 7c 7	(1) Massimo 2 interventi all'anno (2) Massimo 1 intervento all'anno (3) Massimo 2 interventi all'anno c = solo pieno campo
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i>	5	
<b>Marciume basale</b> <i>Phoma lycopersici</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Thielaviopsis basicola</i>	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; concimazioni equilibrate; accurato drenaggio; raccolta e distruzione dei residui infetti; evitare sesti d'impianto troppo fitti	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr 3	(1) Per il controllo di <i>Sclerotinia</i> .
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp	<b>Interventi agronomici</b> - evitare ristagni idrici, ampie rotazioni	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	nr 3	
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> <i>f.sp. spinaciae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni; impiego di seme sano o conciato; ricorrere a varietà poco suscettibili <b>Difesa chimica:</b> - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo. Attivi anche contro cercospora
<b>VIROSI</b> CMV				
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor	0 nr 1 7 10c 10c - c	(1) Tra Lambdacialotrina ed Etofenprox max 3 anno. Lambdacialotrina max 2 anno; Etofenprox max 2 anno. (2) Massimo 2 interventi all' anno. c = solo pieno campo

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## SPINACIO

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Noctue fogliari</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Lambdacialotrina (1) Etofenprox (1) Indoxacarb (2) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) <i>Virus SpilNPV</i> (4) Metossifenozide (5) Clorantriliprole (6)	3 7 10c 7 10 3 3 3 3c 3	(1) Vedi nota piretroidi (2) Max 3 interventi all'anno (3) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (4) Specifico per <i>Spodoptera littoralis</i> (5) Max 1 intervento all'anno (6) Max 2 interventi all'anno c = solo pieno campo
<b>Liriomiza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	Non ci sono prodotti registrati			
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in presenza del parassita	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Terpenoid blend QRD 460	0 3 3 nr -s	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram
<b>Limacce</b> <i>Helix spp</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

## SPINACIO IN PIENO CAMPO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. (1) Revocato: impiego ammesso fino al 24/09/2021
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metamitron (1)	45	
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolaclo (2)	nr	(2) Impiego consentito da febbraio ad agosto, come da etichetta
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee	Triallate	nr	
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni annuali	Fenmedifan	28	
<b>Post emergenza</b>	Erbicidi fogliari Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim Quizalofop-P-etile (3) Quizalofop etile isomero D (3)	15 30 20 20	(3) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

## TOPINAMBUR – *Helianthus tuberosus*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b>	<b>Interventi agronomici</b> -ricorso ad ecotipi resistenti			
<b>Oidio</b>	<b>Interventi agronomici:</b> -la malattia può comparire in particolari areali e su ecotipi sensibili.	Zolfo	5	
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis</i>	Interventi agronomici -evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita da elateridi, la concimazione con calcio cianamide ha un'azione repellente nei confronti delle larve			

### DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.



## ZUCCA – Cucurbita maxima

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	<b>Difesa chimica:</b> - da realizzare alla comparsa dei primi sintomi e ripetere ad intervalli variabili in relazione all'andamento stagionale	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <b>COS-OGA</b> <i>Cerevisane</i> <i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1) Trifloxystrobin (1)+ Tebuconaz. (2) Penconazolo (2) Micllobutanil (2) Tebuconazolo (2) Ciflufenamid (3) Bupirimate (4) Fluxapyroxad + Difenoconazolo (2) Isopyrazam (2)	nr nr 1 <b>0</b> nr - c 5 1/3 3 <b>3</b> 3s 7 1 1 3c 7c	(1) Max 3 interventi all'anno con QoI – Azoxystrobin e Trifloxystrobin (2) Max 2 interventi all'anno con IBE. Max 2 Penconazolo. Max 1 con Tebuconazolo, Miclobutanil, Difenoconazolo, Isopyrazam (SDHI), in alternativa tra loro (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno  s = solo in serra c = solo pieno campo
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruggere i residui della coltura infetti; evitare l'irrigazione per aspersione <b>Difesa chimica:</b> intervenire ai primi sintomi o in caso di condizioni climatiche favorevoli alla malattia	<i>Prodotti rameici</i> * Cyafozamid (1) Fluopicolide + Propamocarb (2) Metiram (3) Zoxamide (4) Cimoxanil (5) Dimetomorf + Rame * (6) Mandipropamide (6) Ametotradina (7)	3/20 3 3 3 3c 3 7c 3 1c	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento all'anno (3) Massimo 3 interventi anno (4) Massimo 3 interventi anno (5) Max 3 interventi all'anno (6) Tra Dimetomorf e Mandipropamide max 3 interventi anno (7) Massimo 3 interventi anno
<b>Marciumi basali</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici</b> - rotazioni; concimazioni equilibrate; buon drenaggio; eliminazione residui infetti	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr nr 0 nr	
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni (almeno 4 anni); impiegare seme sano; concimazioni azotate e potassiche equilibrate; evitare di irrigare per aspersione; sconsigliato irrigare con acque "ferme" o contenenti residui organici; eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata <b>Difesa chimica:</b> - da effettuare dopo operazioni colturali che possono causare ferite alle piante			Prodotti rameici, nel limite dei 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> CMV; ZYMV; WMV-2; SqMV	<b>Interventi agronomici:</b> utilizzare piantine sane; eliminare le piante virosate; utilizzare seme esente dal virus del mosaico della zucca SqMV			

## ZUCCA

AVVERSAITA' FITOFAGI	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUS.	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Afide</b> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Controllo biologico:</b> uso di insetti utili, <i>Aphidoletes aphidimyza</i> , <i>Chrysoperla carnea</i> <b>Difesa chimica:</b> - eseguire trattamenti localizzati sui focolai di testa	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Maltodestrina Flonicamid (1) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor	0 1/3 3s nr 3 14 1	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 1 intervento all'anno s = solo in serra
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> lancio di <i>Phytoseiulus persimilis</i> <b>Difesa chimica:</b> in presenza di infestazione generalizzata o focolai.	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Maltodestrina</i> Exitiазox (1) Etoxazole (1) Spiromesifen (1) Bifenazate (1) Abamectina (1, 2) Clofentezine (1) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 nr 3 3 3s 3 3 3 nr - s	(1) Max 2 interventi all'anno con prodotti di sintesi (2) In serra non impiegabile da novembre a febbraio s = solo in serra
<b>Tripide</b> <i>Frankliniella</i> spp		<i>Azadiractina</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> Abamectina (1) Spinetoram (2) Terpenoid blend QRD 460	3s nr - s 3 3 nr - s	(1) Max 2 interventi all'anno. In serra non impiegabile da novembre a febbraio (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Notte fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> <i>Udea ferrugalis</i> , <i>Spodoptera esigua</i>	<b>Difesa chimica:</b> Presenza generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (1) Clorantpriliprole (2) Emamectina (3) Spinetoram (4)	3 3s 3 3 3 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp		Lambdacialotrina Cipermetrina	nr - c nr	Intervento localizzato; non rientra nel limite dei piretroidi. c = solo pieno campo

## ZUCCA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina e pre trapianto</b>	dove è possibile si consiglia di adottare la tecnica della falsa semina	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Postemergenza</b>	Graminacee	Propaquizafop	65	

## ZUCCHINO – Cucurbita pepo

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fusca</i>	<b>Interventi chimici:</b> - i trattamenti vanno iniziati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza della sostanza attiva e all'andamento stagionale	<i>Amelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 <i>Cerevisiane</i> <b>COS-OGA</b> Fenbuconazolo (1) Micllobutanil (1) Penconazolo (1) Tetraconazolo (1) Tebuconazolo (1) Fluxapiroxad + Difenonazolo (1, 6) Cyflufenamid + Difenonazolo (1) Azoxystrobin (2) Trifloxystrobin (2) Meptyldinocap (3) Ciflufenamid (4) Metrafenone (5) Isopyrazam (1, 6) Bupirimate (7)	nr nr - s nr 5 1 3 0 nr - s <b>0</b> 7 3s <b>3</b> 7 3 3 3 3 3 1 3 1 1	(1) Con IBE al massimo 2 interventi all'anno. Max 1 intervento anno con Miclobutanil , Tebuconazolo, Difenonazolo, Isopyrazam (SDHI) in alternativa tra loro. (2) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone) max 3 interventi all'anno. Max 1 intervento con Famoxadone (3) Al massimo 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi con SDHI – Fluxapiroxad, Isopyrazam, Fluopyram - (7) Max 2 interventi all'anno  c = solo pieno campo
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - aereare le serre; limitare le irrigazioni; eliminare le piante ammalate	<i>Prodotti rameici</i> * Cimoxanil (1) Azoxystrobin (2) Famoxadone (2) + Cimoxanil Cyazofamid (3) Mandipropamide (4) Ametotradina (5) + Dimetomorf (4) Ametotradina (5) Pyraclostrobin (2) + Dimetomorf (4) Metiram (6) Zoxamide (7) Zoxamide (7) + Dimetomorf (4)	3/20 10 3 10s 3 3 3 1s 3 3 3 3c	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Max 2 interventi all'anno, anche in miscela (2) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone) max 3 interventi all'anno. Max 1 intervento anno con Famoxadone (3) Max 2 interventi all'anno (4) Con CAA - Mandipropamide, Dimetomorf - max 4 interventi all'anno. (5) Con Ametotradina max 3 interventi anno (6) Massimo 3 interventi anno (7) Zoxamide max 3 interventi anno

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

## ZUCCHINO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	Normalmente presente solo in coltura protetta	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Fenexamide (1) Fenpirazamina (1) Pyrimethanil (2) Cyprodinil (2) + Fludioxonil (3) Fludioxonil (3)	nr - s 0 3 3s 3s 3 3s	(1) Max 2 interventi all'anno tra i due prodotti (2) Max 3 interventi all'anno con Pyrimethanil e Cyprodinil. (3) Al massimo 1 intervento per ciclo, 2 all'anno con Fludioxonil
<b>Marciumi</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> aerare le serre; limitare le irrigazioni; eliminare le piante ammalate	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma as + T. gamsii</i> <i>Pythium oligandrum</i> ceppo M1 Cyprodinil + Fludioxonil (1) Fenexamide (2)	nr nr nr 3 0 7 3	(1) Al massimo 1 intervento per ciclo, 2 all'anno con Fludioxonil (2) Max 3 interventi all'anno
<b>Marciume molle</b> <i>Phytophthora</i> e <i>Pythium</i>	<b>Difesa chimica:</b> solo in caso di attacchi.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum + T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Coniothyrium minitans</i> Propamocarb + Fosetil (1) <i>Prodotti rameici</i> (1)	nr 3 nr - s nr nr	(1) Nelle fasi iniziali del ciclo. Trattamento ai semenzai o al terreno
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> rotazioni (almeno 4 anni); concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; è sconsigliato irrigare con acque "ferme" o contenenti residui organici. <b>Difesa chimica:</b> - dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle piante		3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI:</b> CMV, Virus del Mosaico del Cetriolo; ZYMV, Virus del Mosaico Giallo dello Zucchini; WMV-2, Virus 2 del Mosaico del Cocomero	Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli afidi. Per le virosi CMV, ZYMV, WMV-2, trasmesse da afidi in tempi brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi			
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza	<i>Lecanicillium muscarium</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) <i>Abamectina</i> (2) Terpenoid blend QRD 460 Cyantranilprole + Acibenzolar Acrinatrina (3)	3 nr - s 3 3 3 3 nr - s 3 - s - s	(1) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (2) Max 2 interventi all'anno. In serra non impiegabile da novembre a febbraio (3) Solo prefiioritura. Nel limite dei 3 piretroidi - Acrinatrina, Taufluvinalate, Lambdacialotrina, Deltametrina -.

ZUCCHINO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afide delle cucurbitacee</b> <i>Aphis gossypii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione effettuare dei lavaggi con bagnanti. <b>Controllo biologico.</b> Lanci di <i>Aphidoletes aphidimyza</i> , opp. <i>Chrysoperla carnea</i> 10-20 larve mq, oppure <i>Aphidius colemani</i> con 0,5-2 individui/mq. Altri: <i>Aphidius ervi</i> ; <i>Aphelinus abdominalis</i> ; <i>Praon volucre</i> ; <i>Ephedrus cerasicola</i> <b>Difesa chimica</b> Realizzare il trattamento in maniera localizzata o a pieno campo in funzione della distribuzione dell'attacco afidico. Se sono già stati effettuati dei lanci le s.a. indicate vanno usate unicamente per trattamenti localizzati.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> Maltodetrina Taufluvinate (1) Lambdacialotrina (1) Deltametrina (1) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor Flonicamid (3) Spirotetramat (4) Flupyradifurone Cyantraniliprole + Acibenzolar	0 1/3 nr 3 nr 7c 3 3 7c/3s 1 3 3 3 3 - s	(1) Con piretroidi max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno, 1 per ciclo. Tempo di carenza: 3 gg coltura protetta; 7 gg pieno campo (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno s = solo in serra c = solo pieno campo
<b>Notte fogliari</b> <i>Autographa</i> , <i>Mamestra</i> , <i>Heliothis</i> , <i>Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - presenza generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Virus</i> (1) Indoxacarb (2) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Clorantniliprole (4) Emamectina (5)	3 3 3 3 3 3 3	(1) Specifici per <i>Heliothis</i> o <i>Spodoptera</i> (2) Max 3 interventi all'anno (3) Tra Spinosad e Spinetoram massimo 3 interventi all'anno. Massimo 2 con Spinetoram (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Controllo biologico:</b> - eseguire lanci di <i>Encarsia formosa</i> . Si possono utilizzare anche <i>Eretmocerus mundus</i> , <i>E. Eremicus</i> , <i>Amblyseius swirskii</i> e <i>Macrolophus caliginosus</i> . E' anche possibile l'utilizzo di <i>Beauveria bassiana</i> <b>Difesa chimica:</b> - presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Maltodetrina Pyriproxifen (1) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor Flonicamid (3) Spiromesifen (4) Spirotetramat (5) Flupyradifurone Terpenoid blend QRD 460 Cyantraniliprole + Acibenzolar	1/3 3 nr - s 3 0 nr 3s 7c/3s 1 3 3s 3 3 nr - s 3 - s	(1) Al massimo 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno, 1 per ciclo. (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi anno (5) Max 2 interventi anno s = solo in serra

## ZUCCHINO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione. <b>Difesa chimica:</b> presenza di focolai di infestazione. Con lancio di ausiliari scegliere prodotti selettivi e interventi localizzati	<i>Beauveria bassiana</i> Sali potassici di acidi grassi Maltodestrina Exitiazox Bifenazate Spiromesifen Abamectina (1) Tebufenpirad (2) Pyridaben (3) Fenpiroximate Terpenoid blend QRD 460	nr 0 nr 3s 3 3s 3 3 3s 14s nr - s	Al massimo 1 intervento per ciclo contro questa avversità, max 2 all'anno con s.a. di sintesi. Ammissa la miscela tra le sostanze attive indicate  (1) Vedi nota sopra  (2) Max 1 intervento anno (3) Max 1 intervento anno  s = solo in serra
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - evitare ristagni idrici; utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide <b>Interventi fisici</b> - solarizzare il terreno con telo P.E trasparente di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 giorni. <b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza e danni negli anni precedenti	<i>Paecilomyces lilacinus</i> Estratto d'aglio <b>Azadiractina</b> Fenamifos (1, 2) Oxamil (1, 3) Fluopyram (1, 4) Abamectina (5)	nr nr 3 60 50 1 nr	(1) Utilizzo solo in coltura protetta (2) Applicazione per irrigazione a goccia, in alternativa all'Oxamil, al Metam e al Dazomet. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 23/09/2021 (3) Intervenire con irrigazione localizzata. In alternativa al Fenamifos (4) Con SDHI max 2 interventi all'anno (5) Solo in serra. Per irrigazione a goccia o con manichetta, in alternativa altri nematocidi
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> spp, <i>Pythium</i> spp, <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phytophthora</i> spp , <i>Fusarium</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam (1, 2, 3) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Pseudomonas</i> ceppo DSMZ	nr nr 4 1	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno, complessivi tra Metam potassio e Metam sodio
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp		Lambdacialotrina Cipermetrina	nr - c nr	Intervento localizzato; non rientra nel limite dei piretroidi. c = solo pieno campo

## ZUCCHINO IN PIENO CAMPO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post trapianto</b>	Graminacee	Quizalofop-P-etile (1) Quizalofop etile isomero D (1)	30 30	(1) Verificare autorizzazione formulati commerciali
<b>Preemergenza o trapianto</b> <b>Post emergenza o trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone (2)	40	(2) Complessivamente max 0,5 litri ettaro anno

## COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI

### METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI LOTTA GUIDATA SU MAIS E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Le operazioni di campionamento vanno segnate su una scheda di campagna sottoscritta dal tecnico o dal titolare dell'azienda

#### **Elateridi:**

Il monitoraggio, eseguito ai fini della geodisinfestazione, ha significato solamente nella situazione in cui esista un grave rischio d'attacco. Tale rischio è legato alla presenza di uno o più dei seguenti fattori:

1	copertura per tutta la stagione precedente, con precessioni colturali del tipo: prato stabile, erba medica, erbai, frumento-soia, loiessa-mais, ecc;
2	la sopravvivenza dei parassiti e quindi il rischio d'attacco è aumentato se a questi avvicendamenti si associano irrigazioni per aspersione od elevate piovosità che mantiene una buona umidità nello strato superficiale del terreno nel periodo critico tra fine maggio e metà agosto
3	elevato tenore di sostanza organica (terreni torbosi)
4	elevate concimazioni letamiche
5	forti attacchi nel recente passato

In tali casi è necessario verificare se effettivamente le popolazioni dei fitofagi sono sopra soglia mediante il campionamento del terreno che va eseguito su omogenee superfici, variabili da 1 a 5 ha, preferibilmente nel mese di aprile per il mais e nel mese di ottobre per la barbabietola da zucchero.

Modalità:

- 1) nella superficie da campionare vanno effettuate 10 buche di dimensioni 30x30x25 di profondità (50 - 55 cm se eseguite nel periodo invernale). La numerosità dei parassiti per mq si ricava nel seguente modo: n° larve/campione x 11.
- 2) 25 carotaggi (strumento di 12 cm di diametro e profondo 15 cm) eseguiti a 25-30 cm di profondità (50-55 cm nel periodo invernale). La numerosità dei parassiti per mq si calcola nel seguente modo: n° larve /campione x 88.

**Soglia: 15 e 20 larve/mq rispettivamente per bietola e mais.**

#### **Cleono:**

Monitoraggio settimanale degli adulti nel periodo che va da fine marzo a fine giugno, mediante il posizionamento sui principali fronti di avanzamento (coltura della bietola dell'anno precedente) di vasi trappola del diametro di 14-16 cm interrati e con l'apertura a livello del terreno. Vanno eseguiti tre punti di monitoraggio costituiti ciascuno da 4 vasi posti a 4 m l'uno dall'altro.

**Soglia: 2 individui/vaso/settimana**

#### **Cercospora:**

La lotta guidata si basa su due modalità:

- 1) uso di piante spia (sensibili alla malattia): il trattamento va eseguito al superamento dello stadio 2 della scala KWS (0-5R).
- 2) coltivazioni di varietà tolleranti: si eseguono 5 rilievi di 25 piante ciascuno in posizioni differenti all'interno dell'apezzamento. Il trattamento va fatto quando il 40% dei soggetti esaminati presenta almeno una confluenza delle macchie necrotiche.

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – *Beta vulgaris* var. *saccharifera*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Cercospora</b> <i>Cercospora beticola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - Scelta di cv resistenti o tolleranti <b>Difesa chimica:</b> - per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini di assistenza tecnica o al raggiungimento delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie delle varietà sensibili. <b>Difesa chimica:</b> intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica	<i>Prodotti rameici</i> (1) Procloraz (2) Difenconazolo (2) Tetraconazolo (2) Fenpropidin (2) Mancozeb (3) <i>Bacillus subtilis</i>	20 14 21 14 21 28 nr	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Gli IBE sono efficaci anche contro l'oidio. Max 3 interventi all'anno. Si consiglia di usarli in miscela. (3) Massimo 3 interventi.. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica	<i>Zolfo</i> <i>Bacillus subtilis</i>	5 nr	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Marciume dei fittoni:</b> <i>Rhizoctonia violacea</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma betae</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampi avvicendamento culturale (escludere dall'avvicendamento i prati di leguminose - facilitare lo sgrondo delle acque - lavorazione del suolo per avere una buona struttura - corretta gestione dell'irrigazione	<i>Trichoderma harzianum</i>	nr	Localizzato alla semina
<b>VIROSI</b> <b>Virus della rizomania</b> BNYVV	<b>Interventi agronomici:</b> ricorrere a varietà tolleranti nei terreni rizomani; lunghe rotazioni colturali.			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> evitare la coltura in successione al prato o alla medica per almeno 2 anni <b>Difesa chimica:</b> - in caso di presenza accertata Soglia con i vasetti : 1 larva per trappola. Con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m². Con infestazioni in atto per creare un ambiente sfavorevole alle larve eseguire sarchiature ripetute.	Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1)	nr 21 nr	(1) Intervento localizzato alla semina utilizzando uno dei prodotti indicati. L'intervento non entra nel cumulo dei piretroidi (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021



## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Altiche</b> <i>Chaetochyema tibialis</i> , <i>Longitarsus</i> sp., <i>Phyllotreta vittula</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: fori su foglie cotiledonari - 2 fori/foglia su piante con 2 foglie - 4 fori/foglia su piante con 4 foglie.	Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Esfenvalerate (1) Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 3) Lambdacialotrina (1) Etofenprox (1)	14/21 3/30 14 21 7 14 21	(1) Al massimo 3 interventi all'anno con piretroidi. Max 1 tra Lambdacialotrina, Esfenvalerate, Etofenprox. Max 1 fra Cipermetrina e Zetacipermetrina (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Atomaria</b> <i>Atomaria linearis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - può danneggiare la coltura solo in caso di risemine	Teflutrin (1) Betaciflutrin (2)	nr 7	(1) Intervento localizzato alla semina. Non utilizzabile usando sementi conciate con Teflutrin. (2) Vedi nota sopra
<b>Cleono</b> <i>Conorhynchus mendicus</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglie: - erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile; - superamento di 2 adulti per vaso settimana. Valutare l'opportunità di effettuare il primo trattamento solo sui bordi dell'appezzamento	Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Taufluvinalate (1) Lambda cialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 3)	14/21 30 21 14 21 7	(1) Vedi nota piretroidi (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Mamestra</b> <i>Mamestra brassicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza di larve e rosure sul 20% delle piante	<i>Bacillus thuringiensis</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 3) Indoxacarb (4)	3 14/21 30 21 7 14	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità (escluso <i>Bacillus t.</i> ) (1) Al massimo 3 interventi all'anno con piretroidi. Max 1 tra Lambdacialotrina, Esfenvalerate ed Etofenprox. Max 1 fra Cipermetrina e Zetacipermetrina (2) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 (4) Max 3 interventi all'anno

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afide nero</b> <i>Aphis fabae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: - 30% delle piante infestate e mancanza di coccinellidi	Betaciflutrin (1, 2) Deltametrina (1) Esfenvalerate (1)	7 30 14	(1) Vedi nota piretroidi (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis segetum</i> <i>Agrotis Ipsilon</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: - 1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo stadio di 8-10 foglie. Intervenire soltanto in coltivazioni con investimento non ottimale.	Cipermetrina (1) Esfenvalerate (1) Deltametrina (1)	14/21 14 30	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Nottue fogliari</b> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Mamestra</i>		<i>Bacillus thuringensis</i> Cipermetrina (1) Esfenvalerate (1) Betaciflutrin (1, 2) Etofenprox (1) Indoxacarb (3)	3 14/21 14 7 21 14	(1) Vedi nota piretroidi (2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 20/07/2021 (3) Max 3 interventi all'anno
<b>Nematode a cisti:</b> <i>Heterodera schachtii</i>	<b>Soglia:</b> con infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100 uova-larve per 100 g di terreno, è sconsigliata la coltivazione in quanto viene compromessa la produzione. Nei terreni poco o moderatamente infestati coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode. <b>Interventi agronomici:</b> Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, liliaceae; nei terreni fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari di piante esca resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di Raphanus sativus o Sinapis alba); da realizzare: - in estate (dopo grano o orzo); - in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (es. soia, mais); Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni dalla semina per evitare la detescenza dei semi e favorire un inerbimento del terreno, o solamente trinciate per favorire un ricaccio della coltura nei terreni a riposo (set-aside)			

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre-semi</b> (Programma A)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre-emergenza</b> (Programma B) (1)	Dicotiledoni e Graminacee	Metamitron (1) Etofumesate Clomazone (2)	nr 120 nr	(1) Controllo dicotiledoni (2) Attenzione a fitotossicità su terreni sciolti; vedi etichetta.
<b>Post-emergenza con dosi molto ridotte</b> (Programma C) (2)	Dicotiledoni e Graminacee	Fenmedifan Etofumesate Metamitron Lenacil	nr 120 nr 30	Al massimo 3 microdosi. Eseguire i trattamenti con malerbe allo stadio di cotiledoni - prima coppia di foglie vere e ripetere dopo 8-10 giorni o 6-8 giorni in condizioni difficili. Utile l'aggiunta di olio bianco (0,5 litri/ha); ma da valutare temperatura e umidità dell'aria. Con alte temperature l'olio si riduce fino ad eliminarlo.
<b>Post-emergenza con dosi crescenti</b> Programma D (3)	Dicotiledoni e Graminacee	Fenmedifan Etofumesate Metamitron Lenacil	nr 120 nr 30	Metamitron migliora l'efficacia su <i>Polygonum aviculare</i> . Etofumesate su Mercuriale
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Floramsulfuron + Thiencarbazono-metile	nr	N.B. Utilizzabile solo su varietà tolleranti alle solfimirulee

(1) In pre-emergenza le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela vanno ridotte del 50% rispetto alle dosi riportate. La riduzione può essere attuata in maniera:

- a) interventi localizzati lungo la fila
- b) interventi a pieno campo a metà dose (azione condizionante)
- c) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervenendo in post sulla rimanente

(2) Il programma C è vincolato all'utilizzo delle microdosi; ammessi massimo 4 trattamenti ripetuti in base alle necessità

(3) Il programma D si attua nel caso di un andamento stagionale che abbia impedito la parziale o completa realizzazione del programma C. Le dosi complessive utilizzate non possono superare l'equivalente delle 4 microdosi previste nel programma C, e comunque le dosi di etichetta previste.

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
	problemi di Cuscuta	Propizamide	nr	Intervenire sulle chiazze, con la coltura tra le 5 e le 10 foglie vere. Con la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo è possibile utilizzare dosi ridotte, circa 0,5 kg/ha, eventualmente ripetuto.
	problemi di Cirsium e/o Ammi majus	Clopiralid	nr	trattamenti localizzati
<b>Post-emergenza casi particolari (Programma E) (4)</b>	Problemi di Amaranthus, Galium	Lenacil	30	Applicazioni ad integrazione dei normali postemergenza
	Problemi di Abutilon, Ammi majus, Amaranthus, Crucifere e girasole	Triflusulfuron-methyl (1) + olio	nr 20	(1) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con clopiralid. Intervenire agli stadi iniziali di sviluppo delle infestanti, 2 – 3 foglie vere, anche frazionato con due interventi
	problemi di graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D Cletodim Fluazifop-p-butile	nr 45 60 60 60 60	

(4) Il programma E integra gli altri per contenere infestanti particolari..

## CEREALI AUTUNNO-VERNINI

### FRUMENTO

(Frumento tenero - *Triticum vulgare*; Frumento duro - *Triticum durum*)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Carbone</b> <i>Ustilago tritici</i> <b>Carie</b> <i>Tilletia</i> spp.	La <b>concia</b> è fondamentale per contenere o ritardare la comparsa di diverse malattie fungine: carbone, carie, complesso del mal del piede, septoria, fusarium, ruggini, oidio.			La concia del seme è ammessa solo con fungicidi. Non ammesso l'uso di insetticidi come concianti
<b>Nerume</b> <i>Alternaria</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Epicoccum</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate			
<b>Septoria</b> <i>Septoria nodorum</i> <i>Septoria tritici</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate; varietà resistenti o tolleranti	<b>STROBILURINE</b> Azoxystrobin Pyraclostrobin <b>TRIAZOLI</b> Procloraz Ciproconazolo Flutriafol Tebuconazolo Tetraconazolo Difenoconazolo Protioconazolo Metconazolo Fenpropidin Bromuconazolo <b>Mefentrifluconazolo</b>	35 35 40 30 nr fine fior. 35 nr nr 35 nr nr	Su grano sono ammessi al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno.
<b>Ruggini</b> <i>Puccinia graminis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia per le ruggini: presenza pustole	<b>SDHI</b> Bixafen (1) Benzovindiflupyr (1) Fluxapyroxad (1) Isopyrazam (1) <b>ALTRI</b> Mancozeb (2) <i>Pythium oligandrum</i> (3)	nr nr 35 nr nr 35 nr nr 35 nr nr	(1) Con SDHI massimo 1 intervento all'anno  (2) <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. Max 1 intervento all'anno. Da utilizzare dove è accertata una riduzione di efficacia delle strobilurine e dei triazoloni nei confronti della septoria.  (3) Indicato per Septoria e fusariosi della spiga



## ORZO - *Hordeum vulgare*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Oidio, Ruggine, ecc.</b>	- Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo, la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici.			
<b>Carbone</b> <i>Ustilago tritici</i>	<b>Difesa chimica:</b> concia del seme consigliata			
<b>Elmintosporiosi</b> <i>Drechslera sorokiniana</i>	<b>Difesa chimica:</b> consigliata la concia del seme			
<b>Maculatura reticolare</b> <i>Drechslera teres</i>	<b>Difesa chimica:</b> consigliata la concia del seme			
<b>Septoria</b> <i>Septoria nodorum</i>	<b>Difesa chimica:</b> consigliata la concia del seme			
<b>Striatura fogliare</b> <i>Drechslera graminea</i>	<b>Difesa chimica:</b> consigliata la concia del seme			
<b>VIROSI</b>				
<b>Virus del nanismo giallo</b>	<b>Interventi agronomici:</b> semine ritardate.			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Metopolosiphum dirhodum</i> <i>Sitobion avenae</i>	Gli afidi sono vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo <b>Interventi agronomici:</b> - si consigliano semine tardive, non troppo fitte e limitare le concimazioni azotate			

## DISERBO DEL FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO (\*)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
<b>Pre-semiina Post-raccolta</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. L'intervento in preemergenza è ammesso al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
<b>Pre-emergenza</b>	Graminacee e dicotiledoni	Tri-Alliate Prosulfocarb Pendimetalin Diflufenican (1)	(1) Utilizzabile anche in post precoce
<b>Post precoce 2-4 foglie inizio accestimento</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet Bifenox (1) Prosulfocarb (2)	(1) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato (2) Applicazione anche in pre-emergenza
<b>Accestimento - levata</b>	Graminacee	Clodinafop-propargyl (1) Fenoxaprop-p-etile Diclofop-metile Pinoxaden	(1) Non ammesso su orzo
		Tifensulfuron-metile Metsulfuron-metile Tribenuron-metil Tritosulfuron Amidosulfuron (1) Bensulfuron-metile (1) Mecoprop-P Diclorprop-P Fluroxypyr MCPA 2,4-D Dicamba Bromoxinil (2) Clopirralid Florasulam Metribuzin Halauxifen-metile Beflubutamide	La maggior parte delle sostanze attive sono in miscele pronte  (1) Non ammessi su orzo  (3) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 14/09/2021
	Dicotiledoni		Diversi prodotti contengono in miscela degli antidoti, esempio Mefenpyr e Cloquintocet-mexyl, che si intendono sempre ammessi.
	Dicotiledoni e graminacee	Pyroxulam (1) Iodosulfuron-metil Mesosulfuron (1) Propoxycarbazono (1) Thiencarbazono (1)	(1) Non ammessi su orzo

(\*) In genere l'orzo non necessita di diserbo, in quanto esercita un buon controllo delle malerbe per la rapidità di levata e per alcuni escreti radicali che inibiscono le infestanti.



**AVENA - Avena sativa - SEGALE - Secale cereale - TRITICALE (ibrido tra segale e frumento)**  
**Non sono ammessi interventi fungicidi e insetticidi – E' ammessa la concia del seme e il diserbo, come indicato in tabella**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre-emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb (1) Pendimetalin Diflufenican	(1) Non ammessi su avena
<b>Post-emergenza precoce</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican Flufenacet (1) Prosulfocarb (1)	(1) Non ammessi su avena
	Graminacee	Clodinafop-propargyl	Impiego ammesso solo su triticale
		Amidosulfuron Tifensulfuron metile Tribenuron metile Tritosulfuron Metsulfuron-metil Clopiramid MCPA 2,4-D Fluroxipir Mecoprop-p Diclorprop-p Florasulam Bifenox (1) Bromoxinil (2) Halauxifen-metil Beflubenbutamide (3)	Diversi prodotti contengono in miscela degli antidoti, esempio Mefenpyr e Cloquintocet-mexyl, che si intendono sempre ammessi
<b>Accestimento - levata</b>	Dicotiledoni		(1) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato  (2) Non ammesso su triticale. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 14/09/2021  (3) Non ammesso su avena
	Graminacee e Dicotiledoni	Pyroxulam (1) Iodosulfuron (1) Mesosulfuron (1) Propoxycarbazone (2)	(1) Non ammessi su avena  (2) Solo su triticale

**DISERBO E DIFESA DEL FARRO**  
**Farro piccolo - Triticum monococcum; Farro medio o farro - Triticum dicoccum; Farro grande - Triticum spelta.**  
**Non sono autorizzati interventi chimici**

**COLZA - Brassica napus**

A VVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Malattie crittogamiche</b> <i>Alternaria</i> , <i>Sclerotinia</i> <i>Peronospora</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare avvicendamento con soia, girasole e barbabietola <b>Difesa chimica:</b> non ammessi interventi chimici			
<b>FITOFAGI</b>				<b>Massimo 2 interventi con insetticidi sulla coltura</b>
<b>Meligete</b> <i>Meligetes aeneus</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: 3 individui per pianta. Intervenire prima dell'apertura dei fiori.	Taufluvinalate Cipermetrina (1) Acetamiprid (2)	30 21 28 - 40	(1) Max 1 intervento anno (2) Max 1 intervento all'anno
<b>Afide</b> <i>Brevicoryne brassicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: 2 colonie/mq Vietati interventi in prossimità dell'inizio fioritura, per non danneggiare i pronubi	Taufluvinalate Esfenvalerate (1) Deltametrina Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2)	30 42 30 28 28 - 40	(1) Max 1 anno in alternativa tra loro (2) Max 1 intervento all'anno
<b>Altiche, Punteruolo, Nottue defogliatrici</b>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza accertata. Non intervenire in fioritura.	Taufluvinalate Deltametrina Lambdacialotrina (3) Cipermetrina (1) Acetamiprid (2)	21 30/45 30 21 28 - 40	(1) Max 1 intervento anno (2) Max 1 intervento. Ammesso su punteruolo. Verificare registrazione dei prodotti su colza. (3) Max 1 all'anno in alternativa con Esfenvalerate
<b>Limacce e chiocciole</b>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Fosfato ferrico	nr	

**COLZA - DISERBO**

INFESTANTI	EPOCA D'IMPIEGO	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
Graminacee e Dicotiledoni	<b>Pulizia letti semina</b>	Glifosate	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
	<b>Presemina</b>	Clomazone + Pendimetalin	nr	
	<b>Pre-emergenza Post - precoce</b>	Metazaclor	nr	Massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni (da etichetta)
	<b>Post emergenza</b>	Imazamox + Metazaclor	nr	Impiegabile ogni 3 anni e su specifiche varietà
Graminacee	<b>Post-emergenza</b>	Propanozaflorop Ciclossidim Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D	90 nr 100 60	
	<b>Post-emergenza</b>	Clopiralid	nr	

## GIRASOLE – *Helianthus annuus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Plasmopara helianthi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno <b>Difesa chimica:</b> obbligatoria la concia delle sementi			
<b>Marciume carbonioso</b> <i>Sclerotium bataticola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme non infetto; rotazioni; semine precoci; limitato uso di concimi azotati			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - interrimento dei residui colturali contaminati; limitare l'apporto di azoto			
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso di seme non contaminato dagli sclerozi del fungo; ampie rotazioni; buon drenaggio del terreno			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	non sono ammessi interventi chimici			

## GIRASOLE - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre-semenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza (e post-precocce)</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolactor (1) Oxyfluorfen (2) Pendimetalin Aclonifen (3) Metobromuron	nr nr nr nr nr	(1) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia. (2) Localizzato (3) Prodotto pericoloso per le acque. Nella rotazione con mais, sorgo, pomodoro, patata impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Tifensulfuron metil + Tribenuron metil	nr	Impiegabile solo su cultivar resistenti alle solfoniluree
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox	nr	Impiegabile solo su cultivar resistenti a Imazamox
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D Cletodim	nr 90 60 45 100	

(1) In pre-emergenza le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela vanno ridotte del 50% rispetto alle dosi riportate. La riduzione può essere attuata con: - a) interventi localizzati lungo la fila - b) interventi a pieno campo a metà dose (azione condizionante) - c) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervenendo in post sulla rimanente

## LUPPOLO – *Humulus lupulus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora humulus</i>	<b>Interventi agronomici</b> Eliminare le foglie alla base delle piante, fino all'altezza di circa 1 metro da terra per ridurre le infezioni iniziali Le infezioni si possono trasmettere con gli strumenti usati per la potatura, specialmente se si tagliano i polloni. Disinfettare le forbici		
<b>Verticilloso</b> <i>Verticillium albo-atrum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Curare le condizioni fisiche del terreno, non eccedere in concimazioni azotate, impiegare varietà resistenti La diffusione della malattia avviene per parti di pianta infette, macchinari e utensili contaminati		
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium spp</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Favorire lo sgrondo delle acque per evitare ristagni idrici (Il fungo colpisce le radici specialmente in terreni umidi o con drenaggio carente).		
<b>Disseccamento dei conii</b> <i>Clamidosporium spp</i>	Le stagioni vegetative fredde ed umide o gli stress idrici prolungati favoriscono la comparsa della malattia		
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca humuli</i>	<b>Interventi agronomici:</b> La malattia compare soprattutto nelle annate calde	<i>Olio essenziale di arancio dolce</i>	
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis sp</i>	<b>Interventi agronomici</b> Non eccedere con i concimi azotati		
<b>VIROSI</b> – ApMV Mosaico del melo HLVd Viroide latente luppolo	<b>Interventi agronomici</b> Impiegare materiale virus-esente ottenuto attraverso la coltura di meristemi o mediante la termoterapia. Limitare la diffusione degli insetti vettori (afidi).		
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Afide del luppolo</b> <i>Phorodon humuli</i>	<b>Controllo biologico</b> Monitorare la presenza di afidi sui germogli in accrescimento (in maggio gli individui alati sciamano sul luppolo). Effettuare lanci di insetti utili. La seconda generazione (luglio) è la più pericolosa svolgendosi completamente a carico dei conii. Controlli visivi sulla vegetazione.	<i>Bacillus thuringensis</i>	
<b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	<b>Controllo biologico</b> Monitorare la presenza sui conii (causano bronzature in estati secche e calde). Intervenire con lanci di insetti utili.		

**DISERBO DEL LUPPOLO - Non sono ammessi interventi: nessun prodotto autorizzato**

**MAIS – Zea mais**  
(ESCLUSO IL MAIS DOLCE)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Carbone comune</b> <i>Ustilago maydis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - concimazione equilibrata; ampie rotazioni. Gli ibridi in commercio sono generalmente resistenti al carbone.			
<b>Marciume del fusto</b> <i>Gibberella zeae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare le semine troppo fitte; evitare eccessi di azoto e squilibri idrici; ricorso a ibridi resistenti o tolleranti			
<b>BATTERIOSI</b> <i>Erwinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> evitare l'uso di acque stagnanti per l'irrigazione a pioggia. Si consiglia la rotazione dove si sono verificati danni da <i>E. chrysanthemi</i>			
<b>VIROSI</b> MDMV, BYDV	MDMV: Virus del nanismo maculato del mais; BYDV: Virus del nanismo giallo dell'orzo. Non sono previsti interventi chimici			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare la coltura in successione a prati stabili <b>Uso di geodisinfestanti</b> Vedi criteri riportati nella nota in calce alla scheda.	Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Cipermetrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i>	nr nr nr nr nr	(1) Intervento localizzato alla semina utilizzando uno dei prodotti indicati. Max 1 intervento anno con Lambdacialotrina <b>(2) Revocato.</b> Impiegabile fino al 30/11/2021
<b>Piraliide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - sbratura degli stocchi e aratura <b>Difesa chimica:</b> - intervenire in funzione dei voli rilevati con le trappole a feromoni del tipo a cono di rete per catture maschili e femminili, dislocate nelle aree più rappresentative. La gestione delle trappole va concordata con il Settore Fitosanitario.	<i>Trichogramma</i> spp <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> Indoxacarb Clorantraniliprole	nr 3 3 14 7	Su piraliide max. 1 trattamento con uno dei prodotti indicati e solo sulla seconda generazione.

## MAIS (ESCLUSO IL MAIS DOLCE)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Diabrotica</b> <i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	La rotazione colturale è sufficiente a contenere la diabrotica. In altre situazioni installare trappole cromotropiche gialle e seguire le indicazioni dei bollettini per eventuali trattamenti. Vincolante: Il trattamento si giustifica con catture di 50 adulti settimanali consecutivi per due settimane solo nel caso in cui si preveda la coltura del mais anche nell'anno successivo	Indoxacarb Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Betaciflutrin (1)	14 3 15 14	(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 1 intervento all'anno. Non ammesso l'uso di Lambdacialotrina se impiegata come geodisinfestante. <b>Betaciflutrin revocato;</b> impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Notte terricole</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Difesa chimica.</b> Soglia: presenza diffusa di attacchi iniziali Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo localizzato. Seguire le indicazioni dei bollettini	Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) Etofenprox (1)	28 3 15 28	(1) Piretroidi: vedi nota sopra
<b>Afidi dei cereali</b> <i>Rhopalosiphum,</i> <i>Metopolophium,</i> <i>Sitobion, Schizaphis</i>	Non sono ammessi interventi chimici			

### Limitazioni per la geodisinfestazione del mais (compreso mais dolce).

Il geodisinfestante può essere distribuito solo localizzato.

La geodisinfestazione può essere effettuata nei casi in cui il mais segue colture che comportano una copertura continua nella stagione precedente, come nel caso di prato stabile, erba medica, erbai, doppie colture nello stesso anno (es, frumento – soia; Ioiessa – mais ....)

Per le superfici in cui il mais non segue le colture sopra indicate l'uso di geodisinfestazione o di seme conciato con insetticidi può interessare complessivamente al massimo il restante 30% della superficie a mais, in caso non sia stato effettuato alcun monitoraggio degli elateridi, mentre può arrivare al 100% se sono stati adottati dei metodi di monitoraggio e sono state superate le soglie sotto riportate:

- a) trappole a feromoni, con cattura cumulativa di oltre 1000 individui nell'anno precedente
- b) vasetti/trappola per larve posizionati circa 2 settimane prima della semina, con le seguenti soglie: 1 larva/trappola *Agrotis brevis*; 2 larve/trappola per *Agrotis sordidus*; 5 larve/trappola per *Agrotis ustulatus* e *Agrotis litigiosus*
- c) nel caso vengano superate le soglie previste per il monitoraggio tramite campionamento del terreno (20 larve per metro quadro)

I monitoraggi vanno documentati.

## DISERBO DEL MAIS (ESCLUSO IL MAIS DOLCE)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
<b>Pre-semmina (e post precoce)</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	<p><b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.</p> <p>In pre-emergenza è possibile (e consigliabile, dove l'organizzazione aziendale lo permetta) ridurre le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela attraverso</p> <p>a) <b>interventi localizzati lungo la fila</b> b) <b>interventi sul 50% della superficie coltivata</b></p> <p>(1) Impiego localizzato sulla fila di semina o al massimo sul 50% della superficie coltivata a mais. Pertanto <b>il limite aziendale di impiego dei prodotti che contengono Terbutilazina e S-Metolaclor</b> è pari alla dose ettaro di etichetta per il 50% degli ettari destinati a mais. Non possono essere impiegati per 2 anni di seguito sullo stesso appezzamento.</p> <p>(2) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.</p> <p>(3) Non impiegare su terreni sabbiosi</p>
	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Dimetenamid-P Terbutilazina (1) S-Metolaclor (1) Aclonifen (2) Isoxaflutole Flufenacet Thiencarbazone-methyl Clomazone (3) Pethoxamid Mesotrione Sulcotrione	<p>(1) Indispensabile l'aggiunta di bagnante. Anche frazionati in due interventi, non superare la dose massima indicata.</p> <p>(2) Disponibile solo in miscela con altre s.a.</p> <p>(3) Massimo una applicazione ogni tre anni sullo stesso appezzamento</p>
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron (1, 2) Nicosulfuron (1) Sulcotrione Mesotrione Tembotrione Foramsulfuron	
	Dicotiledoni	Prosulfuron (3) Tifensulfuron metil Tritosulfuron Clopiralid Dicamba Fluroxipir Florasulam Piridate	
	Dicotiledoni e Ciperacee	Halosulfuron metil	
	Dicotiledoni, compreso perenni	MCPA (3)	
			(3) Max 10% della superficie aziendale investita a mais

## RISO – *Oryza sativa*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - ammessa solo la concia del seme.			
<b>Elmintosporiosi</b> <i>Drechslera oryzae</i> ( <i>Helminthosporium Oryzae</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - interventi ammessi nella fase tra piena botticella e fine spigatura	Azoxystrobin Azoxystrobin + Difenconazolo Trifloxystrobin Pyraclostrobin Flutriafol Procloraz	28 28 28 nr 28 35	Con fungicidi di sintesi massimo 1 intervento all'anno sulle varietà considerate resistenti o moderatamente resistenti al brusone, massimo 2 sulle altre varietà (vedi nota in calce)
<b>Brusone delle foglie</b> <i>Pyricularia oryzae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso di varietà tolleranti; - evitare eccessi di azoto; - evitare semine troppo ritardate; - evitare semine troppo fitte. <b>Difesa chimica:</b> si consiglia di intervenire tra la fase di botticella e la spigatura al verificarsi delle condizioni idonee alle infezioni: - bagnatura da pioggia o rugiada di almeno 12 ore, - temperatura superiore a 24° C, - umidità relativa dell'aria superiore al 90%.	<b>COS-OGA</b> Azoxystrobin Azoxystrobin + Difenconazolo Trifloxystrobin Pyraclostrobin Flutriafol Procloraz	0 28 28 28 nr 28 35	
<b>FITOFAGI</b>				
<b>CROSTACEI</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - asciutta.			
<b>Coppette</b> <i>Triops cancriformis</i>	Non ammessi interventi chimici			
<b>INSETTI</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - asciutta.			
<b>Ditteri Chironomidi</b> <i>Chironomus</i> spp. <i>Cricotopus</i> spp.	Non ammessi interventi chimici			
<b>Ditteri Efrididi</b> <i>Hidrella griseola</i>				
<b>VERMI</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - asciutta.			
<b>Vermi di risaia</b> <i>Brachiura</i> spp.	Non ammessi interventi chimici			

**Varietà considerate resistenti al brusone:** CL26, CL46, CL71, CL80, CLXL745, Arsenal, Atlantis, Falco, Libero, Mare CL, Oceano, Sagittario, Te se o, Vulcano, Wang,

**Varietà considerate moderatamente resistenti al brusone:** CL12, SP55, Brezza, Castore, Elettra, Ercole, Fast, Fedra, Giglio, Luna CL, Orione, Roma, Sole CL, Thaibonnet, Tigre, Vasco, Yume

(da: "Resistance to neck blast caused by *Pyricularia oryzae* in Italian rice cultivars", 2015, autori P. Tritone, G. Mangiano e L. Tamburini – CREA Vercelli)



## DISERBO DEL RISO CON SEMINA IN ACQUA

EPOCA IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
Pulizia letti di semina Diserbo argini e sponde dei bacini	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. Le applicazioni sono ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi
	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone	nr	
Pre-semima	Graminacee	Ciclossidim (1) Cletodim (1)	nr nr	(1) Con infestanti emerse
	Riso crodo	Flufenacet Propanil Glifosate (1) Imazamox (2)	nr nr nr nr	il controllo può essere effettuato anche con il pirodiserbo (1) Interventi soprachioma con prodotti specificatamente registrati, nel limite del quantitativo sopra riportato. (2) Impiegabile esclusivamente su varietà tolleranti a Imazamox
In tutte le altre fasi	Giavoni	Clomazone (1) Azimsulfuron Cyalofop-butile	nr nr 60	(1) Post emergenza precoce
	Graminacee	Profoxydim Bispyribac sodium+Biopower Penoxsulam	nr nr nr	
	Ciperacee e Butomacee	Bensulfuron-metile MCPA (1)	nr nr	(1) Su Ciperacee.
	Eterantera	Halosulfuron-metile Bromoxinil (2)	nr 100	(2) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 14/09/2021
	Giavone, Alismataceae	Triclopir Florpyrauxifen-benzyl (3)	nr/30 60	(3) Anche in pre-semima, su infestanti già nate
	Eterantera	Bensulfuron-metile Metsulfuron	nr nr	

## DISERBO DEL RISO IN ASCIUTTA CON SEME INTERRATO

EPOCA IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
Pulizia letti di semina Diserbo argini e sponde dei bacini	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Pendimetalin	nr 90	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.  Le applicazioni sono ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi
Pre-semina	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Clomazone	nr	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin <b>Napropamide</b>	90 <b>nr</b>	
		Penoxsulam Pendimetalin	nr 90	
Dalla prima foglia	Giavone	Clomazone Cyalofop-butile Profoxydim (1)	nr 60 nr	(1) Da applicare al massimo sul 50% della sau aziendale a riso
		Bensulfuron-metile MCPA (1) Bromoxinil	nr 20 100	(1) Al massimo 1,4 litri di formulato commerciale all'anno  <b>(2) Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 14/09/2021
	Scirpus, Cyperus, Alium	Halosulfuron-metile Bispyribac sodium (3) Triclopir	nr nr nr/30	(3) Con coadiuvante Biopower (utilizzabile con gli erbicidi per i quali è specificamente autorizzato)
		Florpyrauxifen-benzyl (4)	60	(4) Anche in pre-semina, su infestanti già nate
	Eterantera	Bensulfuron + Metsulfuron	nr	Interventi localizzati.

**SOIA – Glycine max** (sinonimi: *Soja hispida*; *Soja max*; *Soja japonica*; *Glycine hispida*)

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Cancro dello stelo</b> <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> <b>Avvizzimento dello stelo</b> <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> <b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> var. <i>truncatum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali - ridotta densità colturale - evitare, soprattutto durante le fasi di maturazione dei baccelli, squilibri idrici - raccolta tempestiva delle piante giunte a maturazione		
<b>Marciume da Phytophthora</b> <i>Phytophthora megasperma</i> v. <i>sojae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - la difesa si basa essenzialmente sull'uso di varietà resistenti - evitare di riseminare soia o altre colture recettive per almeno 4-5 anni su terreni che hanno ospitato piante infette - favorire il drenaggio del suolo		
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - nella rotazione non inserire colture molto suscettibili come girasole, colza e fagiolo; evitare l'impiego di semente contaminata da sclerozi		
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora manshurica</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di cultivar resistenti o poco recettive		
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - avvicendamento con piante non suscettibili; buona sistemazione del terreno; impiego di seme sano		
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Maculatura batterica</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> impiego di seme controllato secondo il metodo della G.U. n°265 del 10/11/92 Decreto 12 ottobre 1992 - ampie rotazioni colturali		
<b>VIOSI</b> SMV, Mosaico della soia	Virus trasmesso per seme e per afidi: - ricorrere a seme sano (esente dal virus) - controllo delle erbe infestanti		

## SOIA

AVVERSITÀ'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Ragnetto rosso comune</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> terreno ben preparato in modo da favorire l'approfondimento dell'apparato radicale; irrigare prima che la coltura vada in stress. <b>Controllo biologico:</b> soglia 0,1- 0,2 acari per foglia, su un campione di 100 foglie ad ettaro. Lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> nelle chiazze infestate <b>Difesa chimica</b> Soglia: 2 forme mobili per foglia su un campione di 100 foglie ad ettaro. Consigliati interventi precoci e localizzati sui bordi.	Exitiiazox Bifenazate	34 30	Max. 1 intervento acaricida. Ammessi anche in miscela
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Monitorare la coltura e limitare l'intervento alle aree interessate, in genere limitate ai bordi dell'appezzamento – circa 10 metri -.	Lambdaialotrina	15	
<b>Mosca</b> <i>Delia platura</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare semine su terreni ben preparati, a giusta profondità, utilizzando seme con buona energia germinativa			

## SOIA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
<b>Pre-semi</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	S-Metolaclo (1) Pendimetalin Flufenacet Metribuzin Clomazone Petoxamid Metobromuron	Gli interventi in <b>pre-emergenza</b> <b>prevedono la selezione di popolazioni di amaranto resistenti</b> agli erbicidi ALS, ossia che agiscono tramite l'inibizione dell'enzima AcetoLattato Sintetasi – Oxasulfuron, Tifensulfuron metil, Imazamox -.
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Bifenox (2) Bentazone (3) Tifensulfuron metil Imazamox Clomazone	(1) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia. Intervenire secondo le indicazioni di etichetta, ed in generale con le infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da limitare le dosi e garantire una buona efficacia. (2) Impiegabile in preemergenza o in post-precoce. Specifico per problemi di amaranto resistenti. Impiegabile 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento. (3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente che venga applicato su sorgo, soia, erba medica
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D Cletodim Fluazifop-p-butile	E' preferibile che i graminicidi non siano miscelati con prodotti dicotiledonicidi, al fine di ottimizzarne l'efficacia.

## SORGO – *Sorghum vulgare*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>VIROSI</b>			
<b>Virus del nanismo maculato del mais</b> MDMV	<b>Interventi preventivi:</b> - eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti del virus)		
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Afidi dei cereali</b> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Metopolophium dirhodum</i>	Non sono previsti interventi specifici		

## SORGO - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen Pendimetalin	nr nr	Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Terbutilazina + S-Metolaclof (1) 2,4 D + MCPA Prosulfuron + Dicamba (2) MCPA + Dicamba Bentazone (3) Fluroxipir	nr 20 nr 70 nr nr	(1) Miscela impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato. (2) Con Prosulfuron una sola applicazione, ogni tre anni, sullo stesso appezzamento (3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su sorgo, soia, erba medica
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Mesotrione	nr	

## TABACCO – *Nicotiana tabacum*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora tabacina</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - scegliere cultivar resistenti; limitare l'impiego di fertilizzanti azotati; evitare investimenti eccessivamente fitti; assicurare un buon drenaggio del terreno <b>Difesa chimica:</b> -in primavera con condizioni climatiche predisponenti, piogge e temperature inferiori alle medie stagionali, intervenire preventivamente con prodotti di copertura in miscela con prodotti sistemici; alla comparsa dei primi sintomi usare prodotti citotropici o sistemici.	Metalaxil-M (1) Mancozeb (2) Cymoxanil (3) [Fosetil AI + Cymoxanil + Mancozeb] (2, 3) [Acibenzolar- S-m.+ Metalaxil-M] (1) Cyazofamid (4) Cymoxanil (3) + Zoxamide	7 - 7 40 7 - 14	(1) Con fenilammidi max 2 interventi all'anno. (2) Con Mancozeb max 2 interventi all'anno. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (3) Con Cymoxanil max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum,</i> <i>Oidium tabaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> -eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedenti; -effettuare la sbranciatura <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Penconazolo (1)	5 3 <b>3</b>	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria tabaci</i>		Fludioxonil + Ciprodinil (1)	nr	(1) Max 1 intervento all'anno
<b>Rizophus spp</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - limitare l'impiego di fertilizzanti azotati; raccogliere prodotto maturo			
<b>VIROSI</b> TMV Virus del Mosaico del Tabacco CMV Virus del Mosaico del Cetriolo TNV Virus della Necrosi del Tabacco PVY Virus Y necrotico della Patata	<b>Interventi agronomici:</b> impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; applicare corrette tecniche e profilassi in semenzaio; eliminare dal campo piantine e piante infette; eliminare i residui delle coltivazioni infette; effettuare rotazioni colturali adeguate. Il controllo in campo di tali virus, in particolare per il CMV, deve essere diretto agli afidi vettori, quindi risulta utile il ricorso a reti antiafidi in serra; frangivento e siepi in pieno campo.			
<b>Antigermoglianti</b>		1-Decanolo Idrazide maleica	7 7 / 10	Max 3 trattamenti indipendentemente dal prodotto utilizzato l'anno prodotto

## TABACCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in presenza generalizzata delle larve	Teflurin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1)	nr nr nr nr	(1) Impiego localizzato lungo la fila utilizzando uno dei prodotti indicati. Max 1 intervento anno, in alternativa tra loro. L'intervento non entra nel cumulo dei piretroidi (2) <b>Revocata.</b> Formulato granulare impiegabile fino al 30/11/2021
<b>Nottue</b> <i>Agrotis segetum, Agrotis Ipsilon</i>	<b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti sono ammessi fino a 50 giorni dal trapianto - effettuare trattamenti localizzati	<i>Bacillus thuringiensis</i> Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 3)	3 7 30	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno (2) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Nottue fogliari</b> <i>Mamestra, Spodoptera, Autografa</i>		<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Betaciflutrin (1, 3) Cipermetrina (1)	3 3 60 7 30 14	(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno, max 1 con Lambdacialotrina. Max 1 intervento anno fra Cipermetrina e Zetacipermetrina. (2) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (3) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Altica o Pulce del tabacco</b> <i>Epitrix hirtipennis</i>	<b>Difesa chimica</b> <u>Soglia:</u> erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile	Lambdacialotrina (1) Zeta cipermetrina (1, 3) Betaciflutrin (1, 4) Deltametrina (1) Acetamiprid (2)	60 7 30 3 14	(1) Piretroidi: vedi nota sopra. (2) Max 1 intervento all'anno (3) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (4) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Afidi</b> <i>Mysus persicae, Aphis fabae, Myzus nicotianae</i>	<b>Difesa chimica</b> <u>Soglia:</u> - in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime colonie lungo i bordi dell'appezzamento; - in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di infestazioni consistenti	Lambdacialotrina (1) Cipermetrina (1) Zetacipermetrina (1, 3) Betaciflutrin (1, 4) Deltametrina (1) Acetamiprid (2) Flupyradifurone	60 14 7 30 3 14 3	(1) Piretroidi: vedi nota sopra. (2) Max 1 intervento all'anno (3) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021 (4) <b>Revocata.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni - utilizzo di varietà tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica	Oxamyl Fluopyram <i>Paecilomyces lilacinus</i>	nr nr nr	

## TABACCO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre trapianto incorporato</b>	Graminacee e Dicotiledoni annuali	Napropamide	nr	Non controlla Solanum nigrum
<b>Pre trapianto (1)</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	nr	(1) Nei terreni leggeri, con il formulato al 38,7%, la dose consigliata è di 1 litro per ettaro (2) <b>Revoca impiego DM 22 marzo 2021</b>
		Aclonifen <del>Benfluralin</del> Metobromuron	nr	
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone (1)	nr	(1) Impiego localizzato sulla fila, max 50 cm. (2) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
		Piridate (2)	28	
<b>Post trapianto</b>	Graminacee	Propaquizafop	40	(1) Verificare autorizzazione formulati commerciali
		Quizalofop-p-etile	30	
		Quizalofop etile isomero D (1)	30	
		Fluazifop-p-butile	60	

(1) In pre-trapianto le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela vanno ridotte del 50% rispetto alle dosi riportate. La riduzione può essere attuata con

- a) interventi localizzati lungo la fila

- b) interventi a pieno campo a metà dose (azione condizionante)

- c) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervenendo in post sulla rimanente



## COLTURE FORAGGERE

### ERBA MEDICA – *Medicago sativa*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Apion</b> <i>Apton pisi</i>	L'intervento si può rendere necessario in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	Taufluvalinate Acetamiprid (1)	7 14	Indipendentemente dal prodotto utilizzato, è consentito al massimo 1 intervento insetticida all'anno.
<b>Fitonoma o punteruolo</b> <i>Hypera variabilis</i> <i>Hypera postica</i>	I danni sono arrecati dalle larve a maggio e dagli adulti nel periodo estivo	Taufluvalinate	7	(1) divieto di impiego in fioritura.
<b>Crisomela</b> <i>Phytodecta fornicata</i>	Può essere dannoso sui giovani medicali. Per limitare i danni è consigliabile anticipare lo sfalcio	Taufluvalinate Acetamiprid (1)	7 14	

### MEDICA - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a. - L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Piridate (1) Imazamox (2) Metribuzin (3) Tifensulfuron metil	28 40 60	(1) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti (2) Impiego solo nel primo anno d'impianto (3) Ammesso su non più del 50% della superficie
<b>Post emergenza</b>	Cuscuta	Propizamide (1)	nr	(1) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che, annualmente e complessivamente non potranno superare il 50% dell'intera superficie
<b>Post emergenza</b>	Graminacee	Quizalofop-p-etile Quizalofop etile isomero D Propaquizafop Cletodim	nr 20 30 40	Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

**LOIESSA – *Lolium multiflorum***

non sono ammessi interventi chimici

**PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACEE - *Dactylis glomerata*; *Festuca arundinacea***

**DIFESA INTEGRATA E DISERBO**

non sono ammessi interventi chimici

**TRIFOGLIO – *Trifolium* spp.**

**DIFESA INTEGRATA**

non sono ammessi interventi chimici

**DISERBO**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
Pre emergenza nel primo anno di impianto	Dicotiledoni e Graminacee	Benfluralin	

**PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE - *Dactylis glomerata*; *Festuca arundinacea*; *Medicago sativa*; *Trifolium***

**DIFESA INTEGRATA E DISERBO**

non sono ammessi interventi chimici

## COLTURE FRUTTICOLE

### ACTINIDIA (Kiwi verde - *Actinidia deliciosa*; Kiwi giallo – *Actinidia chinensis*; Kiwi berry – *Actinidia arguta*)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - Contenere lo sviluppo vegetativo e favorire l'arieggiamento dei frutti		
<b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora</i> spp.		<i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M (2) Fosetil Alluminio (3)	(1) Vedi nota sotto (2) Max 1 trattamento alla ripresa vegetativa – 180 giorni prima della raccolta. (3) Max 2 interventi fogliari dopo fioritura
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura. Asportare e distruggere i rami colpiti	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Acibenzolar-S-metile	(1) Vedi nota sotto.
<b>Cancro batterico</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i> PSA	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende vivaistiche autorizzate; effettuare concimazioni equilibrate; effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma; disinfettare gli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari; disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi; evitare irrigazioni sopra chioma; monitorare frequentemente gli impianti; tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 centimetri al disotto dell'area colpita, oppure estirpare le piante con sintomi sul tronco. <b>Difesa chimica</b> - Intervenire in considerazione dell'andamento stagionale e sulla base delle indicazioni dei bollettini di difesa	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (2) Acibenzolar-S-metile	(1) Dalla ripresa vegetativa in poi il rame può dare fenomeni di fitotossicità soprattutto su kiwi giallo. Verificare la registrazione dei formulati commerciali. Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo  (2) Da utilizzare preferibilmente in fioritura
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglia</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	Intervenire nella fase di migrazione delle neanidi di prima generazione <b>Soglia:</b> presenza diffusa sui rami o sui frutti. E' utile rimuovere le incrostazioni sul fusto mediante spazzolatura	<i>Olio minerale</i> (1) Spirotetramat (2)	(1) Verificare la registrazione dei formulati commerciali (2) Max 1 intervento
<b>Eulia</b> <i>Argyrotaenia pulchellana</i> (sin. <i>A. Ijungiana</i> )	La presenza è occasionale e raramente determina danni. Se ritenuto opportuno, installare le apposite trappole <b>Soglia:</b> oltre 50 adulti per trappola catturati dall'inizio del II° o III° volo. Verificare presenza effettiva di attacchi larvali.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Lambda-cialotrina (1)	(1) Max 1 intervento. Max 4 interventi anno tra Lambda-cialotrina, Deltametrina ed Etofenprox

**ACTINIDIA (Kiwi verde - Actinidia deliciosa; Kiwi giallo – Actinidia chinensis; Kiwi berry – Actinidia arguta)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Monitoraggio visivo o con apposite trappole. Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi. Molto utili, in caso di elevata presenza, le reti anti grandine e anti insetto.	Deltametrina (1) Etofenprox (2)	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno Max 4 interventi anno tra Lambda-cialotrina, Deltametrina ed Etofenprox
<b>Metalfa</b> <i>Metcalfa pruinosa</i>	Presenza occasionale	Etofenprox (1) <i>Olio essenz. arancio dolce</i> (2) <i>Sali di potassio di acidi grassi</i>	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 3 interventi all'anno
<b>Miridi</b>		Etofenprox (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne hapla</i>			

**ACTINIDIA - DISERBO**

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
Erbicida fogliare Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto all'anno con formulati a 360 g/L.
Erbicidi fogliari e spollonanti Dicotiledoni	Carfentrazone Pyraflufen-ethyl	Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del giorno).

**Interventi agronomici:** inerbimento, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

**Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.** L'area trattata con Glifosate non deve superare il 30% dell'intera superficie; con Carfentrazone e Pyraflufen-ethyl il 50% dell'intera superficie. Le dosi di Glifosate sopra riportate sono già calcolate in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.

**Fitotossicità.** Carfentrazone e Pyraflufen-ethyl: utilizzare accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del giorno). Glifosate: evitare che il prodotto arrivi a contatto di polloni radicali e in generale di parti non lignificate.

## ALBICOCCO – *Prunus armeniaca*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>Monilia</b> <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i>	<b>Difesa chimica:</b> - è opportuno trattare in pre-floritura. Se durante le successive fasi fino alla scamicatura si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione (elevata umidità e prolungata bagnatura della pianta) si consiglia di ripetere il trattamento  - si consiglia di limitare gli interventi in pre-raccolta alle cvs ad elevata suscettibilità o in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Polisolfuro di calcio</i> Fenbuconazolo (1) Miclobutanil (1) Tebuconazolo (1) Difenoconazolo (1) Cyprodinil (2) Fludioxonil + Cyprodinil (2) Boscalid (6) + Pyraclostrobin (3) Trifloxystrobin (3) + Tebuconazolo (1) Fenexamide (4) Fenpirazamina (4) Boscalid (5) Fluopyram (5) + Tebuconazolo (1) Penthiopirad (5) Isofetamid (5)	Contro questa avversità non più di tre interventi all'anno con mezzi chimici (1) Con IBE max 3 interventi all'anno. Con Difenoconazolo, Miclobutanil, Tebuconazolo max 2 interventi all'anno, in alternativa tra loro. (2) Max 1 intervento all'anno in alternativa tra loro (da solo o in miscela) (3) Max 2 interventi all'anno con strobilurine – Pyraclostrobin, Trifloxystrobin. (4) Max 3 interventi all'anno con prodotti contenenti Fenexamide o Fenpirazamina (5) Max 3 interventi all'anno con prodotti contenenti SDHI – Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad, Fluxapyroxad, Isofetamid.
<b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire a caduta foglie e/o a scamicatura	<i>Prodotti rameici</i> (1) Captano (2)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo (2) Tra Mancozeb e Captano max 3 interventi anno. Verificare registrazione formulati commerciali
<b>Oidio</b> <i>Oidium crataegi</i> <i>Oidium leucoconium</i>	<b>Difesa chimica:</b> - negli impianti solitamente colpiti intervenire preventivamente nelle fasi di scamicatura ed inizio ingrossamento frutti. Successivi interventi andranno effettuati alla comparsa delle prime macchie di oidio.	<i>Zolfo</i> <i>Polisolfuro di calcio</i> Fenbuconazolo (1) Miclobutanil (1) Tebuconazolo (1) Tetraconazolo (1) Boscalid (2)+ Pyraclostrobin (3) Trifloxystrobin (3) + Tebuconazolo (1) Tebuconazolo (1) + Fluopyram (2) Penthiopirad (2) Fluxapyroxad (2) Bupirimate (4)	(1) IBE: vedi nota sopra. (2) Max 3 interventi all'anno con prodotti contenenti SDHI - Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad, Fluxapyroxad, Isofetamid (3) Max 2 interventi all'anno con strobilurine – Pyraclostrobin, Trifloxystrobin. (4) Max 2 interventi all'anno

## ALBICOCCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>Nerume delle drupacee</b> <i>Cladosporium carpophilum</i>	<b>Interventi agronomici</b> Asportare durante la potatura i rametti infetti <b>Difesa chimica:</b> Condizioni di bagnatura persistente favoriscono l'infezione. La fase di maggior rischio parte da inizio scamicatura e si potrae per circa 30 giorni	<i>Prodotti rameici</i> (1) Mancozeb (2) Pyraclostobin (3)	(1) Max 4 kg etaro/anno di rame metallo. (2) Tra Mancozeb e Captano max 3 interventi anno. <b>Mancozeb revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (3) Max 2 interventi all'anno con strobilurine – Pyraclostobin, Trifloxystrobin.
<b>Batteriosi</b> <i>Xanthomonas pruni</i> , <i>Pseudomonas syringae</i>	In fase di potatura asportare ed eliminare i rami infetti <b>Soglia:</b> Presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente. Intervenire a ingrossamento gemme	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 kg etaro/anno di rame metallo. Possibilità di impiego di un formulato specifico anche in vegetazione, max 4 interventi.
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglie</b> <i>Comstockaspis pernicioso</i> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Pseudococcus comstoki</i>	Soglia: trattare solo con presenza del parassita sui rami e sui frutti nell'annata precedente.	Oli bianchi Pyriproxyfen (1) Spirotetramat (2)	(1) Max 1 trattamento all'anno in pre-fioritura (2) Max 1 intervento all'anno
<b>Anarsia</b> <i>Anarsia lineatella</i>	Installare, entro l'ultima decade di aprile, almeno 2 trappole per azienda oppure fare riferimento a monitoraggi comprensoriali <b>Soglia:</b> intervenire al superamento della soglia di 7 catture per trappola a settimana o 10 catture per trappola in due settimane	<i>Feromoni sessuali</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Metossifenozide (1) Triflumuron (2) Acetamiprid (3) Indoxacarb (4) Spinosad (5) Spinetoram (5) Etofenprox (6) Clorantraniliprole (7) Emamectina (8)	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno. (4) Max 2 trattamenti all'anno (5) Max 3 interventi all'anno con spinosine, max 1 con Spinetoram. (6) Max 1 intervento all'anno (7) Max 2 interventi all'anno (8) Max 2 interventi all'anno
<b>Cidia</b> <i>Cydia molesta</i>	Dove le caratteristiche del frutteto lo consentono, i metodi della confusione e del disorientamento risultano molto efficaci <b>Difesa chimica</b> Soglia: 10 catture per trappola a settimana	<i>Feromoni sessuali</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1)	(1) Max 2 trattamenti all'anno
<b>Tignola delle gemme</b> <i>Recurvaria nanella</i> <b>Cheimatobia o Falena</b> <i>Operophtera brumata</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in presenza di danni diffusi	<i>Bacillus thuringiensis</i>	

## ALBICOCCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Eulia</b> <i>Argyrotaenia pulchellana</i> (sin. <i>A. ljungiana</i> )	Non sono ammessi interventi contro la prima generazione. Sulla seconda: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti.	<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Forficule</b>	<b>Interventi:</b> si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile, prima della risalita degli insetti sulla chioma, nelle aziende colpite negli anni precedenti. Utile anche il posizionamento di piccoli contenitori, es. pezzi di canna di bambù chiusa da un lato, nella parte bassa delle piante, dove di giorno le forficule si rifugiano. Vanno poi raccolti e allontanati.		
<b>Afidi</b> <i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>		<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> Pirimicarb (1) Acetamiprid (2) Spirotetramat (3) Taufluvinalinate	Contro questa avversità max. 1 intervento all'anno. (1) Max 1 intervento anno (2) Max 2 interventi anno (3) Solo post-floritura, max 1 intervento all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Monitoraggio: gli adulti svernanti sono rilevabili già da marzo. L'ovodeposizione avviene verso fine maggio. Gli adulti della seconda generazione si hanno da inizio-metà luglio.	Acetamiprid (1) Deltametrina (2) Etofenprox (2) Taufluvinalinate (2) Triflumuron (3)	Alcuni prodotti previsti per altre avversità sono efficaci anche contro la cimice. (1) Max 2 interventi anno (2) Max 3 interventi all'anno con piretroidi. Deltametrina max 2; Taufluvinalinate 2; Etofenprox max 1- (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Cicaline</b> <i>Empoasca</i> e altre		Etofenprox (1)	(1) Max 1 intervento all'anno
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophyla suzukii</i>	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela. Eliminare tempestivamente i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> Spinetoram (1)	(1) Max 1 intervento all'anno, nel limite dei 3 complessivi tra Spinosad e Spinetoram.
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare piante certificate, - se necessario utilizzare portainnesti resistenti		

N.B. La limitazione al numero di interventi all'anno è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall'avversità

**DIFESA INTEGRATA DEL CASTAGNO DA FRUTTO – *Castanea sativa***

<b>AVVERSITA'</b>	<b>CRITERI D'INTERVENTO</b>	<b>SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI</b>	<b>LIMITAZIONI D'USO</b>
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Cancro della corteccia</b> <i>Cryphonectria parasitica</i>	<b>Interventi agronomici</b> Eliminazione delle branche disseccate <b>Difesa chimica</b> Interventi localizzati sulle parti colpite	<i>Prodotti rameici</i>	Interventi localizzati su innesti o piccoli tagli. Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Mal dell'inchiostro</b> <i>Phytophthora cambivora</i>	<b>Interventi agronomici</b> Evitare i ristagni idrici Eliminare i primi centri di infezione	<i>Prodotti rameici</i>	Interventi localizzati al colletto sulle piante colpite nelle prime fasi di sviluppo dell'avversità.
<b>Cancro del colletto</b> <i>Diplodinia castaneae</i>		<i>Prodotti rameici</i>	
<b>Oidio</b> <i>Microsphaera alphitoides</i>		<i>Zolfo</i>	Verificare registrazione Formulati Commerciali
<b>Fersa o seccume</b> <i>Mycosphaerella maculiformis</i>	eliminare e distruggere le parti disseccate	<i>Prodotti rameici</i> Boscalid+ Pyraclostrobin (1)	(1) Max 2 interventi anno
<b>Muffa nera delle castagne</b> <i>Ciboria batschiana</i> <b>Mummificazione delle castagne</b> <i>Phomopsis spp.</i>	Raccolta e distruzione dei residui vegetali sotto le piante.	Nessun trattamento	
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Balanino</b> <i>Curculio elephas</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	Nessun trattamento	
<b>Tortricide precoce</b> <i>Pammene fasciana</i> <b>Tortricide intermedia</b> <i>Cidia fagiglandiana</i> <b>Tortricide tardiva</b> <i>Cidia splendana</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato	<i>Bacillus thuringiensis</i> Clorantropole (1) Emamectina (2)	(1) Ammesso su cidia, max 1 intervento all'anno (2) Max 1 intervento all'anno
<b>Afide bruno</b> <i>Lachnus roboris</i>		Nessun trattamento	
<b>Cinipide galligeno</b> <i>Dryocosmus kuriphilus</i>	<b>Controllo biologico</b> Introduzione del parassitoide <i>Torymus sinensis</i>		



**CILIEGIO (Ciliegio dolce - *Prunus avium*; Ciliegio acido – *Prunus cerasus*)**

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> vedi Monilia. <b>Difesa chimica:</b> - si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa vegetativa. Eccezionalmente si può effettuare un intervento nella fase compresa tra caduta petali e scamicatura.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Ziram (2) Captano (2)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 4 interventi all'anno tra Ziram, Captano e Mancozeb. Ziram al massimo 2 interventi.
<b>Monilia</b> <i>Monilia laxa</i> <i>Monilia fructigena</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria. Asportare con la potatura rami e/o branche infetti <b>Difesa chimica:</b> I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a caduta petali. In caso di pioggia o elevata umidità, intervenire anche nella fase di invaiatura fino in prossimità della raccolta	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Polisolfuro di calcio</i> <b>Bicar-bonato di potassio</b> Fenexamide (1) Fenpirazamina (1) Fenbuconazolo (2) Tebuconazolo (2) Boscalid (3) + Pyraclostrobin (5) Boscalid (3) Isfetamid (3) Cyprodinil + Fludioxonil (4) Trifloxystrobin (5)+Tebucon.(2) Tebuconazolo (2)+Fluopyram (3)	Contro questa avversità ammessi complessivamente 5 interventi all'anno. (1) Max 3 interventi all'anno tra Fenexamide e Fenpirazamina (2) Con IBE max 3 interventi all'anno. (3) Max 3 interventi all'anno con SDHI - Boscalid, Fluopyram, Isfetamid (4) Max 1 intervento all'anno (5) Con Pyraclostrobin e Trifloxystrobin max 3 interventi anno
<b>Nebbia o secume</b> <i>Gnomonia erythrostoma</i> <b>Cilindrosporiosi</b> <i>Cylindrosporium padi</i>	<b>Difesa chimica:</b> - questo patogeno viene normalmente contenuto dai trattamenti eseguiti contro il Corineo. Si interviene solo in presenza di attacchi diffusi	<i>Prodotti rameici</i> (1) Dodina (2) Fenbuconazolo (3) Mancozeb (4)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 interventi all'anno, ammesso per cilindrosporiosi (3) Nei limiti IBE (vedi sopra) (4) Max 2 interventi. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022.
<b>Batteriosi</b> <i>P. syringae p. v morsprunorum</i> <i>Xanthomonas</i> spp	<b>Soglia:</b> presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente. Intervenire a ingrossamento gemme.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Interventi ammessi al bruno. In vegetazione possibilità di impiego di specifici formulati, verificare etichette.
<b>FTOFAGI</b>			
<b>Cocciniglia di San José</b> <i>Comstockaspis pernicioso</i> <b>Cocciniglia a virgola</b> <i>Mytilococcus ulmi</i> <b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	<b>Soglia:</b> - in aree ad elevato rischio: presenza - negli altri casi: 3% di organi infestati	Oli bianchi Fosmet (1) Spirotetramat (2) Pyriproxyfen (3) Sulfoxaflor	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 1 intervento all'anno, in prefioritura
<b>Tripidi</b>		<i>Spinosad</i> (1)	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine
<b>Ragno rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>		<i>Olio minerale</i> Acrinatrina (1)	(1) Max 1 intervento, nel limite dei 2 piretroidi

## CILIEGIO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Tignola delle gemme</b> <i>Argyresthia ephipella</i>			
<b>Afide nero</b> <i>Myzus cerasi</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: in aree ad elevato rischio di infestazione: presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> Pirimicarb (1) Acetamiprid (2) Spirotetramat (3) Tauflualinate (4) Sulfoxaflor Flonicamid (5)	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi con piretroidi (Tauflualinate max 2; Deltametrina max 2; Etofenprox max 1; Acrinatrina max 1) (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Mosca delle ciliegie</b> <i>Rhagoletis cerasi</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire nella fase di "invaiaura" dopo aver accertato la presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle da installare nella prima decade di maggio o fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali e alle indicazioni dei bollettini di difesa integrata <b>Soglia:</b> presenza	<i>Beauveria bassiana</i> Etofenprox (1) Acetamiprid (2) Deltametrina (3) Fosmet (4) <i>Spinosad</i> esca (5)	(1) Max 1 intervento, nel limite dei 2 piretroidi (2) Max 2 interventi anno (3) Max 2 interventi nel limite dei piretroidi (4) Max 1 intervento, attenzione alle varietà e ai formulati, per evitare fitotossicità (5) Max 5 interventi
<b>Cheimatobia o Falena</b> <i>Operophtera brumata</i>	Contro Cheimatobia, in autunno si possono applicare sul tronco a 1,5 m di altezza strisce collate per catturare le femmine attere che risalgono verso la chioma per deporre le uova	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Archips podana - Archips podanus</b> <i>Archips rosanus</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: 5% di organi infestati	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1) Acetamiprid (2) Spinetoram (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi anno (3) Max 1 intervento all'anno, nel limite di 3 con spinosine
<b>Tignola dei fruttiferi</b> <i>Recurvaria nanella</i>			
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophyla suzukii</i>	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela. Particolare attenzione va posta sulle varietà a raccolta tardiva.	<i>Piretrine pure</i> Acetamiprid (1) Deltametrina (2) Spinetoram (3)	(1) Max 2 interventi anno (2) Max 1 intervento nel limite dei 2 piretroidi (3) Max 1 intervento all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Si possono avere danni a maggio – giugno con elevata presenza di adulti che hanno svernato nelle vicinanze	Deltametrina (1) Acetamiprid (2) Etofenprox (3)	(1) Max 2 interventi, nel limite dei 2 piretroidi (2) Max 2 interventi anno (3) Max 1 intervento, nel limite dei 2 piretroidi
<b>Piccolo scoltide dei fruttiferi</b> <i>Scolytus rugulosus</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i segni(fori) dell'infestazione e bruciarli prima della fuoriuscita degli adulti (aprile). Evitare cataste di rami, branche o tronchi residui di potatura o di espianati in prossimità dei frutteti		

## KAKI – *Diospyros kaki*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Cancro</b> <i>Phomopsis diospyri</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Taglio e bruciatura degli organi infetti <b>Difesa chimica:</b> In presenza di sintomi intervenire a caduta foglie	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Maculatura fogliare</b> ( <b>Cercosporiosi</b> ) <i>Mycosphaerella nawae</i>		Pyraclostrobin (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Sesia</b> <i>Synanthedon tyulififormis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Rimuovere le parti corticali alterate ospitanti le larve e chiudere con paste cicatrizzanti <b>Difesa chimica (con olio min.):</b> In maggio giugno e agosto settembre intervenire con 10 – 15% di piante infestate nella fase di farfallamento degli adulti	<i>Olio minerale</i> <i>Nematodi entomopatogeni</i>	
<b>Mosca della frutta</b> <i>Ceratitis capitata</i>	<b>Difesa chimica:</b> Trattare solo in presenza di presenza sui frutti di punture di ovodeposizione In caso di catture controllare la presenza di punture. Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo innescate con Trimedlure.	<i>Beauveria bassiana</i> Etofenprox (1) <i>Spinosad esca</i> (2) Attract and kill con: Deltametrina	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Utilizzabile sotto forma di esca pronta all'uso. Al massimo 5 applicazioni all'anno
<b>Cocciniglie</b> <i>Ceroplastes</i> spp, <i>Pseudococcus</i> spp, <i>Planococcus</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire solo in caso di presenza diffusa	<i>Olio minerale</i> Spirotetramat	
<b>Metcalfa</b> <i>Metcalfa pruinosa</i>	<b>Soglia:</b> Presenza	Etofenprox (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Si possono avere danni in prossimità della raccolta.		
<b>Miridi</b>		Etofenprox (1)	(1) Max 2 interventi all'anno

## DISERBO KAKI

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
Erbicida fogliare Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto all'anno con formulati a 360 g/L. L'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.

**MELO – Malus domestica**

AVVERSITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUS.	LIMITAZIONI D'USO
<b>Ticchiolatura</b> <i>Venturia inaequalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> E' fondamentale prevenire le infezioni primarie che si verificano dalla ripresa vegetativa fino al mese di maggio, inizio giugno, in coincidenza di piogge. E' opportuno seguire le previsioni del tempo e intervenire in maniera preventiva. Va tenuto conto che ogni tre - quattro giorni si ha la formazione di nuove foglie. In caso di necessità si interviene con prodotti retroattivi. Interrompere i trattamenti anticicchiolatura, o ridurli sensibilmente dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolatura.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Polisolfuro di Ca</i> <i>Laminarina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Zolfo</i> Ditianon (2) Captano (2) Ciprodinil (3) Pirimethanil (3) IBE in nota (A, 4) Metiram (5) Mancozeb (5, 6) Trifloxystrobin (7) Pyraclostrobin (7) Fluazinam Penthiopirad (8) Fluopyram (8) Fluxapyroxad (8) Boscalid (8) Fosfonato di K (9) Fosetil AI (9) Dodina (10)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Tra Ditianon e Captano al massimo 16 interventi all'anno (3) Con anilino pirimidine, non più di 4 trattamenti all'anno. Massimo 2 con prodotti contenenti Ciprodinil. (4) Con IBE non effettuare più di 4 trattamenti all'anno. Vedi anche nota (A) in calce. (5) Con i ditiocarbammati max 6 interventi anno entro il 15 giugno. Metiram max 3. Con Mancozeb max 4. (6) Mancozeb <b>revocato</b> : impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (7) Con strobilurine max 3 interventi all'anno. Pyraclostrobin disponibile in miscela con altre sa. (8) Con SDHI - Boscalid *, Penthiopirad, Fluopyram *, Fluxapyroxad - max 4 interventi all'anno. * disponibili in miscela con altre sa. (9) Con prodotti contenenti Fosetil o Fosfonati massimo 10 interventi all'anno (10) Massimo 2 interventi all'anno
<b>Oidio</b> <i>Oidium farinosum</i> <i>Podosphaera leucotricha</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme oiidiate ed eliminare in primavera - estate i germogli colpiti <b>Difesa chimica:</b> - sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio intervenire sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Bupirimate (1) IBE in nota (A, 2) Trifloxystrobin (3) Pyraclostrobin (3) Ciflufenamide (4) Fluxapyroxad (5) Fluopyram (5) Boscalid (5) Meptyldinocap (6)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Con IBE non effettuare più di 4 trattamenti all'anno. Vedi nota (A) in calce. (3) Con strobilurine max 3 interventi all'anno. Pyraclostrobin disponibile in miscela con altre sa. (4) Max 2 interventi all'anno (5) Con SDHI - Boscalid *, Penthiopirad, Fluopyram *, Fluxapyroxad - max 4 interventi all'anno. * disponibili in miscela con altre sa. (6) Max 2 interventi all'anno
<b>Cancri e disseccamenti rameali</b> <i>Nectria galligena</i> ecc.	<b>Interventi agronomici:</b> asportare le parti colpite <b>Difesa chimica:</b> il Tiofanate-metil va utilizzato dopo la raccolta, e prima della caduta delle foglie.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Tiofanate-metil (2) Captano (3) <b>Fosfonato di K (3)</b>	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 interventi, da post raccolta a pre-fioritura. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 19/10/2021 (3) Vedi nota sopra

MELO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Marciume lenticellare</b> <i>Gleosporium album</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in preraccolta, sulle varietà sensibili	Boscalid + Pyraclostrobin (1) Fludioxonil (2) Pirimethanil + Fludioxonil (2) Captano (3)	(1) Con la miscela max 3 interventi all'anno. Max 3 all'anno con strobilurine. (2) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil (3) Vedi nota sopra
<b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora cactorum</i>	Evitare i ristagni idrici, favorire il drenaggio <b>Difesa chimica:</b> intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite dopo la ripresa vegetativa.	<i>Prodotti rameici</i> Fosetil AI (1) Metalaxil-M	Trattare in modo localizzato solo le piante colpite. Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo (1) Ammessi anche trattamenti fogliari.
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria sp</i>	<b>Difesa chimica:</b> - nei frutteti con danni accertati l'anno precedente	Pyraclostrobin (1) Boscalid (2) Fluazinam Fludioxonil (3)	(1) Max 3 all'anno con strobilurine (2) Nel limite degli SDHI (3) Max 2 interventi all'anno con Fludioxonil
<b>Patina bianca</b> <i>(Tilletiopsis spp.)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Limitare gli apporti di azoto, in particolare nelle concimazioni fogliari durante il periodo di accrescimento dei frutti. Sesti di impianto e potatura devono garantire un buon areggiamento della chioma.	<i>Zolfo</i>	Trattamenti con bicarbonato di K e zolfo liquido possono limitare la diffusione dell'avversità. Verificare registrazione dei formulati.
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Colpo di fuoco batterico</b> <i>Erwinia amylovora</i>	Rispetto delle disposizioni di lotta obbligatoria di cui al D.M. n 356/99. E' fondamentale e risolutiva la tempestiva eliminazione delle parti colpite.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Acybenzolar S methyle <b>Fosetil AI (2)</b>	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. <b>(2) Vedi limitazione Fosetil e Fosfonati</b>
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglia di S. José</b> <i>Comstockaspis perniciosia</i> <i>(Quadraspidiotus perniciosus)</i>	<b>Soglia:</b> trattare a fine inverno con presenza del parassita sui rami o sui frutti nell'anno precedente.  Eventuali interventi estivi sono da considerarsi a completamento della difesa invernale.	Oli minerali Pyriproxyfen (1) Fosmet (2) Spirotetramat (3) Sulfoxaflor	(1) Massimo 1 intervento anno, in pre fioritura (2) Max 2 interventi all'anno (3) Massimo 1 intervento all'anno
<b>Afide Grigio</b> <i>Dysaphis plantaginea</i>	<b>Difesa chimica:</b> - è generalmente necessario l'intervento in prefioritura. Dopo la fioritura verificare la comparsa di reinfestazioni e valutare la possibilità di controllo da parte di insetti utili (coccinelle, crisope, ditteri sirfidi, ditteri cecidomidi e imenotteri parassitoidi).	<i>Azadiractina</i> <i>Piretrine pure</i> Taufluvinate (1) Flonicamid (2) Acetamiprid Spirotetramat (3) Pirimicarb (4) Sulfoxaflor Flupyradifurone (5)	(1) Max 2 interventi anno, nel limite di 4 interventi complessivi tra piretroidi ed Etofenprox (2) Max 2 interventi anno (3) Massimo 1 intervento all'anno (4) Max 1 intervento all'anno (5) Max 1 intervento, ad anni alterni

MELO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b> <b>Pandemis e Archips</b> <i>Pandemis cerasana</i> , <i>Archips podanus</i>	Installare le trappole oppure fare riferimento ai monitoraggi compensoriali <b>Soglia per Pandemis e Archips:</b> generazione svernante 20 % dei mazzetti occupati da larve; generazioni successive: superamento della soglia di 15 adulti di <i>Pandemis</i> catturati per trappola in due settimane o 30 adulti come somma delle due specie. <b>Soglia per Eulia:</b> prima generazione: superamento del 5% di getti infestati; altre generazioni: 50 adulti per trappola	<i>Bacillus thuringiensis</i> Metossifenozide (1) Tebufenozide (1) <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Clorantraniliprole (3) Emamectina (4) Indoxacarb (5)	(1) Triflumuron, Metossifenozide, Tebufenozide max. 3 interventi anno. Max 2 Triflumuron, max 2 Tebufenozide, max 1 Metossifenozide (2) Max 3 interventi all'anno con spinosine Con Spinetoram max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di etichetta) (5) Max 4 interventi all'anno
<b>Carpocapsa</b> <i>Cydia pomonella</i>	<b>Difesa chimica:</b> è fondamentale controllare bene la prima generazione. Seguire il volo con le trappole, a partire dal 15 – 20 aprile; per la deposizione delle uova sono necessarie temperature crepuscolari superiori a 16 gradi per alcuni giorni; con l'uso di larvicidi va considerata la somma termica, pari a 90 gradi giorno, dalla deposizione delle uova alle nascite larvali. <b>Controllo biologico:</b> nematodi entomopatogeni contro le larve svernanti. Reti antinsetto "AltCarpò", che chiudono il filare o un intero appezzamento. Anche le sole reti anti-grandine limitano l'insetto. A fine stagione, in caso di attacchi importanti, è utile l'impiego di <i>Nematodi entomopatogeni</i>	<i>Tecniche basate sull'uso di feromoni</i> <i>Virus della granulosa</i> Fosmet (1) Etofenprox (2) Deltametrina (2) <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Acetamiprid Clorantraniliprole (4) Emamectina (5) Metossifenozide (6) Tebufenozide (6) Triflumuron (6)	(1) Max 2 interventi anno (2) Nel limite dei 4 piretroidi. Etofenprox max 2; Deltametrina max 3. (3) Max 3 interventi anno con spinosine. Con Spinetoram max 1 intervento all'anno (4) Max 2 interventi anno (5) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di etichetta) (6) Triflumuron, Metossifenozide, Tebufenozide max. 3 interventi all'anno. Max 2 Triflumuron, max 2 Tebufenozide, max 1 Metossifenozide
<b>Cidia del Pesco</b> <i>Cydia molesta</i> (sin. <i>Grapholita molesta</i> )	Nelle aree con accertata presenza del parassita installare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento ai monitoraggi compensoriali. <b>Soglia:</b> intervenire nel periodo precedente la raccolta, con almeno 10 catture settimanali.	<i>Tecniche basate sull'uso di feromoni</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Fosmet (1) Metossifenozide (2) Etofenprox (3) <i>Spinosad</i> (4) Spinetoram (4) Clorantraniliprole (5) Emamectina (6) Triflumuron (7)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 1 intervento anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 3 interventi all'anno con spinosine, max 1 con Spinetoram (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di etichetta) (7) Max 2 interventi all'anno, nel limite dei regolatori di crescita
<b>Piralide del mais</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> sfalci abbastanza frequenti <b>Difesa chimica:</b> interventi a partire da fine luglio dove si sono riscontrati danni agli anni precedenti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> (1) Indoxacarb (2)	(1) Solo alcuni formulati commerciali riportano l'impiego verso piralide su melo (2) Max 4 interventi all'anno

MELO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cemiosoma</b> <i>Leucoptera malifoliella</i> <b>Litocollete</b> <i>Phyllonoricter spp.</i>	Normalmente non sono richiesti interventi specifici. E' sufficiente attuare una difesa rispettosa degli antagonisti naturali.	Acetamiprid <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Clorantprilprole (2) Emamectina (3)	(1) Max 3 interventi anno con spinosine. Max 1 Spinetoram (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 3 anno (verificare indicazioni di etichetta)
<b>Rodilegno rosso e giallo</b> <i>Cossus cossus</i> <i>Zeuzera pyrina</i>	Controllo biologico Risultano efficaci le trappole per le catture massali	<i>Catture massali con trappole a feromoni</i> Triflumuron (B) (1)	(1) Ammesso per Zeuzera
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>	Nella maggior parte dei casi è ben controllato dagli antagonisti naturali. In particolari situazioni, errori nella difesa o temperature eccessive, possono verificarsi pullulazioni, a volte circoscritte. <b>Soglia:</b> intervenire al superamento della soglia del 90% di foglie occupate dal fitofago. Valutare la presenza e la possibilità di controllo da parte di fitoseidi o del coccinellide <i>Stethorus</i> .	<i>Sali potassici acidi grassi</i> Clofentezine Etoxazole Exitiazox Pyridaben Abamectina Milbemectina Acequinocil Bifenazate Fenpiroximate Cyflumetofen <b>Tebufenpirad</b>	Max. 1 intervento all'anno contro questo parassita. Si precisa che la miscela adalticida + ovicida va considerata un intervento
<b>Afide lanigero</b> <i>Eriosoma lanigerum</i>	<b>Interventi agronomici</b> - limitare i grossi tagli nelle potature; - eliminare i rami colpiti	Acetamiprid Spirotetramat (1) Pirimicarb (2) Sulfoxaflor	(1) Massimo 1 intervento all'anno (2) Massimo 1 intervento all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halymorpha hahys</i>	Eseguire il <b>monitoraggio</b> con le apposite trappole, o visivo, oppure mediante frappe (da fare con temperature basse, sotto i 20 gradi). <b>Interventi</b> se possibile, <b>mirati</b> : sui bordi, solo parti alte, a file alterne. Garantire una <b>buona bagnatura</b> delle parti alte della chioma. Consigliata l'aggiunta di bagnanti/adesivanti e olii vegetali. <b>Trattare con temperature basse</b> , sotto i 20 gradi, quando l'insetto è meno mobile. Molto utili le <b>reti</b> : antigrandine; monoblocco con chiusure laterali; monofila.	<i>Piretrine pure</i> Acetamiprid Taufluvalinatate (1) Deltametrina (1) Lambda-cialotrina (1) Etofenprox (1) Triflumuron (2)	(1) Con piretroidi massimo 4 interventi anno. Max 2 con Taufluvalinatate, max 3 Deltametrina, max 1 Lambdacialotrina, max 2 Etofenprox. (2) Max 2 interventi anno

N.B. **Le limitazioni al numero di interventi** con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a **tutti gli interventi effettuati** nell'anno, **indipendentemente dall'avversità**

MELO

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Tingide</b> <i>Stephanitis pyri</i>	Intervenire sulle neanidi della prima generazione, orientativamente tra metà maggio e inizio giugno	<i>Piretrine pure</i> Olii estivi	
<b>Afide verde</b> <i>Aphis pomi</i>	<b>Soglia:</b> - infestazione diffusa con danni da melata. Valutare la presenza di insetti utili.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> Acetamiprid Flonicamid (1) Spirotetramat (2) Sulfoxaflor Flupyradifurone (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Massimo 1 intervento all'anno (3) Max 1 intervento, ad anni alterni
<b>Sesia</b> <i>Synanthedon myopaeformis</i> , <i>S. typhiaeformis</i>	Si consiglia di utilizzare le trappole a feromoni. Gli IGR impiegati contro altre avversità, sono efficaci anche contro la Sesia	<i>Catture massali con trappole alimentari</i> <i>Nematodi entomopatogeni</i>	
<b>Orgia</b> <i>Orgyia antiqua</i>	<b>Soglia:</b> - presenza di attacchi larvali	<i>Bacillus thuringiensis</i> Triflumuron (1)	(1) Max 2 interventi anno, nel limite dei 3 con regolatori di crescita
<b>Mosca delle frutta</b> <i>Ceratitis capitata</i>	<b>Soglia:</b> attacchi molto occasionali. Intervenire in caso di presenza accertata della mosca e dei primi attacchi sui frutti. Utili esche a base di proteine idrolizzate o melassa	<i>Beauveria bassiana</i> Acetamiprid Etofenprox (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Cicaline</b> <i>Edwardsiana rosae</i> , <i>Erythroneura flam.</i> , <i>Empoasca vitis</i>		<i>Olio essenz. arancio dolce</i> Acetamiprid Etofenprox (1)	(1) Massimo 2 interventi all'anno
<b>Cocciniglia cotonosa</b> <i>Pseudococcus comstocki</i>	<b>Soglia:</b> presenza diffusa nell'anno precedente	Spirotetramat (1)	(1) Massimo 1 intervento all'anno
<b>Eriofide</b> <i>Aculus schlectendali</i>		<i>Olio minerale</i> Abamectina (1)	(1) Massimo 1 intervento all'anno

(A) Con IBE (Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Flutriafol, **Miclobutanil**, Penconazolo, **Tebuconazolo**, Tetraconazolo) massimo 4 interventi all'anno. Tebuconazolo e Miclobutanil complessivamente massimo 3 anno (max 3 Tebuconazolo, max. 2 Miclobutanil).



## MELOGRANO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Antraconosi - <i>Sphaceloma</i> (= <i>Gloeosporium</i> ) <i>punicae</i>			
<b>Oidio</b>		<i>Zolfo</i>	
<b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> Predisporre l'impianto su terreni e con sistemazioni tali da evitare ristagni idrici e favorire un buon drenaggio.		
<b>Afidi</b> <i>Aphis gossypii</i> Glover <i>A. punicae</i> Passerini		<i>Piretrine pure</i>	
<b>Cocciniglia</b> <i>Planococcus citri</i>	<b>Interventi agronomici</b> Favorire l'attività dei nemici naturali. Controllare le formiche che, attratte dalla melata, rappresentano un fondamentale fattore di diffusione dello pseudo coccide. Nel periodo invernale è buona norma eliminare i rami maggiormente attaccati dalla cocciniglia	<i>Olio minerale</i>	
<b>Mosca mediterranea della frutta</b> <i>Ceratitis capitata</i>	Si consiglia l'uso di trappole gialle, collanti e attivate con trimedure, per individuare tempestivamente la presenza degli adulti. Alla prima cattura nelle trappole, si può intervenire applicando dei prodotti composti da sostanze attrattive e insetticidi (metodo "attract & kill").	Attract and kill con: Deltametrina <i>Spinosad</i> esca	
<b>Rodilegno giallo</b> <i>Zeuzera pyrina</i>	Utilizzo di trappole per le catture massali La migliore strategia di lotta prevede una periodica ispezione visiva delle piante per intercettare tempestivamente i fori di penetrazione nel tronco o nei rami più grossi. Le larve si possono uccidere raggiungendole entro le gallerie con un filo di ferro.		
<b>Tignola del melograno</b> <i>Virachola isocrates</i>		<i>Piretrine pure</i>	
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.		<i>Paecilomyces lilacinus</i>	

DISERBO CHIMICO: NON AMMESSO

## NOCCILOLO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b> <b>Mal dello stacco ed altre malattie del legno</b> <i>Cytospora corylicola</i>	<p><b>Interventi agronomici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostituire i vecchi impianti debilitati malattie del legno - preferire l'allevamento monocale - concimazioni ed irrigazioni equilibrate</li> <li>- idonea sistemazione del terreno</li> <li>- durante la potatura eliminare le parti infette</li> </ul> <p><b>Interventi chimici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di infezioni gravi intervenire a fine estate ed alla ripresa vegetativa - proteggere con mastici o paste cicatrizzanti i tagli o le ferite più ampie e profonde</li> </ul> <p>Interventi chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dalla fase di fioritura</li> </ul>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p> <p>Mastici addizionati con prodotti fungicidi autorizzati</p>	<p>(1) In 1 anno al massimo 4 kg di rame metallo per ettaro</p>
<b>Necrosi grigia</b> <i>Alternaria</i> spp <i>Colletotrichum</i> spp <i>Phomopsis</i> spp <i>Fusarium</i> spp	<p>Interventi chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dalla fase di fioritura</li> </ul>	<p>Boscalid + Pyraclostrobin (2)</p>	<p>(2) In un anno massimo 2 interventi</p>
<b>BATTERIOSI</b> <b>Necrosi batterica</b> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i>	<p><b>Interventi agronomici</b> - eliminare gli organi infetti con le operazioni di potatura - disinfettare gli attrezzi di potatura e di taglio</p> <p>- effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate</p> <p><b>Interventi chimici</b></p> <p>un trattamento alla caduta delle foglie e subito dopo la potatura e, se necessario, un altro alla ripresa vegetativa o in seguito a gelate tardive primaverili</p>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p>	<p>(1) In 1 anno al massimo 4 kg di rame metallo per ettaro</p>
<b>Cancro batterico Moria del nocciolo</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i> <i>Erwinia amylovora</i>	<p><b>Interventi agronomici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare gli organi infetti con le operazioni di potatura</li> <li>- disinfettare gli attrezzi di potatura e dei tagli con solfato di rame o con ipoclorito di sodio al 3%)</li> <li>- effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate</li> <li>- assicurare un buon drenaggio al terreno</li> </ul> <p><b>Interventi chimici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di attacco grave 2 trattamenti autunnali (uno all'inizio caduta foglie e l'altro a metà caduta foglie) e 1 o 2 trattamenti alla ripresa vegetativa</li> <li>- In caso di attacco lieve 1 trattamento alla caduta delle foglie e 1 trattamento alla ripresa vegetativa. Il trattamento va effettuato quando sopraggiungono fattori predisponenti l'infezione (es. gelate tardive primaverili)</li> </ul>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p> <p>Acibenzolar-S-metile (2)</p>	<p>(1) In 1 anno al massimo 4 kg di rame metallo per ettaro</p> <p>(2) Ammesso solo nei confronti di <i>P. syringae</i> pv <i>avellanae</i></p>

## NOCCILOLO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Eriofide delle gemme</b> <i>Phytocoptella avellanae</i>	<p><b>Interventi agronomici</b> - impiego di varietà con gemme robuste e serrate - scegliere cultivar meno suscettibili (es. Mortarella)</p> <p><b>Campionamento</b> alla ripresa vegetativa vanno esaminati 4 rami/pianta sul 10% delle piante presenti in un ettaro, conteggiando il numero di gemme infestate sul totale delle gemme presenti</p> <p><b>Soglia</b> 1.5-20% delle gemme infestate</p> <p><b>Interventi chimici</b> intervenire nel momento in cui si ha la migrazione dell'acaro dalle gemme infestate verso quelle sane, quando i nuovi germogli hanno 3-4 foglie completamente svolte. Questo accade generalmente, per le varietà precoci, a fine febbraio primi di marzo e per le altre cultivar tra aprile e giugno</p> <p>Valutare la presenza degli adulti adottando la tecnica dello scuotimento</p>	<i>Zolfo</i> <i>Olio minerale</i>	Si consiglia di non intervenire dopo la fase di gemma gonfia
<b>Balanino</b> <i>Curculio nucum</i>	<p><b>Soglia</b> 2 individui per pianta su 6 piante/ha scelte nei punti di maggiore rischio</p> <p><b>Interventi agronomici</b> evitare le consociazioni e la vicinanza di zone incolte</p> <p>Valutare la presenza degli adulti adottando la tecnica del "frappage" o scuotimento nel periodo maggio-luglio.</p> <p><b>Soglia</b> 2 individui per pianta</p>	<i>Beauveria bassiana</i> Deltametrina (1) Etofenprox (1) Clorantpriliprole (2)	<p>Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità</p> <p>(1) Con piretroidi max 3 interventi all'anno. Massimo 2 fra Etofenprox e Lambdacialotrina</p> <p>(2) Max 2 interventi anno</p> <p>(1) Con piretroidi max 3 interventi all'anno. Massimo 2 tra Etofenprox e Lambdacialotrina</p>
<b>Cimici</b> Pentatomidi Coreidi: <i>Gonocerus acutaequalatus</i> <i>Palomena prasina</i> <i>Halyomorpha halys</i>		Deltametrina (1) Etofenprox (1) Lambdacialotrina (1)	

## NOCCIOLO - DISERBO

INFESTANTI	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
<p>Graminacee e Dicotiledoni</p>	<p><b>Interventi agronomici</b> operare con gli inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno</p> <p><b>Interventi chimici</b> - nei periodi compresi tra 1 gennaio – 30 giugno e 16 settembre – 31 dicembre gli interventi chimici di diserbo vengono ammessi esclusivamente sulla fila per cui la superficie effettivamente trattata deve essere al massimo pari al 30% della superficie complessiva del nocciuolo</p> <p>- nel periodo 1 luglio – 15 settembre è ammesso 1 intervento di diserbo sull'intera superficie del nocciuolo</p> <p>Esclusivamente nei nocciuoli con pendenze pari o superiori al 15% è ammesso il diserbo chimico sull'intera superficie senza limitazioni temporali di alcun tipo.</p> <p>Gli interventi localizzati sulle file devono essere operati con microdosati su infestanti nei primi stadi di sviluppo</p> <p>Ripetere le applicazioni in base alle necessità</p> <p>L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a metri 3,5 – 4</li> <li>- vi siano impianti con impalcature basse e dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici</li> <li>- vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)</li> </ul>	<p>Glifosate</p> <p>Glifosate + 2,4 D (1)</p> <p>Pyraflufen ethyle</p> <p>Carfentrazone</p> <p>Fluazifop-p-butile</p> <p>Quizalofop-p-etil</p> <p>Diflufenican + Glifosate (1)</p> <p>Oxyfluorfen</p>	<p>Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi 9 litri per ettaro, all'anno, con formulati a 360 g/l (pari a 3.240 g/ettaro/anno di sostanza attiva)</p> <p>(1) Nel limite del quantitativo di Glifosate sostanza attiva ettaro/anno</p> <p>Diflufenican e Oxyfluorfen massimo 1 intervento, in alternativa tra loro, non oltre il 30% della superficie</p>

## NOCE DA FRUTTO – *Juglans regia*

AVVERSA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>Antracnosi</b> <i>Gnomonia leptostyla</i> <b>Necrosi Apicale Bruna</b> <i>Fusarium spp. Alternaria spp</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - fare attenzione alle varietà più sensibili. Ridurre le fonti di inoculo e favorire l'arieggiamento.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Mancozeb (2) Tebuconazolo (3) Boscalid + Pyraclostrobin (4) Captano (5)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 4 interventi all'anno. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 4 interventi anno
<b>Seccumi e cancri del legno</b> <i>Melanconium juglandis</i> <i>Fusarium spp</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1) Tebuconazolo (2)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Marciumi basali</b> <i>Phytophthora spp.</i> <i>Pythium spp.</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Cancro rameale</b> <i>Geosmithia morbida</i> (fungo) <i>Pityophthorus juglandis</i> (scolitide vettore della malattia)	Si tratta di una avversità segnalata nel 2013 in Veneto su noce nero. Può colpire anche il noce da frutto, per cui è opportuno verificare l'eventuale presenza di disseccamenti dei rami o branche. Inoltre è opportuno in monitoraggio dello scoltide <i>Pityophthorus juglandis</i> , vettore della malattia, con apposite trappole a feromoni		
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Macchie nere e cancri</b> <i>Xanthomonas arboricola pv. Juglandis</i>		<i>Prodotti rameici</i>	Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Cancro corticale superficiale</b> <i>Erwinia nigrifluens</i>		<i>Prodotti rameici</i>	Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Carpocapsa</b> <i>Cydia pomonella</i>	Installare almeno 2 trappole per azienda. <b>Soglia:</b> - trattare in relazione al volo e ai danni registrati nell'annata precedente; - con l'uso di larvicidi va considerata la somma termica, pari a 90 gradi giorno, dalla deposizione delle uova alle nascite larvali.	<i>Tecniche basate sull'uso di feromoni</i> <i>Virus della granulosa</i> (1) <i>Spinosad</i> (2) Clorantraniliprole (3) Emamectina (4) Deltametrina (5) Fosmet (6) <i>Nematodi entomopatogeni</i>	(1) Per problemi di incompatibilità, non utilizzare il virus in miscela con rameici (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 3 interventi anno con piretroidi (6) Max 2 interventi all'anno

## NOCE DA FRUTTO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Afidi</b> <i>Callaphis juglandis</i> <i>Cromaphis juglandicola</i>	Gli afidi sono controllati da ausiliari		Alcuni prodotti usati per carpocapsa sono efficaci anche su afidi
<b>Mosca delle noci</b> <i>Rhagoletis completa</i>	Al fine di verificare la presenza degli adulti, utilizzare trappole cromotropiche gialle, collocate verso la metà di giugno.	Esche proteiche Attract and Kill con Deltametrina Fosmet (1)	(1) Max 2 interventi all'anno. La mosca è limitata anche da alcuni insetticidi usati per carpocapsa
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>		Lambdacialotrina (1)	(1) Max 3 interventi anno con piretroidi; max 1 con Lambdacialotrina.
<b>Ragno rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>		<i>Olio minerale</i>	
<b>Rodilegno giallo</b> <i>Zeuzera pyrina</i>		<i>Catture massali con trappole a feromoni</i>	
<b>Rodilegno rosso</b> <i>COSSUS COSSUS</i>		<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Ricamatori</b> <i>Archips spp</i>			

## NOCE DA FRUTTO – DISERBO

CRITERI D'INTERVENTO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
<b>Interventi agronomici:</b> Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno  <b>Interventi chimici:</b> Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da ottimizzare l'efficacia e ridurre le dosi dei diserbanti fogliari.	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glifosate + 2,4 D	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi 3 litri per ettaro di noceto all'anno con formulati a 360 g/l (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva, usato da solo o in miscela)
	Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizafop	
	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin	Antigerminello, al massimo 1 intervento all'anno, nei primi 4 anni
	Dicotiledoni	(Diflufenican + Metribuzin) (Diflufenican + Glifosate)	Con queste miscele massimo 1 intervento anno, in alternativa tra loro. Il glifosate nel limite dei 1.080 grammi di sa ettaro anno.

**Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.** L'area trattata non deve quindi superare il 30% dell'intera superficie. La dose di Glifosate riportata in tabella è già calcolata in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di noceto.

## OLIVO – *Olea europaea*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b> <b>Occhio di pavone o Cicloconio</b> <i>Spilocaea oleaginea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare varietà poco suscettibili; - adottare sedi d'impianto non troppo fitti; - favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma; - effettuare concimazioni equilibrate. <b>Difesa chimica:</b> (nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni) - effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo; - effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare, circa a metà dello sviluppo vegetativo; - eseguire la "diagnosi precoce" in luglio e agosto per verificare la presenza di nuove infezioni non ancora evidenti. In caso di esito positivo attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre) ed effettuare un terzo trattamento.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Rame</i> (1) + <i>Zolfo</i> Dodina (2) Tebuconazolo (4) + Trifloxystrobin (3) Difenoconazolo (4) + Azoxystrobin (3) Fenbuconazolo (4) Difenoconazolo (4) Pyraclostrobin (3)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi anno con strobilurine: Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Pyraclostrobin -. (4) Max 3 interventi anno con Triazololi: Tebuconazolo max 1; Fenbuconazolo max 1; Difenoconazolo max. 2.
<b>Lebbra</b> <i>Colletotrichum</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma. <b>Difesa chimica:</b> intervenire in fase di invaiatura se le condizioni climatiche sono favorevoli	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Rameici</i> (1) + <i>Zolfo</i> Tebuconazolo + Trifloxystrobin (2) Pyraclostrobin (3) Mancozeb (4)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame (2) Max 1 intervento dalla ripresa vegetativa alla prefioritura (3) Max 2 interventi anno con strobilurine. Tempo di carenza 100 gg (4) Massimo 1 intervento. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gen. 2022.
<b>Carie o lupa</b> <i>Fomes</i> spp. <i>Stereum</i> spp. <i>Poliporus</i> spp., <i>Coriolius</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - asportare le parti infette e disinfettare con prodotti rameici o applicando mastici cicatrizzanti. Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.	Mastici cicatrizzanti <i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
<b>Oidio</b> <b>Rogna (Batteriosi)</b> <i>Pseudomonas savastanoi</i>	<b>Interventi agronomici</b> - eliminare e i rami colpiti; - eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli; - evitare la formazione di microferite durante la raccolta <b>Difesa chimica:</b> - intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante, soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta.	<i>Zolfo</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Rame</i> (1) + <i>Zolfo</i>	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo

N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a **tutti gli interventi effettuati** nell'anno, **indipendentemente dall'avversità.**

## OLIVO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Fumaggine</b>	<b>Interventi agronomici</b> E' necessario effettuare una buona aerazione della chioma <b>Interventi chimici</b> Di norma non sono necessari interventi chimici diretti contro tale avversità in quanto, essendo una conseguenza della melata emessa dalla <i>Saissetia oleae</i> , il controllo va indirizzato verso questo insetto	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Rame</i> (1) + <i>Zolfo</i>	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Mosca delle olive</b> <i>Bactrocera oleae</i>	<b>Difesa biologica:</b> <i>lanci di Opilus concolor</i> <b>Difesa chimica:</b> - trattare al superamento della soglia del 5 – 10% di drupe con punture fertili (uova o larve) su un campione di 100 drupe/ha prelevando 1-2 drupe per pianta.	<i>Beauveria bassiana</i> Dispositivi di attract and kill <i>Spinosad esche</i> (1) Esche proteiche con Deltametrina o Acetamiprid.. (3) Max 2 interventi all'anno per trattamenti a tutta chioma Acetamiprid (3) Fosmet (4)	(1) Max 8 applicazioni all'anno (2) Le esche attrattive possono essere attivate con formulati autorizzati a base di Deltametrina o di Acetamiprid.. (3) Max 2 interventi all'anno per trattamenti a tutta chioma (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Tignola dell'olivo</b> <i>Prays oleae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - trattare contro la seconda generazione (fase fenologica grano di pepe)	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Olio minerale</i> Fosmet (1) Acetamiprid (2) Spinetoram (3) Fosmet (1)	Max 1 trattamento all'anno contro la tignola con prodotti di sintesi. (1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento all'anno
<b>Sputacchina</b> <i>Philaenus spumarius</i>	In caso di forte presenza effettuare un trattamento contro gli adulti tra maggio e giugno nelle prime ore del mattino avendo cura di bagnare bene la parte più interna della vegetazione. E' opportuno miscelare all'insetticida un olio minerale estivo per migliorarne l'efficacia. Fare riferimento ai bollettini di difesa integrata.		(1) Max 2 interventi all'anno (verificare registrazione formulato)
<b>Cocciniglia mezzo grano di pepe</b> <i>Saissetia oleae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse; Limitare le concimazioni azotate; Favorire l'insolazione all'interno della chioma con la potatura. <b>Difesa chimica:</b> <u>soglia di intervento:</u> 5 - 10 neanidi vive per foglia (nel periodo estivo). I trattamenti vanno effettuati nel momento di massima fuoriuscita delle neanidi, orientativamente da luglio ad agosto, in presenza di neanidi di prima o seconda età.	<i>Olio minerale</i> Fosmet (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Cecidomia</b> <i>Dasineura oleae</i>	In caso di forti attacchi l'anno precedente è necessario campionare precocemente foglie e infiorescenze per verificare la presenza di larve. L'eventuale trattamento va eseguito verso fine aprile-inizio maggio in prossimità dell'inizio delle ovideposizioni	Acetamiprid (1)	(1) Max 2 interventi all'anno



## OLIVO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglia P. pollini</b> <b>Cocciniglie cotonose</b> <i>E. olivina</i> , <i>L. viburni</i> , <i>F. follicularis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - favorire un maggiore arieggiamento della chioma e una minore condizione di umidità		
<b>Oziotrinco</b> <i>Othiorrynchus</i> <i>cribricollis</i>	<b>Interventi agronomici</b> Su piante adulte lasciare alla base del tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti. Collocare intorno al tronco delle piante giovani delle fasce di resinato o maniccotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto (maggio - giugno e settembre - ottobre). Non sono ammessi interventi chimici		
<b>Fleotribo</b> <i>Phloeotribus</i> <i>scarabaeoides</i>	Interventi agronomici Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l'oliveto in buono stato vegetativo. Subito dopo la potatura lasciare nell'oliveto "rami esca"		
<b>Ilesino</b> <i>Hylesinus oleiperda</i>			

## OLIVO - DISERBO

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
Erbicida fogliare Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto all'anno con formulati a 360 g/L se si usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche residuali (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva).
Erbicidi fogliari e spollonanti Dicotiledoni	Carfentrazone Pyraflufen etil	Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro. Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del giorno)
Residuali Dicotiledoni	Tribenuron metile (1) Florasulam + Penoxulam (2)	(1) Massimo 1 intervento all'anno (2) Ammesso 1 trattamento/anno, tra ottobre e novembre
Residuale Graminacee e Dicotiledoni	Flazasulfuron	Impiegabile solo ad anni alterni, localizzato. Non ammesso su terreni sabbiosi. La dose per ettaro di oliveto non può superare i 20 grammi di sostanza attiva nell'anno di impiego (pari a 80 grammi di formulato al 25% per il diserbo localizzato di un ettaro di vigneto).
Residuale Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen	Oxifluorfen e Diflufenican massimo 1 intervento, in alternativa tra loro
Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican Diflufenican + Glifosate	Fase di allevamento, fino a 3 anni. Massimo 1 intervento con Diflufenican. Nel limite dei 1.080 grammi ettaro di Glifosate.

**Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.** L'area trattata con Glifosate, con Diflufenican e Oxifluorfen non deve superare il 30% dell'intera superficie. Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo maggiori vincoli di etichetta).

**PERO - *Pyrus communis***

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b> <b>Ticchiolatura</b> <i>Venturia pirina</i>	<b>Difesa chimica:</b> - prestare attenzione dalla ripresa vegetativa all'allegagione. Trattare in maniera preventiva, in funzione delle previsioni di pioggia, al fine di controllare le infezioni primarie. - interrompere i trattamenti anticicchiolatura, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto noce, se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolatura.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Polisolfuro di Calcio</i> <i>Laminarina</i> <i>Zolfo</i> Dodina (2) Ciprodinil (3) Pirimetanil (3) IBE (vedi nota in calce) Ziram, Mancozeb, Metiram (4) Trifloxystrobin (5) Pyraclostrobin (5) Ditianon (6) Captano (6) Fluazinam (7) Penthiopirad (8) Fluopyram (8) Fluxapyroxad (8) Fosfonato di K e Fosetil AI (9)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Con anilinoipirimidine max 6 interventi all'anno. (4) Ziram max 4 interventi anno. Tra Metiram e Mancozeb max 7 interventi anno. <b>Mancozeb revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (5) Con strobilurine max 4 trattamenti all'anno. (6) Tra Ditianon e Captano max 16 interventi all'anno su varietà sensibili a maculatura, 14 sulle precoci – fino a William. (7) Attenzione a possibile fitotossicità con impiego di oli minerali. (8) Con SDHI - Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram *, Fluxapyroxad, Isopyrazam * - max 4 interventi all'anno. * disponibili in miscela con altre sa. (9) Con prodotti contenenti Fosetil-AI o Fosfonati massimo 10 interventi all'anno
<b>Maculatura bruna</b> <i>Stemphylium</i> <i>vesicarium</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - per ridurre l'inoculo, distruggere il materiale, foglie e frutti, caduti a terra in autunno - evitare irrigazioni soprachoma - limitare la crescita delle infestanti, in particolare graminacee, - la lavorazione dell'intera superficie risulta la tecnica più efficace per ridurre l'inoculo Altri interventi utili per ridurre l'inoculo: - Impiego di <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> , sul cotico erboso a partire dalla fioritura - Pirodiserbo <b>Difesa chimica:</b> - solo su cultivar sensibili: Abate Fetel, Conference, Decana, Kaiser, Passa Crassana, General Leclerc, Pakam's, Cascade - si prevedono interventi cadenzati in relazione alla persistenza dei prodotti, del dilavamento, della presenza di danni l'anno precedente	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <b>Bicarbonato di potassio</b> <i>Prodotti rameici</i> (1) Ciprodinil (2) + Fludioxinil (7) Ditianon (5) + Pirimetanil (2) Trifloxystrobin (3) Pyraclostrobin (3) Ziram, Mancozeb, Metiram (4) Captano (5) Fluazinam (6) Fludioxinil (7) Penthiopirad (8) Fluxapyroxad (8) Boscalid (8) Fluopyram (8) Isopyrazam (8) <b>IBE (9)</b> Fosfonato di K e Fosetil AI (10) <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Con anilinoipirimidine max 6 trattamenti all'anno. (3) Con strobilurine max 4 trattamenti all'anno. (4) Ziram max 4 interventi, di cui max. 2 dopo la fioritura. Tra Metiram e Mancozeb max 7 interventi anno. <b>Mancozeb revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (5) Tra Captano e Ditianon max 16 interventi all'anno su varietà sensibili a maculatura, 14 sulle precoci – fino a William -. (6) Attenzione a possibile fitotossicità con impiego di oli minerali (7) Max 2 all'anno da solo, 3 complessivi (miscela con Cyprodinil) (8) Con SDHI - Boscalid, Penthiopirad, Fluopyram *, Fluxapyroxad, Isopyrazam * - max 4 interventi all'anno. * disponibili in miscela con altre sa. (9) Tebuconazolo e <b>Difenoconazolo</b> , max 3 interventi ciascuno, nel limite dei 5 IBE. (10) Con prodotti contenenti Fosetil-AI o Fosfonati massimo 10 interventi all'anno <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> : interventi al cotico erboso per ridurre la carica di inoculo

PERO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Marciumi</b> <i>Alternaria alternata</i> <i>Penicillium spp.</i> <i>Gleosporium album</i>		Captano (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Fludioxonil (3)	(1) Max 16 interventi all'anno tra Captano e Ditanon (2) Max 3 interventi all'anno, nel limite SDHI e strobilurine (3) Max 2 all'anno da solo, 3 complessivi (miscela con Cyprodinil)
<b>Cancri rameali</b> <i>Nectria galligena</i> ecc.		<i>Prodotti rameici</i> (1) <b>Captano+Fosfonato di K</b> (2)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) <b>Nel limite Captano e Fosfonati</b>
<b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora cactorum</i>		Fosetil Al (1)	(1) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 10 anno.
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Colpo di fuoco batterico</b> <i>Erwinia amylovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Eseguire periodici rilievi nei periodi a rischio. Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm. al di sotto del punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia. Provvedere alla disinfezione degli attrezzi utilizzati. Se necessario, asportare tempestivamente le fioriture secondarie. Comunicare al Servizio Fitosanitario competente l'eventuale presenza di sintomi sospetti.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Acibenzolar-S- metil (2) Fosetil Al (3)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Al massimo 6 interventi all'anno (3) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 10 anno.
<b>Necrosi batterica delle gemme e dei fiori</b> <i>Pseudomonas siringae</i>	Nei frutteti situati in zone ad elevata piovosità ed umidità si consiglia di trattare dopo la potatura e nella fase di ingrossamento gemme con prodotti rameici. Da inizio allegagione fino a metà giugno intervenire con Fosetil Al.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Fosetil-Al (2)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 10 anno.
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglia di S. José</b> <i>Comstockaspis perniciososa</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: trattare a fine inverno con presenza del parassita sui rami o sui frutti nell'anno precedente. Sono parzialmente efficaci gli interventi con esteri fosforici effettuati durante la stagione vegetativa, per il controllo di altre avversità.	<i>Olio minerale</i> Pyriproxyfen (1) Fosmet (2) Spirotetramat (3) Sulfoxaflor	(1) Max 1 intervento all'anno in pre fioritura (2) Max 2 interventi anno (3) Al massimo 1 intervento contro avversità. Non ammesso in prefioritura. Max 2 interventi all'anno
<b>Cecidomia dei frutti</b> <i>Contarinia pyrivora</i>	La lavorazione superficiale del sottofilo, nel periodo estivo, è utile nell'eliminare larve mature e le pupe.	Taufluvalinate (1)	(1) Con piretroidi max 3 interventi anno. Max 2 con Taufluvalinate

**PERO**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Tentredine</b> <i>Hoplocampa brevis</i>	<b>Soglia.</b> Intervenire se: - vi sono stati danni l'anno precedente, oppure - se vi sono state catture sulle trappole attrattive bianche (posizionate 2 - 3 settimane prima della fioritura), oppure - se a caduta petali si riscontra oltre il 5% di corimbi infestati	Acetamiprid	Contro questa avversità massimo un trattamento all'anno.
<b>Afide Grigio</b> <i>Dysaphis pyri</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: intervenire al superamento della soglia del 5% di piante colpite.	<i>Piretrine pure</i> Acetamiprid Flonicamid (1) Spirotetramat (2) Pirimicarb (3) Sulfoxaflor Flupyradifurone (4)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Al massimo 1 intervento contro questa avversità. Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento anno (4) Max 1 intervento ad anni alterni
<b>Pandemis e Archips</b> <i>Pandemis cerasana,</i> <i>Archips podanus</i>	Installare le trappole oppure fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali. I danni da ricamatori su pero sono molto rari. <b>Soglia per Pandemis e Archips:</b> contro la generazione svernante intervenire al superamento del 20 % dei mazzetti occupati da larve, oppure se vi sono stati danni l'anno precedente; contro le generazioni successive intervenire al superamento della soglia di 15 adulti di Pandemis catturati per trappola in due settimane o 30 adulti come somma delle due specie.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1) <i>Spinosad</i> (2) Spinetoram (2) Tebufenozide (3) Metossifenozide (3) Emanectina (4) Cloraniliprole (5)	(1) Max 4 interventi all'anno (2) Max 3 interventi all'anno con spinosine; max 1 Spinetoram (3) Triflumuron, Metossifenozide, Tebufenozide max. 3 interventi all'anno. Max 2 Triflumuron, max 2 Tebufenozide, max 1 Metossifenozide (4) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di etichetta) (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Psilla</b> <i>Cacopsylla pyri</i>	<b>Controllo biologico:</b> è fondamentale evitare l'impiego dei prodotti che possono ridurre le popolazioni di <i>Anthocoris</i> e <i>Orius</i> <b>Difesa chimica:</b> i prodotti specifici, Abamectina e Spirotetramat, vanno impiegati in condizioni favorevoli al loro assorbimento da parte della pianta.	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Olio essenz. arancio dolce</i> <i>Olio minerale</i> Abamectina (1) Spirotetramat (2) Spinetoram (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Al massimo 1 intervento contro questa avversità. Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento all'anno, nel limite di 3 spinosine
<b>Fillossera</b> <i>Aphanostigma pyri</i>	Interventi specifici su questo afide sono giustificati se ci sono stati danni nell'anno precedente (necrosi secca in corrispondenza della cavità calicina, causate dalla presenza di piccoli afidi)	Acetamiprid	

**PERO**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Carpocapsa</b> <i>Cydia pomonella</i>	<b>Difesa chimica:</b> - è fondamentale controllare bene la prima generazione - controllare il volo con le trappole, a partire dal 15 - 20 aprile; per la deposizione delle uova sono necessarie temperature crepuscolari superiori a 16 gradi per alcuni giorni; con l'uso di larvicidi va considerata la somma termica, pari a 90 gradi giorno, dalla deposizione delle uova alle nascite larvali. Risultano efficaci anche le reti antinsetto "AltCarpò", che chiudono il filare o un intero appezzamento.	<i>Tecniche basate sui feromoni</i> <i>Virus della granulosi</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Clorantraniliprole (2) Triflumuron (3) Tebufenozide (3) Metossifenozide (3) Fosmet (4) Emamectina (5) Etofenprox (6) Acetamiprid <i>Nematodi entomopatogeni</i>	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine. Max 1 con Spinetoram (2) Max 2 interventi all'anno (3) Triflumuron, Metossifenozide, Tebufenozide max. 3 interventi all'anno. Max 2 Triflumuron, max 2 Tebufenozide, max 1 Metossifenozide (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di etichetta) (6) Max 2 interventi all'anno, se necessario, in pre-raccolta. Poco selettivo su antocoride e fitoseidi
<b>Afide verde</b> <i>Aphis pomi</i>		<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> Flonicamid (1) Spirotetramat (2) Sulfoxaflor Flupyradifurone (3)	(1) Max 2 trattamenti all'anno (2) Al massimo 1 intervento contro questa avversità. Max 2 interventi all'anno complessivi. (3) Max 1 intervento, ad anni alterni
<b>Cidia del Pesco</b> <i>Cydia molesta</i> = <i>Grapholita molesta</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: intervenire nel periodo precedente la raccolta, con almeno 10 catture settimanali.	<i>Uso di feromoni</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Emamectina (2) Clorantraniliprole (3) Fosmet (4) Metossifenozide (5) Triflumuron (5) Acetamiprid	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine – max 3 Spinosad, max 1 Spinetoram (2) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di etichetta) (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi anno (5) Triflumuron, Metossifenozide, Tebufenozide max. 3 interventi all'anno. Max 2 Triflumuron, max 2 Tebufenozide, max 1 Metossifenozide
<b>Miridi</b> <b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Eseguire il <b>monitoraggio</b> con le apposite trappole, o visivo, oppure mediante posizionamento di un telo sotto la chioma e battitura dei rami, da fare con temperature basse, sotto i 15 - 20 gradi). <b>Interventi</b> , quando possibile, localizzati sui bordi. Consigliata l' <b>aggiunta di bagnanti/adesivanti</b> . Trattare con <b>temperature basse</b> , quando l'insetto è meno mobile. Molto utili le reti antigrandine, meglio se con chiusura antinsetto ai lati.	<i>Piretrine pure</i> Acetamiprid Taufluvinalate (1) Deltametrina (1) Lambda-cialotrina (1) Etofenprox (1) Triflumuron (2)	(1) Con piretroidi max 3 interventi anno. Max 2 con Taufluvinalate, 2 con Deltametrina, 1 con Lambda-cialotrina, 2 con Etofenprox. Poco selettivi sugli utili, antocoridi e fitoseidi; se possibile effettuare interventi mirati, su bordi e/o parti alte. (2) Max 2 interventi anno, nel limite dei 3 regolatori di crescita.

**PERO**

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Tingide</b> <i>Stephanitis pyri</i>	Intervenire sulle neanidi della prima generazione, orientativamente tra metà maggio e inizio giugno	Olii estivi	
<b>Piralide del mais</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - sfalci abbastanza frequenti a partire dalla metà di agosto <b>Difesa chimica:</b> - interventi a partire da metà - fine agosto, dove si sono riscontrati danni gli anni precedenti. <b>Interventi biotecnologici:</b> Si consiglia l'installazione delle trappole a feromoni per catture di massa, almeno 5-10 trappole/ha. Alcuni insetticidi usati per altre avversità controllano anche i rodilegno.	<i>Bacillus thuringiensis</i> (1) Indoxacarb (2)	(1) Verificare la registrazione dei formulati commerciali (2) Max 4 interventi all'anno
<b>Rodilegno rosso</b> <i>Cossus cossus</i>		<i>Catture massali</i> Triflumuron (B) (1)	(1) Ammesso su Zeuzera
<b>Rodilegno giallo</b> <i>Zeuzera pyrina</i>		<i>Bacillus thuringiensis</i> Triflumuron (B)	
<b>Orgia</b> <i>Orgyia antiqua</i>		<i>Sali potassici acidi grassi</i> Clofentezine Etoazole Exitiadox Pyridaben Acequinocil Bifenazate Fenpiroximate Cyflumetofen <b>Tebufenpirad</b>	Contro questa avversità max. 1 trattamento all'anno. Si precisa che la miscela adulcificata + ovidica va considerata un intervento
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>	<b>Soglia:</b> - intervenire al superamento del 60% di foglie occupate - valutare la presenza e la possibilità di controllo da parte di fitoseidi e del coccinellide <i>Stethorus</i>	<i>Olio essenz. arancio dolce</i> <i>Olio minerale</i> <i>Olio minerale</i> Abamectina (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Metcalfa</b>			
<b>Eriofide rugginoso</b> <i>Epirimerus pyri</i>		Oli minerali <i>Zolfo</i> Fenpiroximate (1)	(1) Massimo 1 trattamento all'anno
<b>Eriofide vescicoso</b> <i>Eryophies pyri</i>			

(A) Con IBE (Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Penconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo) massimo 5 interventi anno. Difenoconazolo massimo 3; Tebuconazolo massimo 3.

N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a **tutti gli interventi effettuati** nell'anno, **indipendentemente dall'avversità.**

## POMACEE (Melo e Pero) - DISERBO

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
Erbicidi fogliari Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glifosate + 2,4 D	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto all'anno con formulati a 360 g/L (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva) se si usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche residuali (Pendimetalin, Isoxaben, Diflufenican, Oxifluorfen)
Erbicidi fogliari Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Propaquizafop Fluazifop-p-butile	
Erbicida fogliare (ormonici) Dicotiledoni	Fluroxypir  MCPA	Impiegabile solo su melo. Massimo 1 intervento all'anno
Erbicidi fogliari e spollonanti Dicotiledoni	Carfentrazone Pyraflufen-ethyl	Impiegabile in alternativa al 2,4 D.  Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del giorno).
Residuale: Dicotiledoni	Isoxaben	Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie
Residuali Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Oxifluorfen (1) Propizamide (1)	(1) Sostanze attive candidate alla sostituzione. Utilizzabili sul 30% della superficie, 1 solo intervento all'anno, in alternativa tra loro (compresa la miscela Diflufenican + Glifosate)
Residuali - Dicotiledoni	Diflufenican (1)	
Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican (1) + Glifosate	

**Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.** L'area trattata con Glifosate non deve superare il 30% dell'intera superficie. La dose riportata in tabella per il Glifosate è già calcolata in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.

Per i prodotti contenenti Isoxaben l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie (da etichetta).

Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile non deve superare il 50% (salvo indicazioni più restrittive di etichetta).

E' opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da limitare le dosi.

E' giustificata la rottura del cotico erbooso solo su varietà di pero sensibili alla maculatura, in situazioni dove è necessario per ridurre l'inoculo del fungo.

## PESCO – *Prunus persica*

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Bolla del pesco</b> <i>Taphrina deformans</i>	<b>Difesa chimica:</b> Si consiglia di eseguire un primo intervento alla caduta delle foglie. Successivamente intervenire in inverno, ai primi innalzamenti di temperatura e successivamente in relazione alle piogge che si verificano dopo la rottura delle gemme a legno. La malattia è favorita da periodi freddi e piovosi. Dopo la scamicatura le condizioni climatiche sono difficilmente favorevoli per attacchi di rilievo.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Polisolfuro di calcio</i> Dodina (2) Difenonazolo (A) Tebuconazolo (A) + <i>Zolfo</i> Ziram (3) Captano (3) Mancozeb (3)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 interventi all'anno (A) Vedi nota in calce (3) Con Ziram, Captano e Mancozeb max 4 interventi all'anno, in alternativa tra loro. Mancozeb max 2, Ziram max 2. <b>Mancozeb revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022.
<b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i>	<b>Difesa chimica:</b> - gli interventi eseguiti per la bolla sono in genere sufficienti per controllare anche il corineo.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Rame (1) + Fosetil-al Dodina (2) Captano (3) <i>Zolfo</i>	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 4 interventi complessivi con Ziram e Mancozeb.
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca pannosa</i>	<b>Difesa chimica:</b> Gli interventi di norma iniziano dalla scamicatura. Nelle zone collinari e su varietà particolarmente sensibili è consigliabile anticipare gli interventi alla fase di caduta petali. Sulle varietà e nelle condizioni meno favorevoli alla malattia si può intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Olio essenziale di arancio</i> Bupirimate (1) <i>Polisolfuro di calcio</i> IBE in nota (A) Boscalid (3) + Pyraclostrobin (2) Trifloxistr. (2) + Tebuconazolo Tebuconazolo + Fluopyram (3) Penthiopirad (3) Fluxapyroxad (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Con strobilurine - Pyraclostrobin e Trifloxystrobin - max 3 interventi all'anno. (3) Con SDHI - Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad, Fluxapyroxad - max 3 interventi all'anno
<b>Cancri rameali</b> <i>Fusicoccum amygdali</i> <i>Cytospora spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - tagliare ed eliminare le parti colpite, curare il drenaggio, ricorrere a varietà poco suscettibili e limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.	<i>Prodotti rameici</i> (1) Tiofanate metil (2) Captano (3)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 2 all'anno, in autunno, solo percoche e varietà sensibili. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 19/10/2021 (3) Vedi nota sopra
<b>Cancro batterico</b> <i>Xanthomonas arboricola pv. Pruni</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale vivaistico certificato - asportare e distruggere i rami colpiti	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (1) Acibenzolar-S-methyl (2)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 5 interventi all'anno

(A) Con IBE (**Difenonazolo**, Fenbuconazolo, Flutriafol, **Miclobutanil**, Penconazolo, **Tebuconazolo**, Tetraconazolo) massimo 4 interventi all'anno.  
I prodotti in grassetto vanno limitati ad un massimo di 2 all'anno, in alternativa tra loro.



PESCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<p><b>Monilia</b> <i>Monilinia laxa</i>, <i>Monilinia fructigena</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - apporti equilibrati di azoto e corretta gestione irrigua, in modo da evitare eccessiva vigoria e umidità. Curare il drenaggio. Asportare ed eliminare i frutti mummificati. Potatura verde. <b>Difesa chimica:</b> - periodo florale: intervenire preventivamente solo su cultivar molto suscettibili, in aree soggette e se si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia. - pre-raccolta: interventi in funzione della suscettibilità varietale, andamento climatico, epoca di raccolta.</p>	<p><i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Polisolfuro di calcio</i> Cyprodinil (1) Fludioxonil + Cyprodinil (1) IBE in nota (A) Fenexamide (2) Fenpirazamina (2) Boscalid (3) + Pyraclostrobin (4) Boscalid (3) Trifloxystrobrin (4) + Tebuconazolo Tebuconazolo +Fluopyram (3) Penthiopirad (3)</p>	<p>Contro questa avversità non più di 4 trattamenti all'anno (esclusi i prodotti biologici) (1) Con prodotti contenenti cyprodinil max 1 trattamento all'anno (2) Max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro (3) Con SDHI - Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad, Fluxapyroxad - max 3 interventi all'anno (4) Con strobilurine - Pyraclostrobin e Trifloxystrobin - max 3 interventi all'anno.</p>
<p><b>Nerume delle drupacee</b> <i>Cladosporium carpophilum</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b> Asportare durante la potatura i rametti infetti <b>Difesa chimica:</b> Condizioni di bagnatura persistente favoriscono l'infezione. La fase di maggior rischio parte da inizio scamicatura e si protrae per circa 30 giorni</p>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1) Pyraclostrobin (2)</p>	<p>(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Max 3 interventi all'anno con strobilurine - Pyraclostrobin, Trifloxystrobin.</p>
<p><b>Sharka</b> <i>(Plum pox virus)</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale vivaistico certificato; effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi in aree considerate esenti dalla malattia, avvisare il Servizio Fitosanitario Regionale</p>		
<p><b>FITOFAGI</b> <b>Cocciniglia di S. José</b> <i>Comstockaspis perniciososa</i> <b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Pseudococcus comstoki</i></p>	<p><b>Difesa chimica:</b> Soglia: presenza sui rami e sui frutti osservati nell'annata precedente. - si interviene sulle forme svernanti e, in caso di forti infestazioni, a completamento della difesa, sulle neanidi di prima generazione, in primavera, controllando l'inizio delle nascite</p>	<p>Oli minerali Pyriproxyfen (1) Spirotetramat (2) Fosmet (3) Sulfoxaflor</p>	<p>(1) Max 1 trattamento all'anno (2) Max 2 trattamenti all'anno (3) Max 2 interventi all'anno</p>
<p><b>Tripidi</b> <i>Taeniothrips meridionalis</i>, <i>Thrips major</i>, <i>Frankliniella</i></p>	<p><b>Difesa chimica</b> Soglia: - presenza o danni di tripidi nell'anno precedente Gli interventi contro il tripide possono rendersi necessari su nettarine nel periodo pre o postfiorente solo nelle zone collinari e pedecollinari</p>	<p><i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Taufluvalinate (2) Acrinatrina (2) Abamectina + Acrinatrina (2)</p>	<p>Contro questa avversità max 2 trattamenti all'anno. (1) Max 3 interventi all'anno con spinosine. Max 1 intervento all'anno con Spinetoram (2) Con piretroidi max 4 interventi all'anno; max 2 con Taufluvalinate; max 1 con Acrinatrina</p>

## PESCO

FITOFAGI			
<b>Afide verde</b> <i>Myzus persicae</i> <b>Afide sigarato</b> <i>Myzus varians</i> <b>Afide bruno</b> <i>Brachycaudus schwarzii</i>	<b>Difesa chimica:</b> Soglia nella fase di bottoni rosa: presenza di fondatrici	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Piretrine pure</i> Taufuvalinate (1) Acetamiprid Flonicamid (2) Spirotetramat (3) Pirimicarb (4) Sulfoxaflor	(1) Max. 2 interventi all'anno. (2) Max 2 trattamenti all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max. 1 intervento all'anno
<b>Afide farinoso</b> <i>Hyalopterus amygdali</i>	<b>Difesa chimica:</b> - dove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle piante colpite	<i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Acetamiprid Flonicamid (1) Spirotetramat (2) Pirimicarb (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 trattamenti all'anno (3) Max 1 intervento all'anno
<b>Cidia</b> <i>Cydia molesta</i> (sin. <i>Grapholita molesta</i> )	Dove le caratteristiche del frutteto lo consentono, i metodi della confusione e del disorientamento risultano molto efficaci <b>Difesa chimica:</b> Posizionare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali. Sulla prima generazione il trattamento va effettuato con larvicidi alla comparsa dei primi sintomi di attacco sui germogli. Sulle generazioni successive la soglia è pari a 10 catture per trappola a settimana	<i>Uso di feromoni</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Metossifenozide (1) Triflumuron (2) Acetamiprid <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Etofenprox (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6) Indoxacarb (7) Fosmet (8)	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno con spinosine; max 1 con Spinetoram (4) Max 2 trattamenti all'anno (5) Max 2 trattamenti all'anno (6) Max 2 trattamenti all'anno (7) Max 3 trattamenti all'anno (8) Max 2 interventi all'anno

PESCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Anarsia</b> <i>Anarsia lineatella</i>	<b>Difesa chimica:</b> E' importante effettuare un rilievo specifico nel periodo della fioritura per verificare la presenza delle larve al fine di programmare una corretta strategia di difesa. L' intervento sulle larve svernanti può essere risolutivo.  Per interventi successivi posizionare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali.  Soglia: 7 catture per trappola a settimana; 10 catture per trappola in due settimane.	<i>Uso di feromoni</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Metossifenozide (1) Triflumuron (2) Acetamiprid <i>Spinosad</i> (3) Spinetoram (3) Etofenprox (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6) Indoxacarb (7) Fosmet (8)  Acetamiprid	(1) Max 1 intervento all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno con spinosine, max 1 con Spinetoram (4) Max 2 trattamenti all'anno (5) Max 2 trattamenti all'anno (6) Max 2 trattamenti all'anno (7) Max 3 trattamenti all'anno (8) Max 2 interventi all'anno
<b>Litocollete</b> <i>Phyllonorycter spp.</i>			
<b>Miridi</b>	I Miridi possono arrecare danni consistenti in particolari situazioni caratterizzate dalla errata gestione dell' inerbimento o alla vicinanza a colture erbacee, fossi e cappezzagne inerbite.	Etofenprox (1) Acetamiprid Deltametrina (2)	(1) Max 2 interventi all'anno, nel limite dei 4 piretroidi (2) Max 3 interventi all'anno, nel limite dei 4 piretroidi
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halymorphha halys</i>	Eseguire il <b>monitoraggio</b> con le apposite trappole, o visivo, oppure mediante posizionamento di un telo sotto la chioma e battitura dei rami, da fare con temperature basse, sotto i 15 – 20 gradi. Si possono avere anche danni precoci, dopo la fioritura. In generale il rischio aumenta sulle varietà tardive. <b>Interventi</b> , quando possibile, localizzati sui bordi. Consigliata <b>l'aggiunta di bagnanti/adesivanti</b> . Trattare con <b>temperature basse</b> , quando l'insetto è meno mobile. Molto utili le reti anti-grandine, meglio se con chiusura anti-insetto ai lati.	Acetamiprid Deltametrina (1) Etofenprox (1) Lambdacialotrina (1) Taufluvalinate (1) Triflumuron (2)	(1) Con piretroidi massimo 4 interventi all'anno. Deltametrina max 3, Etofenprox max 2, Lambdacialotrina max 1, Taufluvalinate 2.  (2) Max 2 interventi anno
<b>Forficule</b>	<b>Interventi:</b> si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile, prima della risalita degli insetti sulla chioma, nelle aziende colpite negli anni precedenti. Utile anche il posizionamento di piccoli contenitori, es. pezzi di canna di bambù chiusi da un lato, nella parte bassa delle piante, dove di giorno le forficule si rifugiano. Vanno poi raccolti e allontanati.		

## PESCO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Notte</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>M. oleracea</i> , <i>Peridroma saucia</i>	<b>Interventi agronomici</b> Limitare gli attacchi con l'eliminazione delle infestanti lungo la fascia di terreno sottostante i peschi	<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>	Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli antagonisti naturali. <b>Soglia:</b> intervenire chimicamente al superamento della soglia del 60% di foglie occupate.	Etoxazole Abamectina Acequinocil Fenproxiimate Tebufenpirad	Contro questa avversità max 1 trattamento all'anno. Si precisa che la miscela adalticida + ovicida va considerata un intervento
<b>Cicalina</b> <i>Empoasca decedens</i>		<i>Azadiractina</i> Acetamiprid Etofenprox (1)	(1) Max 2 interventi all'anno, nel limite dei 4 piretroidi
<b>Eulia</b> <i>Argyrotaenia pulchellana</i> ( <i>sin. A. ljugiana</i> )		<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Mosca mediterranea della frutta</b> <i>Ceratitis capitata</i>	<b>Soglia:</b> prime punture La presenza è molto rara nei nostri ambienti e difficilmente vengono segnalati danni. Utili esche a base di proteine idrolizzate o melassa	<i>Beauveria bassiana</i> Etofenprox (1) Fosmet (2) Tauflualinate (3)	(1) Max 2 interventi, max 4 con piretroidi (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi, max 4 con piretroidi
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> - utilizzare piante certificate, - evitare il ristoppio- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti	Nessun intervento	

N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a **tutti gli interventi effettuati** nell'anno, **indipendentemente dall'avversità.**

## SUSINO – Prunus domestica

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Monilia</b> <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i>	<b>Difesa chimica</b> Periodo florale: - su varietà ad alta recettività è opportuno intervenire in pre-fioritura. - qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche favorevoli alla malattia (alta umidità o piovosità) si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura Preraccolta - In condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad elevata suscettibilità si possono eseguire uno o due interventi, ponendo particolare attenzione ai tempi di carenza	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <b>Bicarbonato di potassio</b> Polisolfuro di calcio IBE in nota (A) Cyprodinil (1) Fludioxonil + Cyprodinil (1) Fenexamide (2) Fenpirazamina (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Boscalid (4) Trifloxystrobin + Tebuconaz. (5) Fluopyram + Tebuconazolo (6)	Contro questa avversità max 4 interventi all'anno con mezzi chimici (1) Con prodotti contenenti Cyprodinil max 2 interventi all'anno. (2) Max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro (3) Max 2 trattamenti all'anno. Con strobilurine max 3 interventi anno. (4) Con prodotti contenenti SDHI - Boscalid, Fluopyram - massimo 3 interventi all'anno (5) Nel limite IBE e strobilurine (6) Con la miscela max 1 intervento all'anno
<b>Ruggine</b> <i>Tranzschelia pruni</i> – <i>spinosae</i>	<b>Difesa chimica</b> Su varietà recettive intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte a distanza di 8 - 12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengano la vegetazione bagnata.	<i>Zolfo</i> Tebuconazolo (1)	(1) Con IBE al massimo 3 interventi all'anno. Con Tebuconazolo max 2 interventi. Vedi anche nota in calce
<b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i>	<b>Difesa chimica</b> Intervenire a caduta foglie	<i>Prodotti rameici</i> (1) Ziram (2) Captano (2)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Con i ditiocarbammati e Captano max 2 trattamenti all'anno, di cui max 1 con Ziram.
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Cancro batterico delle drupacee</b> <i>Xanthomonas arboricola</i> <i>pv. pruni</i>	<b>Interventi agronomici:</b> scegliere materiale di propagazione controllato e cv poco suscettibili; eliminare durante la potatura le parti infette <b>Difesa chimica</b> Negli impianti colpiti si consiglia di eseguire 2 - 4 trattamenti ad intervalli di 7 - 10 giorni durante la caduta delle foglie. Un ulteriore trattamento può essere effettuato nella fase di ingrossamento gemme.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
<b>VIROSI</b>			
<b>Sharka</b> <i>Plum pox virus</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare materiale vivaistico sano, accompagnato dal "passaporto delle piante"; - effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi in aree considerate esenti dalla malattia, avvisare il Servizio Fitosanitario Regionale		

(A) Con IBE (Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Tebuconazolo) massimo 3 interventi all'anno. I prodotti contrassegnati n grassetto vanno limitati ad un massimo di due trattamenti all'anno, in alternativa tra loro.

## SUSINO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglia di S. José</b> <i>Comstockaspis perniciososa</i>	<b>Difesa chimica</b> Presenza sui rami e sui frutti nell'annata precedente.	<i>Olio minerale</i> Fosmet (1) Spirotetramat (2) Pyriproxyfen (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento all'anno, in prefioritura
<b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Pseudococcus comstoki</i>			
<b>Afidi verdi</b> <i>Brachycaudus helychrisi</i> , <i>Phorodon humuli</i> <i>Myzus persicae</i>	<b>Difesa chimica</b> Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui frutticini.	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> Acetamiprid (1) Flonicamid (2) Spirotetramat (3) Pirimicarb (4)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 1 intervento all'anno
<b>Afide farinoso</b> <i>Hyalopterus pruni</i>	<b>Difesa chimica</b> Localizzare l'intervento nelle sole aree infestate. Massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità.	Acetamiprid (1) Flonicamid (2) Pirimicarb (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 1 intervento all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>	Eeguire il monitoraggio mediante frappe, con le apposite trappole, o visivo. Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi. Su susino i danni sono limitati, in genere su varietà tardive e in preraccolta.	Acetamiprid (1) Deltametrina (2) Triflumuron (3)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi, nel limite dei 3 piretroidi (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Cidia</b> <i>Cydia funebrana</i>	Posizionare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali. <b>Difesa chimica</b> Soglia: in prima generazione gli interventi sono consigliati solo in caso di scarsa allegazione. Nella seconda e terza generazione, in condizioni di normale allegazione, trattare al superamento della soglia di 10 catture per trappola per settimana.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spinosad</i> (1) Spinetoram (1) Fosmet (2) Acetamiprid (3) Clorantniliprole (4) Emamectina (5) Triflumuron (6) Deltametrina (7) Betaciflutrin (7, 8)	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine. Max 1 intervento all'anno con Spinetoram (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Con piretroidi max 3 interventi all'anno. Max 2 Deltametrina; max 2 Betaciflutrin (8) Revocato. Impiegabile fino al 20/07/2020
<b>Cidia</b> <i>Cydia molesta</i> (sin. <i>Grapholita molesta</i> )	<b>Soglia:</b> presenza	<i>Spinosad</i> (1) Clorantniliprole (2) Triflumuron (3)	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno

N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati nell'anno, indipendentemente dall'avversità.

SUSINO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI OCCASIONALI</b>			
<b>Eulia</b> <i>Argyrotaenia pulchellana</i> ( <i>sin. A. Ijungiana</i> )	<b>Difesa chimica</b> I generazione: non sono ammessi interventi; II generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Clorantraniliprole (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Tentredini</b> <i>Hoplocampa flava</i> , <i>Hoplocampa minuta</i> , <i>Hoplocampa rutilicornis</i>	Per verificare la presenza degli adulti, è opportuno installare trappole cromotropiche bianche prima della fioritura. <b>Difesa chimica</b> Soglia indicativa 50 catture per trappola durante il periodo della fioritura, possono giustificare un intervento a caduta petali.	Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 2)	Massimo 1 intervento contro questa avversità. (1) Piretroidi max 3 interventi complessivi. Deltametrina max 2, Beta-ciflutrin max 2, Lambda-cialotrina max 1, Acrinatrina max 1. (2) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Orgia</b> <i>Orgyia antiqua</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: presenza di larve giovani	<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Tripidi</b> <i>Taeniothrips meridionalis</i> , ecc.	<b>Difesa chimica</b> Soglia indicativa: presenza su cv suscettibili (es. Angeleno).	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici acidi grassi</i> Lambdacialotrina (1) Acrinatrina (2)	(1) Max 1 trattamento all'anno, nel limite dei 3 piretroidi (2) Max 1 trattamento all'anno, nel limite dei 3 piretroidi
<b>Pandemis e Archips</b> <i>Pandemis cerasana</i> , <i>Archips podanus</i>	<b>Difesa chimica</b> Soglia: 5% dei germogli infestati	<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Metcalfa</b> <i>Metcalfa pruinososa</i>	Difesa da realizzare in modo complementare alle altre avversità	Acetamiprid (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>	Rispettare gli antagonisti naturali <b>Difesa chimica</b> Soglia: trattare al superamento della soglia del 60% di foglie occupate.	Etoxazole Abamectina (1) Tebufenpirad Fenpiroximate	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno. La miscela adulticida + ovicida vale 1 intervento. (1) Verificare la registrazione dei formulati
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>		Nessun intervento	

## DISERBO DRUPACEE ( Albicocco – Ciliegio – Pesco – Susino)

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
Erbicida fogliare Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto all'anno con formulati a 360 g/L (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva) se si usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche residui (Pendimetalin, Isoxaben, Diflufenican).
Erbicidi fogliari e spollonanti Dicotiledoni	Carfentrazone (1, 2) Pyraflufen-ethyl (2)	(1) Autorizzato su pesco e susino (2) Utilizzabili per diserbo e/o spollonatura. Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro
Erbicidi fogliari Graminacee	Fluazifop-p-butile (1) Quizalofop-p-etile Propaquizafop	(1) Autorizzato su pesco, susino e ciliegio
Residuale Dicotiledoni	Isoxaben	Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie
Residuale Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Oxifluorfen	(1) Autorizzato su albicocco e pesco. Non impiegare su terreni sabbiosi
Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican + Glifosate	Massimo 1 applicazione all'anno; nel limite dei 1.080 grammi ettaro di Glifosate.
Residuale Dicotiledoni	Diflufenican	Impiegabile in alternativa alla miscela pronta Diflufenican + Glifosate

**Il diserbo deve essere localizzato sulla fila.** L'area trattata con Glifosate non deve superare il 30% dell'intera superficie.

La dose riportata in tabella per il Glifosate è già calcolata in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.

Con i residui Pendimetalin, Oxifluorfen e Diflufenican può essere effettuato 1 solo intervento all'anno, in alternativa tra loro. L'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.

Per i prodotti contenenti Isoxaben l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie (da etichetta).

Con gli altri prodotti non superare il 50% dell'intera superficie (salvo maggiori vincoli di etichetta).

Con prodotti fogliari, è opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da migliorare l'efficacia e limitare le dosi.



**VITE – Vitis vinifera**

AVVERSAITA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<p><b>Peronospora</b> <i>Plasmopara viticola</i></p>	<p><b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti iniziano al verificarsi delle condizioni per l'infezione primaria; - è opportuno intervenire prima dell'inizio della prevista pioggia infettante; - i trattamenti sono più efficaci se posizionati in prossimità (prima del verificarsi) della pioggia infettante. Il trattamento effettuato due o tre giorni prima della pioggia, in particolare con i prodotti di copertura, risulta meno efficace, in quanto la crescita della vegetazione riduce la quantità di prodotto presente sulla vegetazione e inoltre ci possono essere parti nuove non coperte, in particolare nelle fasi di rapido accrescimento; - i trattamenti preventivi con prodotti di copertura, effettuati come sopra indicato, danno maggiori garanzie anche per quanto riguarda la protezione dei grappolini.</p>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1) Metiram (2) Mancozeb (2, 3) Folpet (3) Ditianon (3) Fluazinam (3) Dimetomorph (4) Iprovalicarb (4) Mandipropamide (4) Bentiavalicarb (4) Valifenalate (4) Cimoxanil (5) Famoxadone (6) Pyraclostrobin (6) + Metiram (2) Azoxyastrobin (6) Zoxamide (7) Fluopicolide (8) Metalaxil-M (9) Benalaxil-M (9) Benalaxil (9) Cyazofamid (10) Amisulbrom (10) Ametoctradina (11) Fosfonato di potassio (13) Fosfonato di sodio (12, 13) Fosetil Al (13) Oxathiapiprolin (14) <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>Cerevisiane</i> (15)</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Ditiocarbammati impiegabili fino all'allegagione. Metiram massimo 3 se impiegato da solo. Mancozeb <b>revocato</b>: impiego ammesso fino al 4 gen. 2022. (3) Tra Mancozeb, Ditianon, Folpet e Fluazinam al massimo 5 interventi all'anno. Ditianon può essere fitotossico se applicato su varietà sensibili dopo la fioritura. (4) Con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide, Bentiavalicarb, Valifenalate) max 4 interventi all'anno. Dimetomorf max 3; Bentiavalicarb max. 2. (5) Max 3 interventi all'anno (6) Con QoI (Famoxadone, Pyraclostrobin, Azoxyastrobin, Trifloxystrobin) complessivamente massimo 3 interventi all'anno; con Famoxadone massimo 1 intervento. (7) Max 4 interventi all'anno (8) Max 2 interventi all'anno (9) Con fenilammidi max 3 interventi all'anno. Benalaxil <b>revocato</b>. Impiego ammesso fino al 5/10/2021 (10) Con Cyazofamid e Amisulbrom massimo 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro (11) Max 3 interventi all'anno (12) Disponibile in miscele pronte (13) Con prodotti contenenti Foseetil Al o Fosfonati massimo 8 interventi anno; per limitare i residui si consiglia di sospendere gli interventi, entro fine giugno (escluso viti in allevamento) (14) Massimo 2 interventi all'anno, in miscela con s.a. a diverso meccanismo d'azione. (15) Induttore di resistenza</p>
<p><b>Escoriosi</b> <i>Phomopsis viticola</i></p>	<p>Interventi specifici da inizio germogliamento sulle varietà suscettibili. Contro questa avversità massimo 2 interventi all'anno.</p>	<p>Metiram (1) Mancozeb (2, 3) Folpet (2) Pyraclostrobin (4) + Metiram (1) Azoxyastrobin (4)</p>	<p>(1) Max 3 interventi se usato da solo. (2) Tra Mancozeb, Ditianon, Folpet e Fluazinam al massimo 5 interventi all'anno. (3) <b>Revocato</b>: impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (4) Vedi nota sopra relativa ai QoI</p>

N.B. 1 - **Le limitazioni al numero di interventi** con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a **tutti gli interventi effettuati su vite nell'anno, indipendentemente dall'avversità.**

VITE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<p><b>CRITTOGAME</b></p> <p><b>Mal dell'esca e altre malattie fungine del legno</b>  <i>Phaeomoniella chlamydospora</i>  <i>Fomitiponia mediterranea</i>  <i>Phaeoacremonium aleophilum</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b>            Segnare le piante infette in estate- autunno.            In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciatura delle stesse.            In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro eliminazione e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di taglio.            Le piante infette vanno potate separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia per mezzo di attrezzi di taglio che vanno disinfettati (con Sali quaternari di ammonio o Ipoclorito di sodio).</p> <p><b>Difesa chimica:</b></p> <p>Intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura in funzione della pressione della malattia e tenuto conto delle fasi più critiche.</p>	<p><i>[Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii]</i>  <i>Trichoderma atroviride</i> Ceppo SC 1  <i>Trichoderma atroviride</i> Ceppo I-1237            Boscalid + Pyraclostrobin (1)</p>	<p>E' opportuno eseguire i trattamenti con <i>Trichoderma</i> con temperature medie giornaliere superiori a 10 gradi, con buona umidità relativa, possibilmente entro alcuni giorni dalla potatura.            (1) Formulato per applicazione diretta sui tagli di potatura: massimo 10 litri di formulato commerciale ettaro. Non entra nel limite degli SDHI e strobilurine</p>
<p><b>Oidio</b>  <i>Uncinula necator</i>,  <i>Oidium tuckeri</i></p>		<p><i>Zolfo</i>  <i>Ampelomyces quisqualis</i>  <i>Bicarbonato di potassio</i>  <i>Laminarina</i>  <i>Olio essenziale di arancio dolce</i>  <i>Cerevisane</i>  <b>COS-OGA (1)</b>  <i>Bacillus pumilus</i>  <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>            Azoxystrobin (2)            Trifloxystrobin (2)            Pyraclostrobin (2)            Boscalid (3)            Fluxapyroxad (3)            Spiroxamina (4)            Meptyl Dinocap (5)            Metrafenone (6)            Ciflufenamide (7)            I.B.E. in nota (8)            Bupirimate (9)            Proquinazid (9)            Pyriofenone (6, 9)</p>	<p>(1) COS-OGA = Chitooligosaccaridi e Oligogalaturonidi            (2) Con Qol max 3 trattamenti all'anno (vedi nota sopra)            (3) Max 2 interventi all'anno con SDHI (Boscalid e Fluxapyroxad), Max 1 con Boscalid, max 2 con Fluxapyroxad.            (4) Max 3 interventi all'anno            (5) Max 2 interventi all'anno.            (6) Max 3 interventi all'anno, compreso impiego di Pyriofenone.            (7) Max 2 interventi all'anno.            (8) Max 3 interventi complessivi all'anno, con IBE riportati in nota. Con prodotti a base di Difenoconazolo, Miclobutanil, Tebuconazolo, può essere effettuato un solo intervento, in alternativa tra loro.            (9) Massimo 2 interventi all'anno complessivi tra Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone</p>

IBE (Inibitori Biosintesi Ergosterolo): **Difenoconazolo**, Fenbuconazolo, Flutriafol, **Tebuconazolo**, Penconazolo, **Miclobutanil**, Tetraconazolo. In grassetto i prodotti "candidati alla sostituzione" che vanno limitati ad un solo trattamento all'anno, in alternativa tra loro.

VITE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<p><b>Interventi agronomici</b> - scelta di idonee forme di allevamento; equilibrate concimazioni e irrigazioni; carichi produttivi equilibrati; potatura verde, defogliazione e sistemazione dei tralci; efficace protezione dalle altre avversità.</p> <p><b>Difesa chimica</b> Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche, tenendo conto della sensibilità varietale e dell'andamento climatico: - fioritura - pre-chiusura grappolo</p> <p><b>Nella fase di inaiatura e preraccolta si consiglia di utilizzare solo prodotti biologici (riportati in corsivo).</b> In questo modo si evitano residui nel vino e si ottiene anche un migliore controllo del marciume acido.</p>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Bicarbonato di Potassio</i> <i>Pythium oligandrum ceppo MI</i> <i>Cerevisane</i> <i>Eugenolo+Geranolo+Timolo</i> (1) Fenexamid (2) Fenpirazamina (2) Boscalid (3) Isofetamid (3) Pyrimetanil (4) Mepanipirim (4) Ciprodinil (4, 5) Fludioxonil (5) Fluazinam (6)</p>	<p>Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno, ad eccezione di prodotti biologici</p> <p>(1) Terpeni, max 4 interventi anno (2) Max 2 interventi all'anno, in alternativa tra loro (3) Max 2 interventi all'anno con SDHI (Boscalid, Fluxapyroxad, Isofetamid). Max 1 con Boscalid (4) Con anilino pirimidine max 2 interventi all'anno. Mepanipirim massimo 1 intervento. Pyrimetanil massimo 1 intervento (5) Con Ciprodinil e Fludioxonil, da soli o in miscela, max 1 intervento all'anno. (6) Vedi limitazioni su peronospora.</p>
<b>Black-rot</b> <i>Guignardia bidwellii</i>		<p>Mancozeb (1) Metiram (1) Pyraclostrobin (2) + Metiram (1) Trifloxystrobin (2) Azoxystrobin (2) Fenbuconazolo (3) Tetraconazolo (3) Difenoconazolo (3, 4) Micolbutanil (3, 4) Penconazolo (3) Ditianon + Fosfonato di potassio (5)</p>	<p>(1) I ditiocarbammati possono essere impiegati fino all'allegagione (vedi nota sopra). Mancozeb <b>revocato</b>: impiego ammesso fino al 4 gen. 2022. (2) Con QoI – vedi peronospora - max 3 interventi all'anno, (3) Con IBE max 3 interventi all'anno (4) Candidati alla sostituzione: vedi limitazioni previste per oidio (5) Nei limiti riportati per l'impiego del Ditianon e dei fosfonati su peronospora</p>
<b>Marciume acido</b> Lieviti ( <i>Candida</i> spp e <i>Kloeckera</i> spp) Batteri del genere <i>Acetobacter</i>	<p>E' favorito da lesioni degli acini. I primi sintomi si verificano in corrispondenza dell'inizio inaiatura. Gli acini attaccati hanno una colorazione nocciola (uve bianche) o rosea (uve rosse). Successivamente si svuotano. I sintomi sono accompagnati dalla presenza di <i>Drosophila</i>, che diffonde i microrganismi, e dal caratteristico odore di aceto</p>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i></p>	<p>Preferire l'impiego di prodotti biologici nel controllo della muffa grigia.</p>

VITE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Tripidi</b>		<i>Azadiractina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Spinosad</i> (1) <i>Spinetoram</i> (1) <i>Taufluvinalate</i> (2)	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine. Massimo 1 intervento con Spinetoram. (2) Massimo 1 intervento, in alternativa a Etofenprox e Acrinatrina
<b>Tignoletta</b> <i>Lobesia botrana</i> <b>Tignola</b> <i>Eupoecilia ambiguella</i>	Utilizzare specifiche trappole per il monitoraggio, oppure fare riferimento ai dati del monitoraggio comprensoriale. <b>Difesa chimica</b> - per la I generazione può essere opportuno un intervento prima della fioritura, in aree con popolazione elevata, su varietà a grappolo compatto, per evitare la formazione dei nidi; - per la II generazione il momento dell'intervento va determinato in relazione alla curva di volo e alla sostanza attiva impiegata e, ove disponibile, ai dati rilevati o calcolati sulle ovideposizioni e nascite; - per la III (e IV) generazione sono ammessi trattamenti ove si accerta il superamento della soglia e su varietà tardive, preferibilmente con prodotti che non lasciano residui ( <i>Bacillus t.</i> )	<i>Feromoni</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb (1) Emamectina (2) Clorantropilprole (3) Metossifenozide (4) Tebufenozide (4) Spinosad (5) Spinetoram (5)	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Massimo 2 interventi all'anno (3) Massimo 1 intervento all'anno (4) Max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro. Preferibile non usare Tebufenozide nella terza generazione, tempo carenza 30 giorni. Metossifenozide max 1 trattamento. (5) Max 3 interventi all'anno con spinosine. Massimo 1 intervento con Spinetoram.
<b>Cicalina</b> <i>Scaphoideus titanus</i> <b>Cicaline</b> <i>Empoasca vitis</i> <i>Zygina rhamni</i> <i>Erasmoneura vulnerata</i>	Rispettare scrupolosamente le indicazioni del Servizio Fitosanitario circa il numero ed il momento più opportuno dei trattamenti in ottemperanza al Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria contro <i>Scaphoideus titanus</i> , vettore della Flavescenza Dorata.  In alcuni areali è necessario intervenire per limitare le infestazioni della cicalina di nuova introduzione, <i>Erasmoneura vulnerata</i>	<i>Sali potassici acidi grassi</i> (1) <i>Beauveria bassiana</i> (1) <i>Olio essenziale arancio</i> (1) <i>Piretrine pure</i> (2) <i>Olio minerale</i> Acetamiprid (3) Etofenprox (4) Taufluvinalate (4) Acrinatrina (4) Flupyradifurone	(1) Da impiegare contro le forme giovanili, neanche di 1° e 2° età. Necessaria una buona bagnatura dei polloni. (2) Efficacia limitata alle forme giovanili (3) Max 2 interventi anno (4) Piretroidi: ammesso 1 intervento in alternativa tra loro, dopo l'allegagione. Poco selettivi sugli utili. Nel caso di reinfestazioni di Scafoideo è ammesso un secondo intervento con piretroide, (esclusivamente Taufluvinalate), a distanza di almeno 1 mese dal precedente.
<b>Anomala vitis</b>	In genere è sufficiente posizionare le apposite trappole per cattura massale a inizio volo	Acetamiprid (1)	(1) Max 2 interventi anno
<b>Fillossera</b> <i>Daktulosphaira (=Viteus) vitifoliae</i>	Su varietà che si sono dimostrate sensibili e dove si sono riscontrati sintomi l'anno precedente. Intervenire quando si osserva la formazione iniziale di galle.	Acetamiprid (1) Spirotetramat (2)	(1) Max 2 interventi anno (2) Max 2 interventi anno

VITE

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Notte primaverili</b> <i>Noctua fimbriata</i> , <i>N. pronuba</i> , <i>N. comes</i>	<b>Difesa chimica:</b> Possibili attacchi in fase di germogliamento nelle zone collinari e/o contigue ad aree boscate. Intervenire in caso di presenza accertata.	Indoxacarb (1)	(1) Max 3 interventi all'anno
<b>Ertiofidi</b> <b>Acariosi</b> <i>Calepitrimerus vitis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in caso di forte attacco all'inizio della ripresa vegetativa, se si è verificata la presenza nell'annata precedente <b>Interventi agronomici:</b> può essere utile effettuare la spazzolatura nella zona dei ceppi dove inizia a manifestarsi l'infestazione. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire al manifestarsi della infestazione, se possibile in maniera localizzata sulle piante infestate. Per la <i>T. vitis</i> il periodo più idoneo è alla fuoriuscita delle neanidi (metà giugno-metà luglio)	<i>Olio minerale</i> (1) <i>Zolfo</i> Bifenazate (2)	(1) Da utilizzare entro la fase di gemma gonfia (2) Ammesso 1 solo intervento all'anno, nel limite di 1 intervento con acaricidi sulla coltura
<b>Cocciniglie</b> <i>Targionia vitis</i> , <i>Planococcus</i> spp <i>Neopulvinaria innumerabilis</i> <i>Pulvinaria vitis</i> <i>Parthenolecanium corni</i> <i>Pseudococcus comstoki</i>		<i>Olio minerale</i> Spirotetramat (2) Pyriproxyfen (3) Acetamiprid (4)	(2) Max 2 interventi all'anno (3) Può essere effettuato un solo intervento e solo prima della fioritura, sulle specie di cocciniglie riportate in etichetta. (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Ragnetto rosso e gialli</b> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Eotetranychus carpini</i>	Una corretta difesa rispetta i predatori e non rende normalmente necessario alcun intervento <b>Difesa chimica</b> Soglia d'intervento - inizio vegetazione 60-70% di foglie con forme mobili presenti (ragnetto rosso e giallo); - periodo estivo 10-15 forme mobili per foglia (ragnetto rosso) o 5-6 forme mobili per foglia (ragnetto giallo).	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> Clofentezine Ezitiadox Etoxazole Abamectina Fenpiroximate Bifenazate <b>Tebufenpirad</b>	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno. E' possibile fare la miscela adulcificata + ovicida.
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophyla suzukii</i>	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela, nelle situazioni a rischio.	<i>Piretrine pure</i> <i>Spinosad</i> (1) Deltametrina (2)	(1) Max 3 interventi all'anno con spinosine (2) Max 1 intervento in preraccolta, solo su uve destinate all'appassimento (non entra nel cumulo dei piretroidi).

## DISERBO DEL VIGNETO

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	DOSE E LIMITAZIONI D'USO
Erbicida fogliare Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di vigneto all'anno con formulati a 360 g/l (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva) se si usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche <b>residuali (riportati in grassetto)</b> .
Erbicida fogliare Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	Impiegabile anche come spollonante
Erbicidi fogliari e spollonanti Dicotiledoni	Carfentrazone (2) Pyraflufen-ethyl (3)	Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del giorno). (2) Impiegabile come erbicida e spollonante. (3) Impiegabile come spollonante.
Erbicidi fogliari Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Propaquizafop Cletodim Fluazifop-p-butile	
Residuali Dicotiledoni	<b>Penoxulam</b> <b>Isoxaben</b>	
Residuali Graminacee e Dicotiledoni	<b>Flazasulfuron (4)</b>	(4) Impiegabile solo ad anni alterni ed in alternativa agli altri residuali. Non ammesso su terreni sabbiosi. La dose per ettaro di vigneto non può superare i 20 grammi di sostanza attiva nell'anno di impiego (pari a 80 grammi di formulato al 25% ).
Residuale Dicotiledoni	<b>Diffufenican (5, 6)</b>	(6) Fase di riposo vegetativo e fino ad un mese dal germogliamento
Residuali Graminacee e Dicotiledoni	<b>Oxifluorfen (5)</b> <b>Pendimetalin (5)</b> <b>Propizamide (5)</b>	(5) Sostanze attive candidate alla sostituzione. Utilizzabili sul 30% della superficie, 1 solo intervento all'anno e in alternativa tra loro.

**Il diserbo deve essere localizzato in bande lungo la fila.** L'area trattata con prodotti a base di Glifosate e con i residuali Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican, Propizamide, non deve superare il 30% dell'intera superficie. Con tutti gli altri prodotti non superare il 50% dell'intera superficie (salvo indicazioni più restrittive di etichetta).

Le dosi, dove indicate, sono già calcolate in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di vigneto.

Con prodotti fogliari, è opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da migliorare l'efficacia e limitare le dosi.

## COLTURE BABY LEAF

### BIETOLA DA FOGLIA (Baby leaf) – *Beta vulgaris* (Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Cercospora</b> <i>Cercospora beticola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampi avvicendamenti; eliminare la vegetazione infetta <b>Difesa chimica:</b> intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora farinosa f.sp. betae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> ampie rotazioni colturali <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Cervisane</i> <b>COS-OGA</b> Fosetil-Al Dimetomorf (2) Mandipropamide (2)	3/20 nr – s 0 14 7 7	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame (2) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1 intervento per ciclo, max 3 interventi anno
<b>Phoma betae</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare semente certificata			
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano; ampi avvicendamenti colturali; allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i>	nr	
<b>Rhizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive; utilizzare seme sano oppure conciato; evitare ristagni idrici; allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr 3 nr 1	
<b>Oidio</b> <i>Erysiphae betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1)	5 7	(1) Max 3 interventi all'anno con strobilurine – Pyraclostrobin, Azoxystrobin -.

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

### BIETOLA DA FOGLIA (Baby leaf)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia</i>		<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Pythium oligandrum</i> Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1) Azoxystrobin (2)	nr 0 14 7	(1) Max 1 intervento anno. Ammesso solo per Sclerotinia (2) Vedi nota strobilurine
<b>Muffa grigia</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> arieggiamento della serra; irrigazione per manichetta;esti d'impianto non troppo fitti <b>Difesa chimica:</b> - trattamenti in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> Pyraclostrobin + Boscalid (1)	0 nr 14	(1) Massimo 2 interventi all'anno
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Acetamiprid (1) Lambdacialotrina (2)	1 0 7 nr 10c/5s 14	(1) Massimo 1 intervento per ciclo colturale, 2 all'anno (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Altiche</b> <i>Chaetocnema tibialis</i>	Non ci sono prodotti con impiego specifico verso altica			
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	<b>Difesa chimica:</b> se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	<i>Azadiractina</i>	3	
<b>Mosca</b> <i>Pegomyia betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di grave infestazione	<i>Piretrine pure</i>	2	
<b>Nottue fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> <i>Heliothis; Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> <i>Spinosad</i> (1) Clorantamiprole (2) Metaflumizone (3)	3 3 3 3 3	(1) Massimo 3 interventi all'anno (2) Massimo 2 interventi all'anno (3) Massimo 2 interventi all'anno
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Cantareus</i> , <i>Limax</i> , <i>Agriolimax</i>	<b>Difesa chimica</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)

### DISERBO DELLA BIETOLA DA FOGLIA (Baby leaf)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolaclof (2)	nr	(1) Prodotto impiegabile da febbraio ad agosto



## CICORINO – *Cichorium intybus* - (Baby leaf - coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruggere i residui delle colture ammalate; ampie rotazioni; favorire il drenaggio del suolo; aereare serre e tunnel; utilizzare varietà resistenti. <b>Difesa chimica:</b> di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cv sensibili in caso di piogge ripetute.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisiane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) Fosetil Al Azoxystrobin (3) Mandipropamide (4) Dimetomorf (4) Ametotradina (5)	nr nr - s <b>0</b> 3/20 10/15 14 7 7 7 7c	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi per ciclo, solo pieno campo. (3) Max 3 interventi all'anno con strobilurine - Azoxystrobin, Pyraclostrobin -. (4) Con CAA - Mandipropamide, Dimetomorf - max 1 intervento per ciclo, 4 all'anno (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire alla comparsa dei sintomi.	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1)	5 7	Lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico alle alte temperature (1) Vedi nota sopra
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria porri</i> <b>Ruggine</b> <i>Puccinia cichorii, P. opizii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano; adottare ampi avvicindamenti colturali; allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> - in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Septoria</b> <i>Septoria lactucae</i> <b>Antracnosi</b> <i>Marssonina panatoniana</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Rizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive; utilizzare seme sano oppure conciato; evitare ristagni idrici; distruggere sia le piante malate che quelle vicine	<i>Trichoderma</i> spp <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr 1	
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici; effettuare avvicindamenti ampi <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr nr nr - s	

**CICORINO (Baby leaf - coltura protetta e pieno campo)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - arieggiare le serre e i tunnel; utilizzare varietà poco suscettibili; eliminare le piante ammalate. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative.	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Pythium oligandrum</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxonil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Azoxystrobin (3) Fenexamide (4) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (4)	nr nr nr 3 nr 0 7 7 21c 7 3 14	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Solo pieno campo. Max 1 intervento all'anno (3) Max 3 interventi all'anno con strobilurine – Azoxystrobin, Pyraclostrobin (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 1 intervento anno.
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<i>Vedi Sclerotinia</i>	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxonil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Pyrimethanil (3) Fenexamide (4) <i>Prodotti rameici</i> (1)	nr 0 nr 7 7 21c 14 3 3/20	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Solo pieno campo. Max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno  (1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione vegetazione infetta, che non va interrata; non irrigare per aspersione e con acque “ferme” o con presenza di residui organici. <b>Difesa chimica:</b> da effettuare dopo operazioni che possono causare ferite alle piante			
<b>VIROSI</b> CMV, LeMV	<b>Interventi agronomici:</b> eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi. Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del virus.			

**CICORINO (Baby leaf - coltura protetta e pieno campo)**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon</i> spp., <i>Aphis intybi</i> , <i>Acythosiphon lactucae</i> , ecc.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Zetacipermetrina (1, 4) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2) Spirotetramat (3)	nr 1 0 7 nr 14 14 10c/5s 7	(1) Con Piretroidi max 2 interventi per ciclo. Con Lambdacialotrina max 2 interventi all'anno. Zetacipermetrina max 1 anno (2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 interventi all'anno. (3) Max 2 interventi all'anno (4) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Notte fogliari</b> <i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: In caso di presenza di focolai Intervenire su larve giovani.	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Zetacipermetrina (1, 6) Lambdacialotrina (1) Indoxacarb (2) <i>Spinosad</i> (3) Emamectina (4) Clorantraniliprole (5)	nr 3 3/7 14 14 3 3 3 3	(1) Vedi nota piretroidi (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno. Solo in serra (4) Solo pieno campo. Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Notte terricole</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Soglia: Infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i>	3	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Mosca</b> <i>Ophiomyia pinguis</i>	Si consiglia di interrare in profondità i residui colturali.			
<b>Tripidi</b>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<i>Spinosad</i> (1) Abamectina (2) Lambdacialotrina (3) Terpenoid blend QRD 460	3 7/14 14 nr - s	(1) Max 3 interventi all'anno. Solo in serra (2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale. (3) Vedi nota piretroidi
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> <b>Difesa chimica:</b> - in presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di predatori	<i>Phytoseiulus persimilis</i> Abamectina (1) <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Terpenoid blend QRD 460	nr 7/14 Nr 0 nr - s	(1) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale.
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>	<b>Interventi meccanici:</b> idonee reti anti insetto; esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti <b>Interventi fisici:</b> - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti <b>Difesa chimica:</b> intervenire alla presenza	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Zetacipermetrina (1, 2) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 3/7 nr 14 nr - s	(1) Vedi nota piretroidi (2) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021

## CICORINO (Baby leaf)

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Minatori fogliari</b> <i>Lyriomyza huidobrensis</i>	<b>Interventi biologici:</b> - introdurre <i>Dygllyphus isaea</i> con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq <b>Difesa chimica:</b> - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Spinosad</i> (1) <i>Azadiractina</i> <i>Abamectina</i> (2)	3 3/7 7/14	(1) Max 3 interventi all'anno. Solo in serra (2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale.
<b>Miridi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture protette.			
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus a.</i> , <i>Helicella .</i> , <i>Limax spp.</i> <i>Agriolimax spp.</i>	<b>Difesa chimica</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto , con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva	<i>Paeecilomyces liliacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente	Dazomet (1, 2) Metam Sodio (1, 2, 3) Metam Potassio (1, 2, 3)	nr nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima complessiva 1000 litri per ettaro anno di Metam

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

## DISERBO DEL CICORINO (Baby leaf)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre-semi</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate Acido Pelargonico	nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

## DIFESA INTEGRATA DEL CRESCIONE (Baby leaf)

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	NOTE
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> ( <i>Bremia lactucae</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - aerare oculatamente serre e tunnel - uso di varietà resistenti <b>Difesa chimica</b> - I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) Fosetil Al Azoxystrobin (3) Dimetomorf (4) Mandipropamide (4) Ametotradina (5)	nr nr - s <b>0</b> 20 14c 14 7 7 7 7c	(1) Verificare la registrazione dei Formulati Commerciali. Max 4 kg rame ettaro/anno. (2) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo (3) Verificare se FC utilizzabile anche in serra. Massimo 3 interventi all'anno con strobilurine – Azoxystrobin, Pyraclostrobin -. (4) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	<b>Difesa chimica</b> intervenire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico o alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1)	5 7	(1) Vedi nota sopra
<b>Alternaria</b> ( <i>Alternaria spp.</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - Impiego di seme sano; adottare ampi avvicendamenti colturali- allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica</b> In presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	20	(1) Verificare la registrazione dei formulati commerciali. Max 4 kg rame ettaro/anno
<b>Moria delle piante</b> ( <i>Pythium spp.</i> )	<b>Difesa chimica</b> intervenire durante le prime fasi vegetative	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	3 nr - s	
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiare le serre - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - utilizzare varietà poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione <b>Difesa chimica</b> intervenire durante le prime fasi vegetative	<i>Coniothyrium minutans</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Cyprodinil + Fludioxinil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Azoxystrobin (3) Fenexamide (4) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (5)	nr 3 nr nr 0 7 14 7 3 14	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno con strobilurine – Azoxystrobin, Pyraclostrobin (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 1 intervento anno.

**CRESCIONE (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	Vedi Sclerotinia	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxinil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Fenexamid (3)	0 nr nr 7 7 14 3	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Rizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - avvicindamenti colturali - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	3 1	
<b>BATTERIOSI</b> <i>(Pseudomonas cichorii)</i> <i>(Erwinia carotovora subsp. carotovora)</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme controllato - rotazioni colturali - evitare di irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non siano periodicamente ripuliti dai residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Verificare la registrazione dei formulati commerciali. Max 4 kg rame ettaro/anno
<b>VIROSI</b> (CMV, LeMV)	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente valgono le considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per le virosi trasmesse per seme è fondamentale utilizzare seme controllato			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> <i>Acyrtosiphon lactuca</i> )	<b>Difesa chimica</b> Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Piretrine pure</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Spirotetramat (3)	1 nr 0 3/7 3/7 14 7	Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro questa avversità. (1) Max 2 per ciclo colturale con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

**CRESCIONE (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza</i> spp.	<b>Interventi biologici:</b> Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale <b>Difesa chimica</b> se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Diglyphus isaea</i> <i>Spinosad</i> (1)	nr 3	(1) Max 3 interventi all'anno
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Difesa chimica</b> Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi	Lambdacialotrina (1)	nr	(1) Divieto di impiego in serra
<b>Notte fogliari</b> <i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i>	<b>Difesa chimica</b> In caso di presenza di focolai	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus T. sub. Kurstaki</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6)	nr 3 3/7 3/7 14 3 3 3 3	(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno
<b>Notte terricole</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Difesa chimica</b> Soglia: Infestazione generalizzata.	Deltametrina (1)	3/7	(1) Vedi note sopra
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i>	<b>Difesa chimica</b> Intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Terpenoid blend QRD 460	3/7 14 3 nr - s	(1) Max 2 per ciclo colturale con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. (3) Max 3 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>	<b>Interventi agronomici</b> - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi <b>Interventi fisici:</b> - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti	<i>Maltodesetrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Lambdacialotrina (1) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 14c nr - s	(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina
<b>Miridi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture protette.			

**CRESCIONE (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi biologici:</b> realizzare almeno 3 lanci con <i>Phitoseiulus persimilis</i> a cadenza quindicinale	<i>Phitoseiulus persimilis</i> <i>Maltodestrina</i> Terpenoid blend QRD 460	nr nr nr - s	(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp. <i>Limax</i> spp.	<b>Difesa chimica</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. (1) Da utilizzare
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> spp <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium</i> spp	<b>Difesa chimica</b> solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Dazomet (1, 2) Metam Sodio o Potassio (1, 3)	nr nr	(1) Da effettuarsi prima della semina o del trapianto, solo in coltura protetta. (2) Impiegabile 1 volta ogni 3 anni (3) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale, 1 anno ogni 3 (vedi etichetta)

**DISERBO DEL CRESCIONE (Baby leaf)**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido Pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.



## DOLCETTA O VALERIANELLA (Baby leaf) *Valerianella locusta*

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture ammalate; favorire il drenaggio del suolo; aerare serre e tunnel; uso di varietà resistenti <b>Difesa chimica:</b> I trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia; di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge ripetute.	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (2) Fosetil Al Azoxystrobin (3) Dimetomorf (4) Mandipropamide (4) Ametoctradina (5)	nr nr - s <b>0</b> 20 10c 14 7 7 7 7c	(1) Verificare la registrazione dei Formulati Commerciali. Max 4 kg rame ettaro/anno. (2) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo (3) Verificare se FC utilizzabile anche in serra. Massimo 3 interventi all'anno (4) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano; allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Phoma</b> <i>Phoma valerianella</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare semente certificata			
<b>Marciume basale e</b> <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiare le serre; limitare le irrigazioni; evitare ristagni idrici; eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili ed evitare di lesionare le piante; avvicindamenti culturali con specie poco suscettibili; ricorrere alla solarizzazione <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Coniothyrium minutans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxinil (1) Fenexamide (2) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (3) Azoxystrobin (4)	nr 3 nr nr nr 0 7 7 3 14 7	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento anno. (4) Massimo 3 interventi all'anno
<b>Rizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr 3 1	
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo alla comparsa dei sintomi	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Azoxystrobin (1)	5 3 7	(1) Massimo 3 interventi all'anno

**DOLCETTA o VALERIANELLA (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	nr nr 3 nr - s	
<b>Fusarium</b> <i>Fusarium oxysporum</i>	Utilizzo di sementi selezionate			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Vedi Sclerotinia <b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxinil (1) Fenexamid (2)	nr 0 nr 7 7 3	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno
<b>BATTERIOSI</b> <i>Acidovorax valerianellae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta, che non va interrata; è sconsigliato irrigare con acque "ferme", con residui organici; non irrigare per aspersione	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> <i>Acyrtosiphon lactucae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (3) Spirotetramat (4)	1 3/7 nr 0 3/7 14 10c/5s 7	Max 3 interventi per ciclo contro questa avversità. (1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi.. Lambdacialotrina max 2 all'anno. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. (3) T.c. 5 gg coltura protette e 10 gg pieno campo. Max 1 intervento per ciclo, 2 all'anno (4) Max 2 interventi all'anno

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

**DOLCETTA o VALERIANELLA (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera Heliothis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus t. kurstaki</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4) Metaflumizone (5)	nr 3 3/7 3/7 14 3 3 3 3	(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi.. Lambdacialotrina max 2 all'anno. Deltametrina t.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 1 intervento all'anno; solo pieno campo. (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza</i> spp.	<b>Controllo biologico:</b> almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, con <i>Dygliphus isaea</i> <b>Difesa chimica:</b> - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Spinosad</i> (1) Abamectina (2) Deltametrina (3)	3 7/14 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo. Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra novembre e febbraio. T.c 7 gg pieno campo, 14 gg in serra (3) Vedi nota piretroidi.
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>	<b>Interventi meccanici:</b> - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli aleurodidi; esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti <b>Interventi fisici:</b> utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti <b>Difesa chimica:</b> presenza	<i>Maltoestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Lambdacialotrina (1) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 14 nr - s	(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi. Lambdacialotrina max 2 all'anno.
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire in caso di presenza	Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Abamectina (4) Acrinatrina (5) Terpenoid blend QRD 460	3/7 14 3 7/14 14c nr - s	(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi. Lambdacialotrina max 2 all'anno. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale. (5) Max 1 intervento per ciclo
<b>Miridi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture protette.			

**DOLCETTA (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi biologici:</b> lanci con <i>Phytoseiulus persimilis</i>	<i>Maltodesirina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acrinatrina (1) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 14c nr - s	(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Canitarsus a.</i> , <i>Helicella v.</i> , <i>Limax spp.</i> <i>Agriolimax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica	<i>Paecilomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di presenza accertata nella coltura precedente	Dazomet (1, 2) Metam Sodio o Potassio (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

**DOLCETTA - DISERBO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

## BRASSICACEAE – FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (Baby leaf)

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture ammalate; favorire il drenaggio del suolo; aereare oculatamente serre e tunnel; uso di varietà resistenti <b>Interventi chimici</b> I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Prodotti rameici</i> (1, 2) Metalaxil-M + Rame (2, 3) Fosetil AI Azoxyastrobin (4) Mandipropamide (5)	nr nr – s <b>0</b> 20 10/14 14 7 7	(1) Verificare registrazione formulati. (2) Max 4 kg rame ettaro/anno. (3) Max 2 interventi per ciclo (t.c. 14 gg in serra, 10 in pieno campo) (4) Verificare se FC utilizzabile anche in serra. Max 3 interventi anno (5) Con Mandipropamide max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i>	3	
<b>Oidio</b> <i>Erysiphae betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> Azoxyastrobin (1)	5 7	(1) Massimo 3 interventi all'anno
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare ampie rotazioni; arrieggiare le serre e i tunnel; eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili <b>Difesa chimica:</b> Intervenire durante le prime fasi vegetative	<i>Coniothyrium minutans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Cyprodinil + Fludioxinil (1) Fenexamide (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Fluxapiraxad + Difenconazolo (4) Azoxyastrobin (5)	nr 3 nr nr nr 0 7 3 14 14 7	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 1 intervento anno (5) Massimo 3 interventi all'anno
<b>Muffa grigia</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Vedi marciumi basali <b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Boscalid + Pyraclostrobin (1) Fludioxinil (2) Cyprodinil + Fludioxinil (2) Fenexamide (3)	0 nr nr 14 7 7 3	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 3 interventi all'anno con Fludioxinil (3) Max 2 interventi anno

**BRASSICACEAE (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> <i>Nasonovia</i>	<b>Interventi chimici:</b> Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodesrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (3) Spirotetramat (4)	1 3/7 nr 0 3/7 14 10c/5s 7	Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro questa avversità. (1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretro idi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno, max 1 intervento per ciclo (4) Max 2 interventi all'anno
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (4) <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Abamectina (5) Terpenoid blend QRD 460	3/7 14 3 0 14 nr - s	(1) Max 2 interv. per ciclo colturale con piretroidi (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. (3) Max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno (4) Max 3 interventi all'anno (5) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del formulato commerciale.
<b>Altica</b> <i>Phyllotreta</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo su piante giovani ed in presenza di infestazioni accertate	Acetamiprid (1, 2)	10c/5s	(1) Con neonicotinodi max 1 intervento per taglio (2) Massimo 2 interventi all'anno
<b>Tentredini</b> <i>Athalia rosae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1)	3/7	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Nottue fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> <i>Spodoptera</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus T. sub. Kurstaki</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (3) <i>Spinosad</i> (4) Metaflumizone (5) Emamectina (6) Cloraniliprole (7)	nr 3 3/7 3/7 14 3 3 3 3	(1) Max 2 interv. per ciclo colturale con piretroidi (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno (4) Max 3 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno
<b>Mosca del cavolo</b> <i>Delia = Hylemya radicum</i>	<b>Interventi agronomici</b> eliminare le crucifere spontanee <b>Difesa chimica:</b> intervenire in base al controllo delle ovideposizioni	Deltametrina (1)	3/7	(1) Vedi nota piretroidi

**BRASSICACEAE (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Cantareus</i> a., <i>Helicella</i> v., <i>Limax</i> spp. <i>Agriolimax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica	<i>Paecilomyces liliacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> spp <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium</i> spp	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente	Dazomet (1, 2) Metam Sodio o Potassio (1, 2, 3)	nr nr	(1) Da effettuarsi prima della semina o del trapianto, solo in coltura protetta. (2) Impiegabile 1 volta ogni 3 anni (3) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale, 1 anno ogni 3 (vedi etichetta)

**DISERBO BRASSICACEAE (Baby leaf)**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre-semine</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate Acido Pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

**N.B. Per colture adulte vedi scheda "Cavoli a Foglia"**

## DIFESA INTEGRATA del LATTOGHINO (Baby leaf) - *Lactuca sativa*

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture ammalate; favorire il drenaggio del suolo; distanziare maggiormente le piante; aereare serre e tunnel; uso di varietà resistenti</li> </ul> <p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 applicazioni in semenzaio;</li> <li>In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponendo la malattia; di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge ripetute.</li> </ul>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Laminarina</i> <i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) Azoxystrobin (3) Fosetil Al Pyraclostrobin (3) + Dimetomorf (4) Mandipropamide (4) Ametotradina (5) + Dimetomorf (4) Dimetomorf (4)</p>	<p>nr nr - s nr - s 0 3/20 10/14 7 14 7 7 7 7</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Max 2 interventi per ciclo. Tempo carenza 10 gg pieno campo, 14 gg in serra. (3) Con QoI - Pyraclostrobin, Azoxistrobin, max 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno. (4) Con CAA - Dimetomorf, Mandipropamide - max 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno (5) Con Ametotradina max 2 interventi all'anno s = solo in serra</p>
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire solo alla comparsa dei sintomi</li> </ul> <p>Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico ad alte temperature</p>	<p><i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Azoxystrobin (1)</p>	<p>7 3 7</p>	<p>(1) Con QoI al massimo 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno.</p>
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp.	<p><b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano; allontanare i residui di piante infette</p>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p>	<p>3/20</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo Verificare l'impiego sui Formulati Commerciali</p>
<b>Moria delle piantine</b> <i>Pythium</i> spp.	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare ristagni idrici</li> <li>- effettuare avvicendamenti ampi</li> </ul> <p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire alla comparsa dei sintomi</li> </ul>	<p><i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T.gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Metalaxil-M (1)</p>	<p>nr 3 nr - s 15</p>	<p>(1) Con fenilammidi max 2 interventi per ciclo</p>
<b>Ruggine</b> <i>P. cichorii</i> , <i>P. opizii</i> )	<p><b>Difesa chimica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire alla comparsa dei primi sintomi</li> </ul>	<p><i>Prodotti rameici</i> (1)</p>	<p>3/20 20</p>	<p>(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo</p>

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.



**LATTUGHINO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i> <b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiare le serre - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - utilizzare varietà poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative	<i>Coniothrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Trichoderma</i> spp <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil (4) + Fludioxinil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Fenexamide (3) Pyrimetanil (4) Fluxapiraxad + Difenoconazolo (5) Azoxyastrobin (6)	nr 3 nr nr nr 0 7 7 14 3 14 14 7	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Con anilinoipirimidine – Pyrimethanil , Cyprodinil – max 3 interventi all'anno. (5) Max 1 intervento anno. Ammesso solo per Sclerotinia (6) Con QoI - Pyraclostrobin, Azoxistrobin, max 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno.
<b>Rizoctonia</b> <i>Rhizoctonia</i> spp	<b>Interventi agronomici:</b> Vedi <i>Sclerotinia</i> <b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Trichoderma harzianum</i>	nr 3 1 nr - s	
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> Utilizzare seme sano	<i>Trichoderma harzianum</i>	nr	
<b>BATTERIOSI</b> ( <i>Pseudomonas cichorii</i> ) ( <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme controllato - rotazioni colturali - evitare di irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non siano periodicamente ripuliti dai residui organici	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>VIROSI</b> (CMV, LeMV)	Eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi. Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono sufficienti per prevenire la trasmissione del virus.			
<b>TSWV – Tospovirus</b>	Verificare la presenza di tripidi al momento del trapianto			

## LATTUGHINO (Baby leaf)

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> <i>Acyrtosiphon lactuca</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire in caso di presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 5) Acetamiprid (3) Spirotetramat (4)	nr 1 3/7 nr 0 3/7 14 7 10c/5s 7	Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro questa avversità. (1) Massimo 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi. Max 1 all'anno con Zetacipermetrina. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno, max 1 intervento per ciclo (4) Max 2 interventi all'anno (5) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza</i> spp.	Si consiglia il monitoraggio con trappole cromotropiche di colore giallo <b>Controllo biologico:</b> Lancio di <i>Diglyphus isaea</i> <b>Difesa chimica:</b> se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Spinosad</i> (1) <i>Azadiractina</i> Abamectina (2)	3 3/7 7/14	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del formulato commerciale.
<b>Miridi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture protette.			
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi.	Teflutrin Zetacipermetrina (1) Lambdacialotrina	nr - c 7 nr - c	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità. Non entra nel cumulo dei piretroidi (1) <b>Revocata</b> . Formulato granulare impiegabile fino al 30/11/2021 c = solo pieno campo

**LATTUGHINO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Noctue fogliari</b> <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera Heliothis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus T. sub. Kurstaki</i> <i>Spodoptera littoralis NPV</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1, 2) Zetacipermetrina (1, 8) Lambdacialotrina (1) Indoxacarb (3) <i>Spinosad</i> (4) Metaflumizone (5) Emamectina (6) Clorantniliprole (7)	nr 3 3 3/7 3/7 7 14 3 3 7c 3 3	(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi. Max 1 all'anno con Zetacipermetrina. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 3 interventi all'anno (5) Solo pieno campo. Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno (7) Max 2 interventi all'anno (8) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021
<b>Noctue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - infestazione generalizzata.	Deltametrina (1)	3/7	(1) Vedi nota piretroidi
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1, 2) <i>Spinosad</i> (3) <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Abamectina (4) Terpenoid blend QRD 460	3/7 3 0 7/14 nr - s	(1) Vedi nota piretroidi (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento per ciclo. Max 3 anno. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale.
<b>Aleurodidi</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i> )	<b>Interventi agronomici</b> - reti per schermare tutte le aperture al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi; pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti <b>Interventi fisici:</b> - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente <b>Difesa chimica:</b> - presenza	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Azadiractina</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Lambdacialotrina (1) Zetacipermetrina (1, 2) Terpenoid blend QRD 460	nr 3/7 3 nr 0 14 7 nr - s	(1) Vedi nota piretroidi. (2) <b>Revocata</b> . Impiegabile fino al 24/09/2021

**LATTUGHINO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari per foglia; realizzare almeno n. 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo n. 2 individui per pianta e per lancio <b>Difesa chimica:</b> In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di predatori	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Abamectina (1) Terpenoid blend QRD 460	nr nr 0 7/14 nr - s	(1) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del formulato commerciale.
<b>Limacce</b> <i>Helix</i> spp. <i>Limax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca (1) <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnellino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica	<i>Paeecilomyces liliacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> spp <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium</i> spp	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente	Dazomet (1, 2) Metam Sodio o Potassio (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impieghi una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima complessiva 1000 litri per ettaro anno

**DISERBO DEL LATTUGHINO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

**DIFESA INTEGRATA della RUCOLA (Baby leaf) - *Eruca sativa***  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora parasitica</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni, distruggere i residui delle colture infette, favorire il drenaggio del suolo, aerare oculatamente serre e tunnel, uso di varietà resistenti <b>Difesa chimica:</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> <i>Prodotti rameici</i> (1) Metalaxil-M + Rame (1, 2) Fosetil Al Azoxystrobin (3) Mandipropamide (4) Dimetomorf (4)	nr - s 0 20 10/14 14 7 7 7	(1) Verificare la registrazione dei Formulati Commerciali. Max 4 kg rame metallo ettaro/anno. (2) Max 2 interventi per ciclo. Tempo carenza 14 gg in serra, 10 in pieno campo (3) Verificare se utilizzabile anche in serra. Massimo 3 interventi all'anno (5) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf – massimo 1 intervento per ciclo, max 3 interventi all'anno
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette <b>Difesa chimica:</b> - in presenza di sintomi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Pythium</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - gli stessi richiamati per <i>Sclerotinia</i>	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i>	nr nr	
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Difesa chimica:</b> da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamentoclimatico; trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	<i>Zolfo</i> Azoxystrobin (1)	5 7	(1) Vedi nota sopra
<b>Fusarium</b> <i>Fusarium oxysporum</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Trichoderma harzianum</i>	nr	
<b>Rhizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - gli stessi richiamati per <i>sclerotinia</i>	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	nr 3 1	

## RUCOLA (Baby leaf)

(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiare le serre; limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; eliminare le piante ammalate; evitare di lesionare le piante; utilizzare varietà poco suscettibili; avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili; ricorrere alla solarizzazione; effettuare pacciamature e prosature alte <b>Difesa chimica:</b> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>T. gamisi</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Fludioxonil (1) Cyprodinil + Fludioxonil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Fenexamide (3) Fluxapiraxad + Difenoconazolo (4) Azoxystrobin (5)	nr 3  nr nr nr 0 7 7 14 3 14 7	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno (4) Max 1 intervento anno (5) Massimo 3 interventi all'anno
<b>Muffa grigia</b> ( <i>Botriotinia</i> <i>fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - arrieggiamento della serra; irrigazione per manichetta; sestì d'impianto non troppo fitti <b>Difesa chimica:</b> i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Fludioxonil (1) Ciprodinil + Fludioxonil (1) Boscalid + Pyraclostrobin (2) Fenexamid (3)	0 nr nr 7 7 7 3	(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> <i>Brevicoryne brassicae</i>	<b>Difesa chimica:</b> Intervenire in caso di presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	<i>Piretrine pure</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodesirina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (4) Spirotetramat (5)	1 3/7 nr 0 3/7 14 10c/5s 7	Massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità. (1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all'anno (4) Max 2 interventi all'anno, max 1 intervento per ciclo (5) Max 2 interventi all'anno
<b>Aleurodidi</b> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ; <i>Bemisia tabaci</i>	<b>Interventi meccanici:</b> idonee reti per schermare le aperture delle serre; esporre pannelli gialli <b>Interventi fisici:</b> utilizzare plastiche fotosellettive con effetto repellente per gli insetti <b>Difesa chimica, soglia:</b> presenza	<i>Maltodesirina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> Lambdacialotrina (1) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 3/7 14 nr - s	(1) Vedi nota piretroidi s = solo in serra

**RUCOLA (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra brassicae</i> <i>Phalonia contractana</i> <i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera</i> spp	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di presenza di focolai	<i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus T. sub. Kurstaki</i> <i>Azadiractina</i> Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantropilprole (6)	nr 3 3/7 3/7 14 3 3 3 3	(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina. (2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all'anno (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 2 interventi all'anno (5) Max 2 interventi all'anno (6) Max 2 interventi all'anno
<b>Altiche</b> <i>Phyllotreta</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza.	Deltametrina (1) Acetamiprid (2)	3/7 10c/5s	(1) Vedi sopra nota piretroidi (2) Con neonicotinoidi max 1 intervento per taglio. Con Acetamiprid max 2 interventi all'anno
<b>Tentredini</b> <i>Athalia rosae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire sulle giovani larve	Deltametrina (1)	3/7	(1) Vedi sopra nota piretroidi
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Difesa chimica:</b> - in caso di presenza	Deltametrina (1, 2) Lambdacialotrina (1) <i>Spinosad</i> (3) Abamectina (4, 5) Acrinatrina (1) Terpenoid blend QRD 460	3/7 14 3 14 14c nr - s	(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi. Max 2 all'anno con Lambdacialotrina (2) Vedi nota sopra (3) Max 3 interventi all'anno (4) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego del Formul. commerciale
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Controllo biologico:</b> - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie. Almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo n. 2 individui per pianta e per lancio <b>Difesa chimica:</b> in presenza di focolai con evidenti aree decolorate delle foglie e assenza di predatori <b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture protette.	<i>Maltodesrina</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> Acrinatrina (1) Terpenoid blend QRD 460	nr 0 14c nr - s	(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi c = solo pieno campo
<b>Miridi</b> <i>Lygus rugulipennis</i>				

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

**RUCOLA (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Liriomiza</b> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	<b>Controllo biologico:</b> - lanci di <i>Diglyphus isaea</i> , 0,2 individui/mq. con almeno 20 adulti del fitofago catturati con trappole cromotropiche. L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio di ausiliari. <b>- Difesa chimica:</b> - intervenire con accertata presenza di mine sottoepidermiche o punture di nutrizione e/o ovodeposizioni.	<i>Azadiractina</i> <i>Abamectina</i> (1) <i>Spinosad</i> (2)	3/7 7/14 3	Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo (1) Max 1 intervento per ciclo. No in serra. Verificare indicazioni di impiego del F. commerciale. (2) Massimo 3 interventi all'anno
<b>Mosca Delia = <i>Hylemya radicum</i></b>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di grave infestazione	<i>Deltametrina</i> (1)	3/7	(1) Vedi sopra nota piretroidi
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus a.</i> , <i>Helicella v.</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica	<i>Paeclomyces lilacinus</i> <i>Estratto d'aglio</i>	nr nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente	<i>Dazomet</i> (1, 2) <i>Metam Sodio</i> o <i>Potassio</i> (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) <i>Dazomet</i> e <i>Metam</i> sono impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima complessiva 1000 litri per ettaro anno

**DISERBO DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (Baby leaf)**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre-semi</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.



## SPINACINO (Baby leaf) – *Spinacia oleracea* (Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Concia del seme</b>		Metaxil-M		
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora farinosa</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni molto ampie, allontanamento delle piante o delle foglie infette, distruzione dei residui delle colture ammalate, impiego di semi sani o concitati, favorire l'arieggiamento della vegetazione, ricorso a varietà resistenti <b>Difesa chimica:</b> - la difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare). I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Cerevisane</i> <b>COS-OGA</b> Fosetil Al Dimetomorf (2) Mandipropamide (2)	3/20 nr – s <b>0</b> <b>14</b> 7 7	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1 intervento per ciclo, 3 all'anno.
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> <i>f.sp. spinaciae</i> <b>Cercosporiosi</b> <i>Cercospora</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano o conciato; ampi avvicendamenti colturali; distruzione dei residui delle colture ammalate; favorire l'arieggiamento della vegetazione; ricorrere a varietà poco suscettibili <b>Difesa:</b> - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	<i>Prodotti rameici</i> (1)	3/20	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia</i> spp <b>Rhizoctonia</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali alterando colture poco recettive; utilizzare seme sano oppure conciato; evitare ristagni idrici; allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp <i>Pythium oligandrum</i> <i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ Fluxapiraxad + Difenocozolo (2)	nr nr 0 1 14	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura. Indicato per <i>Sclerotinia</i> . (2) Max 1 intervento anno. Amnesso per <i>Sclerotinia</i> .
<b>Muffa grigia</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> arieggiamento della serra, irrigazione per manichetta, sesti d'impianto non troppo fitti <b>Difesa:</b> - i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> Pyraclostrobin + Boscalid (1) Fludioxonil (2)	nr 0 14 7	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi all'anno

N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.

Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.

Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l'etichetta aggiornata dei prodotti fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità.

**SPINACINO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Oidio</b> <i>Erysiphae betae</i>	<b>Difesa chimica:</b> - da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo	5	
<b>Moria delle piante</b> <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare ristagni idrici,- effettuare avvicendamenti ampi <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i>	nr	
<b>VIROSI</b> CMV	Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus del mosaico del cetriolo (CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono sufficienti per prevenire la trasmissione del virus.			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Afidi</b> ( <i>Myzus persicae</i> ) ( <i>Aphis fabae</i> )	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza	<i>Piretrine pure</i> <i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Azadiractina</i> <i>Maltodestrina</i> Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2)	1 0 7 nr 14 10c/5s	(1) Max 2 interventi all'anno con Lambdacialotrina (2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all'anno
<b>Notte fogliari</b> <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> spp., <i>Helotis</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire in caso di presenza di focolai.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Azadiractina</i> Indoxacarb (1) <i>Spinosad</i> (2) Clorantraniliprole (3)	3 7 10 3 3	(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 3 interventi all'anno (3) Max 2 interventi all'anno
<b>Miridi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture protette.			
<b>Tentredini</b> <i>Athalia rosae</i>				
<b>Mosca minatrice</b> <i>Liriomyza</i> spp.	<b>Controllo biologico</b> Lanci di <i>Diglyphus isaea</i>	<i>Spinosad</i> (1) Acetamiprid (2)		(1) Max 3 interventi all'anno (2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all'anno

**SPINACINO (Baby leaf)**  
(Coltura protetta e pieno campo)

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	T.C. gg	LIMITAZIONI D'USO
<b>Mosca</b> <i>Pegomyia betae</i>				
<b>Limacce</b> <i>Helix spp.</i> , ( <i>Cantareus a.</i> , <i>Helicella v.</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate.	Metaldeide esca <i>Fosfato ferrico</i>	20 nr	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnelino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Nematodi galligeni</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	nr	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
<b>Patogeni tellurici</b> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Pythium spp</i>	<b>Difesa chimica</b> - solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente	Dazomet (1, 2) Metam Sodio o Potassio (1, 2, 3)	nr nr	(1) Ammessi solo in coltura protetta (2) Dazomet e Metam sono impieghi una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. (3) Dose massima complessiva 1000 litri ettaro anno

**DISERBO DELLO SPINACINO (IV gamma, comprese Baby leaf)**

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	T.C. gg	NOTE
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Acido pelargonico	nr nr	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolaclof (1)	nr	(1) Impiego ammesso da febbraio ad agosto, come da etichetta

## PICCOLI FRUTTI

### DIFESA INTEGRATA DEL LAMPONE – *Rubus idaeus*; *Rubus spp* (specie non europee).

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Cancri rameali</b> <i>Dydimella applanata</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di vegetazione lungo la fila; evitare sistemi di irrigazione per aspersione; asportare i polloni colpiti e distruggerli. <b>Difesa chimica:</b> intervenire sui tralci in fase autunnale.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati; max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
<b>Ruggine</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di vegetazione; - evitare sistemi di irrigazione per aspersione; - asportare e distruggere i polloni colpiti.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Vedi nota sopra
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - razionali concimazioni azotate; - allevare un numero di tralci regolare a metro lineare (8-10 tralci per le cv. unifere); - adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare dall'appezzamento i residui della vegetazione estiva.	Pyraclostrobin+Boscalid (1) Cyprodinil + Fludioxonil (2) <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i>	(1) Al massimo 2 interventi all'anno. Non ammesso in serra. (2) Al massimo 2 interventi all'anno. Non ammesso in serra.
<b>Deperimento progressivo</b> <i>Verticillium</i> , <i>Cylindrocarpum</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare terreni asfittici; favorire lo sgrondo delle acque in eccesso; - utilizzare materiale di propagazione sano; - non effettuare interventi ripetuti di fresature nell'interfila; - evitare il passaggio ripetuto dei mezzi meccanici su suolo saturo di umidità; - adottare l'inerbimento nell'interfila.	<i>Trichoderma harzianum</i>	
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca macularis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare razionali sestì di impianto; utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti; - evitare eccessi di azoto nel suolo.	<i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> Penconazolo (1)	(1) Massimo 1 intervento
<b>Tumore batterico</b> <i>Agrobacterium tumefac.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - utilizzare materiale di propagazione sano; adottare ampie rotazioni;		
<b>Virus</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di materiale di propagazione sano; - adottare razionali rotazioni colturali		
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cecidomia della corteccia</b> <i>Thomasiniana theobaldi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ridurre e razionalizzare gli apporti di azoto; - asportare i residui della vegetazione.	<i>Spinosad</i> (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Antonomo</b> <i>Anthonomus rubi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare accurate pulizie dei fossi per contenere il parassita. N.B. - I prodotti a base di Piretrine sono tossici per gli stadi mobili di Fitoseide e per le larve di Crisopa. Si consiglia di distanziare di almeno due giorni l'eventuale trattamento dall'introduzione dei predatori.	Acetamiprid (1)	(2) Massimo 2 interventi all'anno

**DIFESA INTEGRATA DEL LAMPONE**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa biologica:</b> - lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> oppure <i>Amblyseius californicus</i>	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Olio minerale</i> (1) Abamectina (2) Clofentezine (3) Terpenoid blend QRD 460	(1) Verificare la registrazione dei Formulati (2) Massimo 1 intervento per anno, solo in pieno campo (3) Massimo 1 intervento per anno
<b>Afidi</b> <i>Aphidula idaei</i> , <i>Amphorophora rubi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - razionalizzare gli apporti di azoto, al fine di contenere o limitare gli attacchi di afidi (ed anche di cicaline) <b>Difesa biologica:</b> utilizzo di <i>Beauveria bassiana</i>	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Olio minerale</i> (1) Lambdacialotrina (2) Acetamiprid (3) Flupyradifurone (4)	(1) Verificare registrazione Formulati (2) Massimo 2 interventi all'anno. Può favorire attacchi di ragnò rosso (3) Max 2 interventi anno (4) Solo in serra
<b>Cicaline</b>		<i>Olio essenziale di arancio</i> Acetamiprid (1)	(1) Max 2 interventi anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>		<i>Piretrine pure</i> (1) Acetamiprid (2)	(1) No in coltura protetta (2) Max 2 interventi anno
<b>Tortrice dei germogli</b>		<i>Spinosad</i> (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno tra <i>Spinosad</i> e <i>Spinetoram</i>
<b>Tripidi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> non sfalciaie durante la fioritura	Terpenoid blend QRD 460	
<b>Ditteri</b> <i>Lasiotera rubi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - asportare i tralci colpiti e distruggerli.		
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophila suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - si consiglia l'utilizzo di reti antiinsetto Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> (1) Acetamiprid (2) Lambdacialotrina (3) Spinetoram (4)	(1) No in coltura protetta (2) Max. 2 interventi anno (3) Massimo 1 intervento all'anno. (4) Max 2 interventi anno
<b>Oziotrinco</b>	<i>Metarhizium anisopliae</i> : il prodotto dev'essere usato solo per trattamenti al substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo	<i>Nematodi entomopatogeni</i> <i>Metarhizium anisopliae</i>	
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di infestazione generalizzata	<i>Fosfato ferrico</i>	

**DISERBO LAMPONE**

INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	CARENZA GIORNI	NOTE
Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	7	Autorizzato solo su lampone. <b>Limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminati sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.-. L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
Graminacee	Quizalofop etile	42	

**DIFESA INTEGRATA DEL MIRTILLO – *Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium* spp.**

<b>AVVERSITA'</b>	<b>CRITERI D'INTERVENTO</b>	<b>SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI</b>	<b>NOTE E LIMITAZIONI D'USO</b>
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Marciume dei giovani frutticini</b> <i>Sclerotinia vaccinii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Coniothyrium minutans</i> (2)	(1) Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati; max 4 kg ettaro/anno di rame metallo. (2) Impiego sul terreno in assenza di coltura
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali; - utilizzo di cv. tolleranti.	Pyraclostrobin+Boscalid (1) <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i>	(1) Al massimo 2 interventi all'anno. Non ammesso in serra.
<b>Cancri rameali</b> <i>Phomopsis</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto <b>Difesa chimica:</b> interventi alla caduta delle foglie	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Vedi nota sopra
<b>Septoriosi</b> <i>Septoria albopunctata</i>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Vedi nota sopra
<b>Marciumi del colletto</b> <b>Patologie del terreno</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - buon drenaggio; - razionali concimazioni.	<i>Prodotti rameici</i> (1) <i>Trichoderma harzianum</i>	(1) Vedi nota sopra
<b>Batteriosi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di materiale di propagazione sano; - utilizzo di cv. tolleranti o resistenti.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Vedi nota sopra
<b>Virus</b>	<b>Interventi agronomici:</b> impiego di materiale di propagazione sano.		

**DIFESA INTEGRATA DEL MIRTILLO – *Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium* spp.**

<b>FITOFAGI</b>			
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa biologica:</b> - lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> oppure <i>Amblyseius californicus</i>	<i>Olio minerale</i> (1) Terpenoid blend QRD 460	(1) Verificare registrazione dei prodotti com.
<b>Cocciniglia</b> <i>Parthenolecanium corni</i>		<i>Olio minerale</i> (1)	(1) Verificare registrazione dei prodotti commerciali
<b>Tortricidi</b>		<i>Spinosad</i> (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno tra <i>Spinosad</i> e <i>Spinetoram</i>
<b>Afidi</b> <i>Ericaphis cammelli</i> , <i>Illinoia azaleae</i> e <i>Aulacorthum</i> ( <i>Neomyzus</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - razionalizzare gli apporti di azoto	<i>Olio minerale</i> (1)	(1) Verificare registrazione dei prodotti com.
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophila suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - si consiglia l'utilizzo di reti antiinsetto Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> (1) Fosmet (2) Spinetoram (3)	(1) ) No in coltura protetta (2) Max 1 intervento all'anno (3) Max 2 interventi anno, nel limite dei 3 interventi con spinosine
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>		<i>Piretrine pure</i> (1)	(1) ) No in coltura protetta
<b>Oziotrinco</b>	<i>Metarhizium anisopliae</i> : il prodotto dev'essere usato solo per trattamenti al substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo	<i>Nematodi entomopatogeni</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Fosfato ferrico</i>	
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di infestazione generalizzata		

**DISERBO MIRTILLO**

<b>INFESTANTI</b>	<b>SOSTANZE ATTIVE</b>	<b>CARENZA GIORNI</b>	<b>NOTE</b>
Graminacee	Quizalofop etile	42	

## DIFESA INTEGRATA DELLA MORA DI ROVO – *Rubus fruticosus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - razionali concimazioni azotate; - allevare 4-5 tralci per ceppo; - distanze tra le file tali da favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare i residui della vegetazione estiva.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> Pyraclostrobin + Boscalid (1) Cyprodinil + Fludioxonil (2)	(1) Massimo 2 interventi all'anno, no in serra (2) Massimo 2 interventi all'anno, no in serra
<b>Antracnosi</b> <i>Elisnoe veneta</i>	<b>Interventi agronomici:</b> -evitare eccessi di azoto	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati: max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
<b>Ruggine</b> <i>Paragmidium</i> spp.	<b>Difesa chimica:</b> interventi autunnali.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Vedi nota sopra
<b>Oidio</b> <i>Podosphaera aphanis</i>		Zolfo <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> Penconazolo (1)	(1) Massimo 1 intervento anno
<b>Virosi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di materiale di propagazione sano; - razionali rotazioni colturali.		
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Antonomo</b> <i>Anthonomus rubi</i>		Acetamiprid (2)	(2) Max 2 interventi all'anno
<b>Mosca dei tralci</b> <i>Lasioptera rubi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - asportare i tralci colpiti e distruggerli.	<i>Spinosad</i> (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno tra <i>Spinosad</i> e Spinetoram (spinosine)
<b>Tortricidi</b>		<i>Spinosad</i> (1)	(1) Massimo 3 interventi anno con spinosine
<b>Cecidomia delle galle</b>		<i>Spinosad</i> (1)	(1) Massimo 3 interventi anno con spinosine



## DIFESA INTEGRATA DELLA MORA DI ROVO – *Rubus fruticosus*

FITOFAGI			
<b>Afidi</b> <i>Aphis ruborum</i> , <i>Amphorophora rubi</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - razionalizzare gli apporti di azoto, al fine di contenere o limitare gli attacchi di afidi (ed anche di cicaline)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Olio minerale</i> (1) Acetamiprid (2) Flupyradifurone (3)	(1) Verificare registrazione dei prodotti commerciali (2) Max 2 interventi all'anno (3) Solo in serra
<b>Cicaline</b>	<b>Interventi agronomici:</b> (vedi sopra)	<i>Olio essenziale di arancio</i> Acetamiprid (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>		Acetamiprid (1)	(1) Max 2 interventi all'anno
<b>Eriofide</b> <i>Acalitus essigi</i>	<b>Interventi chimici:</b> in caso di forti attacchi nell'anno precedente.	<i>Zolfo</i> <i>Olio essenziale di arancio</i>	Interventi alla ripresa vegetativa.
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa biologica:</b> - lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> oppure <i>Amblyseius californicus</i>	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Olio minerale</i> (1) Abamectina (2) Terpenoid blend QRD 460	(1) Verificare registrazione dei prodotti commerciali (2) Max 1 intervento all'anno. Solo pieno campo
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophila suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - si consiglia l'utilizzo di reti anti insetto. Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela. Raccogliere ed eliminare i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> (1) Acetamiprid (2) Spinetoram (3)	(1) No in coltura protetta (2) Max 2 interventi anno (3) Max 2 interventi anno, nel limite di 3 spinosine
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>		<i>Piretrine pure</i> (1)	(1) No in coltura protetta
<b>Oziorrinco</b>	<i>Metarhizium anisopliae</i> : il prodotto dev'essere usato solo per trattamenti al substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo	<i>Nematodi entomopatogeni</i> <i>Metarhizium anisopliae</i>	
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di infestazione generalizzata	<i>Fosfato ferrico</i>	

**DIFESA INTEGRATA DI RIBES – Ribes rubrum; Ribes nigrum; Ribes sativum**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante; - adottare sestri di impianto razionali; - utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti.	<i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> Penconazolo (1)	(1) Ammesso solo in pieno campo
<b>Antracnosi</b> <i>Drepanopeziza ribis</i> <b>Septoriosi</b> <i>Septoria ribis</i> <b>Ruggini - Cronartium</b> <i>ribicola, Puccinia ribis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante. <b>Difesa chimica</b> - interventi autunnali.	<i>Prodotti rameici (1)</i>	(1) Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati. Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare i residui	<i>Pyraclostrobin + Boscalid (1)</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i>	(1) Al massimo 2 interventi all'anno. Ammesso solo in pieno campo
<b>Marciumi del colletto</b> <b>Patogeni del terreno</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare terreni asfittici; - utilizzare materiale di propagazione sano; - evitare interventi ripetuti di fresature nell'interfila; - evitare il passaggio ripetuto dei mezzi meccanici su suolo saturo di umidità; - adottare l'inerbimento nell'interfila	<i>Trichoderma harzianum</i>	
<b>Virosi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di materiale di propagazione sano; - adottare razionali rotazioni colturali.		

**DIFESA INTEGRATA DI RIBES – Ribes rubrum; Ribes nigrum; Ribes sativum**

<b>FITOFAGI</b>				
<b>Cocciniglie</b> <i>Pseudaul. pentagona</i> ; <i>C. perniciososa</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - raschiatura dei fusti per l'asportazione degli scudetti	<i>Olio minerale</i> (1)	(1) Verificare registrazione dei prodotti	
<b>Afide giallo del ribes</b> <i>Cryptomyzus ribis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> razionalizzare gli apporti di azoto.	<i>Olio minerale</i> (1) <i>Lambdactalotrina</i> (2)	(1) Verificare registrazione dei prodotti (2) Max 1 intervento all'anno	
<b>Afide verde del ribes</b> <i>Aphis schneideri</i>				
<b>Sesia del ribes</b> <i>Synanthedon tipulifor.</i>	Utilizzare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli degli adulti. Asportare ed eliminare in primavera i tralci colpiti.	<i>Spinosad</i> (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno	
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa biologica:</b> - lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> oppure <i>Amblyseius californicus</i>	<i>Olio minerale</i> (1) <i>Terpenoid blend QRD 460</i> <i>Olio essenziale di arancio</i>	(1) Verificare registrazione dei prodotti	
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophila suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - si consiglia l'utilizzo di reti anti insetto. Consigliato il monitoraggio con trappole a base di aceto di succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	<i>Piretrine pure</i> (1) <i>Lambdactalotrina</i> (2) <i>Spinetoram</i> (3)	(1) No in coltura protetta (2) Max 2 interventi all'anno. <b>Solo ribes nero</b> (3) Max 2 interventi anno	
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp., Limax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di infestazione generalizzata	<i>Fosfato ferrico</i>		

**DISERBO RIBES**

<b>INFESTANTI</b>	<b>SOSTANZE ATTIVE</b>	<b>CARENZA GIORNI</b>	<b>NOTE</b>
Graminacee	Quizalofop etile	42	

**DIFESA INTEGRATA UVA SPINA – Ribes uva-crispa**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca mors-uvae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante; - adottare sestri di impianto razionali; - utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti.	Zolfo Bicarbonato di potassio Olio essenziale di arancio <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i>	(1) Accertarsi della registrazione dei formulati impiegati. Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Antracnosi</b> <i>Drepanopeziza ribis</i> <b>Septoriosi</b> <i>Septoria ribis</i> <b>Ruggini - Cronartium</b> <i>ribicola, Puccinia ribis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di azoto; - effettuare razionali potature delle piante. <b>Difesa chimica</b> - interventi autunnali.	<i>Prodotti rameici</i> (1)	
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare i residui	Pyraclostrobin + Boscalid (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i>	(1) Al massimo 2 interventi all'anno. Ammesso solo in pieno campo
<b>Marciumi del colletto</b> <b>Patogeni del terreno</b>	Interventi agronomici: - evitare terreni asfittici; - utilizzare materiale di propagazione sano; - evitare interventi ripetuti di fresature nell'interfila; - evitare il passaggio ripetuto dei mezzi meccanici su suolo saturo di umidità; - adottare l'inerbimento nell'interfila	<i>Trichoderma harzianum</i>	
<b>Virosi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di materiale di propagazione sano; - adottare razionali rotazioni colturali.		
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cocciniglie</b> <i>Pseudaul. pentagona; C. pernicioso</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - raschiatura dei fusti per l'asportazione degli scudetti	<i>Olio minerale</i> (1)	(1) Verificare registrazione dei prodotti
<b>Afide giallo del ribes</b> <i>Cryptomyzus ribis</i> <b>Afide verde del ribes</b> <i>Aphis schneideri</i>	<b>Interventi agronomici:</b> razionalizzare gli apporti di azoto.	<i>Olio minerale</i> (1) Lambdacialotrina (2)	(1) Verificare registrazione dei prodotti (2) Max 2 interventi all'anno
<b>Sesia del ribes</b> <i>Synanthedon tipulifor.</i>	Utilizzare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli degli adulti. Asportare ed eliminare in primavera i tralci colpiti.	<i>Spinosad</i> (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno tra <i>Spinosad</i> e <i>Spinetoram</i> (spinosine)
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Difesa biologica:</b> - lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> oppure <i>Amblyseius californicus</i>	<i>Olio minerale</i> (1) Terpenoid blend QRD 460 <i>Olio essenziale di arancio</i>	(1) Verificare registrazione dei prodotti
<b>Moscerino dei piccoli frutti</b> <i>Drosophila suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - si consiglia l'utilizzo di reti anti insetto. Consigliato il monitoraggio con trappole a base di aceto di succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	Lambdacialotrina (1) Spinetoram (2)	(1) Max 2 interventi all'anno (2) Max 2 interventi anno, nel limite di 3 spinosine
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp., Limax spp.</i>	<b>Difesa chimica:</b> - solo in caso di infestazione generalizzata	<i>Fosfato ferrico</i>	

**FLOREALI E ORNAMENTALI**  
**N.B. LA DIFESA VA ADATTATA ALLA SINGOLA SPECIE COLTIVATA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>  <b>Peronospora</b> <i>Phytophthora</i> spp, <i>Peronospora</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· evitare le irrigazioni sopra chioma e gli eccessi idrici;</li> <li>· evitare i repentini sbalzi termici;</li> <li>· evitare gli impianti troppo fitti;</li> <li>· evitare lo sgocciolamento dell'acqua di condensa (mediante impiego di sottotelo).</li> </ul> <b>Difesa chimica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire alla comparsa dei primi sintomi.</li> </ul> <b>Interventi agronomici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare i ristagni idrici.</li> <li>- in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore o con la solarizzazione.</li> </ul> <b>Difesa chimica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire in presenza di sintomi.</li> </ul>	<i>Prodotti rameici</i> (1) Cimoxanil (2) Dimetomorf (3) Metalaxil-M	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (2) Autorizzato solo su rosa. (3) Autorizzato solo su gerbera e garofano (4) Max 1 intervento per ciclo con Metalaxil-M
<b>Marciumi basali e radicali</b> <i>Phytophthora</i> spp, <i>Pythium</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare i ristagni idrici.</li> <li>- in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore o con la solarizzazione.</li> </ul> <b>Difesa chimica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire in presenza di sintomi.</li> </ul>	<i>Streptomyces griseoviridis</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (1) Dimetomorf (2) Fosetil alluminio (3) Metalaxil-M (4) Propamocarb (5)	(1) Solo in serra (2) autorizzato solo su garofano e gerbera, contro <i>Phytophthora</i> spp. (3) autorizzato solo su ornamentali (4) Al massimo 1 intervento per ciclo (5) Preparazione substrati
<b>Marciumi</b> <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Rhizoctonia</i> spp. <i>Corticium</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· eseguire un accurato drenaggio ed equilibrate concimazioni;</li> <li>· trapiantare superficialmente;</li> <li>· effettuare una buona aerazione dell'ambiente in colture protette;</li> <li>· controllare l'umidità nella serra;</li> <li>· distruggere le piante infette.</li> <li>· disinfettare il terreno con il vapore o con la solarizzazione.</li> </ul> <b>Difesa chimica:</b> intervenire ai primi sintomi.	<i>Coniothyrium minutans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp. <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (2) Tolclofos-metil (3) Flutolanil (4)	(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura. Indicato per <i>Sclerotinia</i> (2) Solo in serra (3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale. Solo per <i>Rhizoctonia</i> (4) Solo garofano, per rizotonia, max 1 intervento per ciclo colturale
<b>Alternaria</b>	<b>Interventi agronomici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· eliminare e distruggere i residui di piante infette.</li> </ul> <b>Difesa chimica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire solo alla comparsa dei sintomi</li> </ul> <b>Difesa chimica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti</li> </ul>	Prodotti rameici (1)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Patogni tellurici</b> <i>Sclerotinia</i> <i>Rhizoctonia</i> <i>Rhizoctonia</i> <i>Pythium</i>	<b>Difesa chimica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti</li> </ul>	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Metam Na (1) Metam K (1)	(1) Ammessi solo in coltura protetta. Impiegabili una volta ogni tre anni sullo stesso terreno. Dose massima complessiva 1000 litri per ettaro anno

**FLOREALI E ORNAMENTALI**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b> <b>Fusariosi</b> ( <i>Fusarium spp</i> ) <b>Tracheomicosi</b> ( <i>Verticillium spp.</i> , <i>Phialophora spp.</i> )	<b>Interventi agronomici</b> evitare le lesioni ai bulbi; impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente; adottare cultivar meno suscettibili; distruggere le piante affette; disinfettare il terreno con il vapore o con la solarizzazione.  <b>Interventi agronomici</b> . eliminare le foglie ed i getti colpiti; . effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate. <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi	<i>Sireptomyces griseoviridis</i> <i>Trichoderma spp.</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (3) Tiofanate metil (1) Procloraz (2)	(1) Autorizzato per Fusarium. Max 2 interventi all'anno. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 19/10/2021 (2) Su floreali – garofano, rose, euphorbia e bulbose – e ornamentali. Max 1 trattamento per ciclo. (3) Solo in serra
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Oidium chrisanthemi</i> <i>O. tabaci</i>	<b>Interventi agronomici</b> . eliminare le foglie ed i getti colpiti; . effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate. <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi sintomi	<i>Ampelomyces quisqualis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Zolfo</i> <i>Bicarbonato di potassio</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> Miclobutanil (1, 2) Penconazolo (1) Fenpropidin (1) Difenoconazolo (1, 2) Tetraconazolo (1, 4) Tebuconazolo (1) Procloraz (1) Trifloxystrobin (1) Boscalid + Pyraclostrobin (5) Isopyrazam + Azoxystrobin (6) Metrafenone (7) Bupirimate (8)	(1) Con gli IBE al massimo 3 interventi per ciclo colturale. Con Miclobutanil, Propiconazolo, Difenoconazolo, Tebuconazolo max 2 interventi all'anno, in alternativa tra loro. Procloraz vedi nota sopra. (2) Autorizzato solo su rosa e garofano (4) Autorizzato solo su rosa, gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera, garofano, hypericum, pelargonio (5) Max 3 interventi all'anno con prodotti contenenti strobilurine (Trifloxystrobin, Pyraclostrobin, Azoxystrobin) e max 3 interventi all'anno con prodotti contenenti SDHI (Boscalid, Isopyrazam) (7) Max 3 interventi all'anno. Ammesso solo in serra. (8) Max 2 interventi all'anno
<b>Ruggine</b> <i>Phragmidium spp.</i> <i>Uromyces caryophyllinus</i>	<b>Interventi agronomici</b> . riscaldamento e ventilazione adeguati della serra; . raccolta e distruzione delle foglie e dei rametti infetti. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<b>Prodotti rameici*</b> Miclobutanil (1, 3) Penconazolo (1) Tetraconazolo (1, 2) Tebuconazolo (1) Metiram (4) Mancozeb (5) <i>Olio di arancio dolce</i> (6)	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Con gli IBE al max 3 interventi per ciclo colturale. Vedio nota sopra (2) Autorizzato su rosa, gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera, garofano, hypericum, pelargonio (3) autorizzato solo su garofano e rosa (4) Autorizzato su garofano. Massimo 3 interventi all'anno. (5) Max 2 interventi. Autorizzato su crisantemo, garofano, rosa, giglio, iris, piante ornamentali. <b>Revocato:</b> impiego ammesso fino al 4 gennaio 2022. (6) Solo crisantemo
<b>Septoria</b>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

## FLOREALI E ORNAMENTALI

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici</b> assicurare una buona aerazione della serra; evitare le irrigazioni a pioggia. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 Cyprodinil+Fludioxonil (1) Mepanipyrim (2) Pyrimethanil (2) Boscalid + Pyraclostrobin (3) Prochloraz (4) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (5)	(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale; autorizzato solo su floricole (2) Con Mepanipyrim e Pyrimethanil max 2 interventi all'anno. Pyrimethanil autorizzato solo su ciclamino (3) Max 3 interventi all'anno (4) Floreali (garofano, rose, Euphorbia pulcherrima e bulbose) ed ornamentali. Max 1 intervento per ciclo (5) Solo in serra
<b>Cladosporiosi</b>			
<b>Antracnosi</b>		<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Ticchiolatura</b> <i>Diplocarpon rosae</i> ; <i>Venturia</i> spp. <i>Fusicladium</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> Abbassare l'umidità relativa al di sotto dell'85%, mediante ventilazione e riscaldamento; impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; scegliere cultivar resistenti; evitare di bagnare le foglie con l'irrigazione; distruggere, per quanto possibile, le foglie infette in autunno. <b>Difesa chimica:</b> alla comparsa delle prime macchie fogliari.	<i>Prodotti rameici</i> * Miclobutanil (1, 2)	* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo (1) Con IBE 3 interventi per ciclo colturale. Con Miclobutanil, Propiconazolo, Difenoconazolo, max 2 interventi all'anno, in alternativa tra loro. (2) Autorizzato solo su rosa e garofano
<b>Cancro del cipresso</b>		Tiofanate metile	Massimo 3 interventi all'anno. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 19/10/2021.
<b>BATTERIOSI</b>			
<b>Batteriosi</b> ( <i>Erwinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp. e altre)	<b>Interventi agronomici</b> - effettuare un accurato drenaggio del terreno; irrigazioni equilibrate; - in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore - impiegare materiale di propagazione sano o certificato	<i>Prodotti rameici</i> (1)	(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
<b>Virosi</b> (CMV, LSV, TSWV, ecc.)	<b>Interventi agronomici</b> impiego di materiale sano ed eliminazione piante infette <b>Difesa chimica:</b> lotta agli insetti vettori		

## FLOREALI E ORNAMENTALI

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUS.	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<p><b>Afidi</b>  <i>Aphis gossypii</i>,  <i>Macrosiphoniaella</i>  <i>chrysanthemi</i>,  <i>Macrosiphum spp.</i>,  <i>Myzus spp.</i>,  <i>Rhopalosiphum padi</i></p>	<p><b>Controllo biologico:</b> - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi. La <i>Chrysoperla carnea</i> è un predatore di afidi ed altre specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più infestate.                      Il parassitoide <i>Aphidius colemani</i> controlla diverse specie di afidi compreso <i>A. gossypii</i>. La distribuzione avviene in più lanci da 0,5-2 individui/mq.                      Per il controllo principalmente di <i>A. gossypii</i>, con temperature più elevate, è impiegabile anche il parassitoide <i>Lysiphlebus testaceipes</i>.</p> <p><b>Difesa chimica.</b>                      Soglia: intervenire alla comparsa delle prime colonie                      Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari</p>	<p><i>Sali potassici di acidi grassi</i>  <i>Piretrine pure</i>  <i>Maltodestrina</i>  <i>Olio minerale</i>  <i>Azadiractina</i>                      Cipermetrina (1, 2)                      Deltametrina (1)                      Betaciflutrin (1, 5)                      Esfenvalerate (1)                      Taufluvinalinate (1, 2)                      Zetacipermetrina (1, 6)                      Lambdacialotrina (1)                      Acetamiprid (3)                      Sulfoxaflor                      Flupyradifurone (4)</p>	<p>(1) Con piretroidi ed etofenprox: al massimo 2 interventi per ciclo culturale. Con Deltametrina max 3 interventi anno. Con Betaciflutrin max 2 interventi anno. Taufluvinalinate max 2 anno. Lambdacialotrina e Zetacipermetrina max 1 anno in alternativa tra loro.                      (2) Solo in pieno campo                      (3) Max 2 interventi all'anno.                      (4) Solo in serra                      (5) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021                      (6) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 24/09/2021</p>
<p><b>Tripidi</b>  <i>Thrips spp.</i>  <i>Heliothrips spp.</i>  <i>Frankliniella occidentalis</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b>                      - eliminazione delle infestanti.                      - distruzione dei residui colturali;</p> <p><b>Controllo biologico:</b>                      - effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i>, a partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con <i>Amblyseius swirskii</i>, quest'ultimo efficace anche su aleurodidi. Con temperature non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche <i>Amblyseius cucumeris</i>.                      Impiegabile anche il nematode <i>Steinernema feltiae</i></p> <p><b>Difesa chimica:</b>                      Installare trappole cromotopiche di colore azzurro.                      intervenire alle prime catture nelle trappole</p>	<p><i>Beauveria bassiana</i>  <b><i>Paecilomyces fumosoroseus</i></b>  <i>Piretrine pure</i>  <i>Azadiractina</i>  <i>Sali potassici di acidi grassi</i>  <i>Olio essenziale di arancio</i>  <i>Olio minerale</i>                      Acrinatrina (1, 2)                      Cipermetrina (1, 2)                      Deltametrina (2)                      Taufluvinalinate (1, 2)                      Lambdacialotrina (2)                      Etofenprox (2)                      Acetamiprid (3)  <i>Spinosad</i> (4, 5)                      Spinetoram (4)                      Lufenuron (6)                      Abamectina (7)                      Formetanato (8)  <i>Lecanicillium muscarium</i> (9)                      Cyantraniliprole (10)</p>	<p>(1) Autorizzato solo pieno campo                      (2) Vedi nota piretroidi                      (3) Massimo 2 interventi anno                      (4) Con spinosine massimo 3 interventi all'anno. Max 1 con Spinetoram.                      (5) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali.                      (6) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. Max 1 intervento.                      (7) Max 1 intervento per ciclo, 2 all'anno                      (8) Max 1 intervento anno                      (9) Solo coltura protetta                      (10) Pianta in vaso e fiori recisi, solo in serra e coltivazioni non a contatto del suolo.</p>



## FLOREALI E ORNAMENTALI

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Metcalfa</b> <i>Metcalfa pruinosa</i>	<b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo in caso di infestazioni in atto	<i>Olio minerale</i> Spinosad (1) Etofenprox (2) <i>Olio essenziale di arancio</i> (3)	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità (1) Massimo 3 interventi all'anno. Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano gerbera, ornamentali. (2) Con piretroidi ed etofenprox: al massimo 2 interventi per ciclo colturale (3) Per alberi e arbusti ornamentali
<b>Psille</b>	<b>Interventi agronomici</b> · non eccedere nelle concimazioni azotate.	<i>Olio minerale</i> Etofenprox (1)	(1) Vedi nota piretroidi. Max 3 interventi all'anno, 2 per ciclo colturale.
<b>Cocciniglie</b>	<b>Interventi agronomici</b> · eliminare con la potatura verde i rami maggiormente infestati. <b>Difesa chimica:</b> - soglia di intervento: presenza	<i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Olio minerale</i> Buprofezin (2) Pyriproxyfen (3)	(2) Max 1 intervento all'anno. (3) Max 1 intervento anno
<b>Cicaline</b> <i>Tipthocyba rosae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare le coltivazioni in areali umidi e vicino ad una ricca vegetazione spontanea. <b>Difesa chimica:</b> - in vivaio, alla presenza; in serra, solo su forti infestazioni.	<i>Olio minerale</i> <i>Olio essenziale di arancio</i> (1) <i>Azadiractina</i> Etofenprox (2)	(1) Per alberi e arbusti ornamentali (2) Vedi nota piretroidi. Max 2 interventi all'anno
<b>Tortricidi e Bega del Garofano</b> <b>Garofano</b> <i>Epichoristodes acerbella,</i> <i>Tortrix pronubana</i>	<b>Interventi agronomici</b> · asportare e distruggere le parti infestate; · eliminare i residui colturali; · eliminare le erbe infestanti; · utilizzare reti antinsetto. <b>Installare trappole a feromoni.</b> Campionamento: esaminare settimanalmente 200 germogli/1000mq di coltura. <b>Difesa chimica:</b> - intervenire dopo il picco di volo, al superamento della soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati	<i>Bacillus thuringensis</i> Deltametrina (1) Betaciflutrin (1, 5) Taufluvalinate (1, 2) Spinosad (3, 4) Emamectina (6)	(1) Vedi nota piretroidi. (2) Ammesso solo pieno campo. Max 2 all'anno (3) Ammesso solo su rosa, crisantemo, garofano gerbera, ornamentali (4) Al max 3 interventi all'anno (5) <b>Revocato.</b> Impiegabile fino al 20/07/2021 (6) Max 2 interventi all'anno
<b>Cimice asiatica</b> <i>Halyomorpha halys</i>		<i>Olio essenziale di arancio</i> (1) Etofenprox (2)	(1) Per alberi e arbusti ornamentali (2) Max 2 interventi all'anno

## FLOREALI E ORNAMENTALI

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Notte fogliari</b> <i>Agrotis</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.	Disporre in serra trappole sessuali se disponibili in commercio.  <b>Difesa chimica:</b> - intervenire quando si è accertato il momento di massimo sfarfallamento degli adulti.	<i>Bacillus thuringensis</i> Etofenprox (1) Betaciflutrin (1, 6) Cipermetrina (2, 1) Deltametrina (1) Taufluvinate (1, 2) Lamdacialotrina (1) Spinosaad (4, 3) Emamectina (5)	(1) Vedi nota piretroidi (2) Ammesso solo pieno campo (3) Al massimo 3 interventi all'anno (4) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali (5) Max 2 interventi all'anno (6) <b>Revocato</b> . Impiegabile fino al 20/07/2021
<b>Aleurodidi</b> <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporarium</i>	<b>Interventi meccanici:</b> si possono installare idonee reti all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti <b>Controllo biologico:</b> posizionare trappole cromotropiche gialle, 1 ogni 100 mq. Alle prime catture di <i>T. vaporarium</i> effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> . Alle prime catture di <i>Bemisia tabaci</i> effettuare lanci di <i>Macrolophus caliginosus</i> o di <i>Eretmocerus mundus</i> o <i>Eretmocerus eremicus</i> . Anche <i>Amblyseius swirskii</i> è utile per aleurodidi e tripidi	<i>Sali K di acidi grassi</i> <i>Piretrine pure</i> <i>Beauveria bassiana</i> <b><i>Paeclomyces fumosoroseus</i></b> <i>Olio essenziale di arancio</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Olio minerale</i> <i>Azadiractina</i> Betaciflutrin (1, 7) Deltametrina (1) Esfenvalerate (1) Acetamiprid (2) Sulfoxaflor Buprofezin (3) Pyriproxyfen (4) Flupyradifurone (5) <i>Lecanicillium muscarium</i> (6)	(1) Piretroidi ed etofenprox: al massimo 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. Con Deltametrina max 3 interventi all'anno. Con Betaciflutrin max 2 interventi anno. Con Esfenvalerate max 1 intervento anno. (2) Max 2 interventi all'anno (3) Max 1 intervento anno (4) Max 1 intervento all'anno (5) Solo in serra (6) Solo coltura protetta  (7) <b>Revocato</b> . Impiego ammesso fino al 20/07/2021
<b>Elateridi</b> <i>Agrotis</i> spp.		Teflutrin (1) Zetacipermetrina (1, 2) Lamdacialotrina (1)	(1) Ammesso solo pieno campo, trattamenti al terreno. (2) <b>Revocato</b> . Formulato granulare impiegabile fino al 30/11/2021
<b>Maggolini</b> <i>Melolontha</i> <i>melolontha</i>		Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Teflutrin (2) Acetamiprid (3)	(1) Piretroidi (escluso Teflutrin): al massimo 2 interventi per ciclo colturale. Vedi note sopra. (2) Ammesso solo in pieno campo, trattamenti al terreno. (3) Massimo 2 interventi anno

## FLOREALI E ORNAMENTALI

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Cetonie</b>		Deltametrina (1)	(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi per ciclo colturale . Con Deltametrina max 3 interventi all'anno.
<b>Oziorrinco</b>	<b>Controllo biologico</b> intervenire contro le larve nel terreno in autunno o in primavera <b>Difesa chimica:</b> - intervenire solo sugli adulti nel periodo estivo alla comparsa delle prime mangiature fogliari nelle ore crepuscolari o notturne	Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema feltiae</i> e <i>Heterorhabditis spp.</i> Taufluvalinate (1, 2) <i>Metarhizium anisopliae</i>	(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi per ciclo colturale . (2) Ammesso solo pieno campo. Max 2 nterventi all'anno.
<b>Tentredini</b>	<b>Interventi agronomici</b> - asportazione e distruzione delle parti di pianta colpite. <b>Difesa chimica:</b> - alla comparsa dei primi danni, ed eseguendo trattamenti, se possibile, localizzati.		
<b>Larve minatrici</b> <i>Liriomyza spp.</i>	Installare trappole cromotropiche gialle. <b>Controllo biologico:</b> - utilizzo di <i>Diglyphus isaea</i> <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alle prime catture	Azadiractina <i>Olio minerale</i> Cromazina (1) <i>Spinosad</i> (2) Cyantraniliprole (3)	(1) Autorizzato su garofano, crisantemo, gerbera, gipsofila. Ammesso solo in serra. <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021. (2) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali. Massimo 3 interventi all'anno (3) Pianta in vaso e fiori recisi, solo in serra e coltivazioni non a contatto del suolo.
<b>Sciari</b> <i>Lycoriella spp.</i> <i>Bradysia spp.</i> <i>Platasciaria spp.</i>	<b>Controllo biologico</b> intervenire contro le larve nel terreno Catture massali con trappole cromotropiche gialle	Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema feltiae</i> e <i>Heterorhabditis spp.</i>	

## FLOREALI E ORNAMENTALI

AVVERSITA' FITOFAGI	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus spp</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>	<b>Controllo biologico:</b> - introdurre con uno o più lanci, 8-12 predatori/mq di <i>Phytoseiulus persimilis</i> , oppure <i>Amblyseius adersoni</i> , 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure <i>Amblyseius californicus</i> , da 4 a 20 individui/mq in funzione del livello di infestazione.  <b>Difesa chimica:</b> - intervenire alla presenza di infestazioni	<i>Sali potassici di acidi grassi</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Zolfo</i> <i>Maltodestrina</i> <i>Olio minerale</i> Abamectina (1) Milbectina Bifenazate Clofentezine Exitiazox Fenpiroximate Pyridaben (2) Etozazole Acequinocil Cyflumetofen (3)	Al massimo 4 interventi all'anno contro questi fitofagi (1) Al massimo 1 interventi per ciclo colturale. (2) Autorizzato solo su rosa, garofano, crisantemo (3) Ornamentali (in vaso) in serra
<b>Lumache, chioccioline, Limacce</b>	<b>Interventi chimici</b> - alla comparsa delle prime piante infestate.	<i>Phasmarabbits hermafrodita</i> Metaldeide esca Fosfato ferrico	(1) Usare solo sotto tunnel, tunnellino o tessuto non tessuto (verificare registrazione formulato)
<b>Paisandisia</b> <i>Paysandisia archon</i>			
<b>Punteruoli</b> <i>Rhynchophorus spp</i>			
<b>Nematodi</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Aphelenchoides fragariae</i> , <i>Pratylenchus spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente - disinfezione terreno con vapore o solarizzazione	Nematodi entomopatogeni <b>Abamectina (1)</b> <i>Paecilomyces lilacinus</i>	(1) <b>Impiegabile per endoterapia</b>

## FLOREALI E ORNAMENTALI - DISERBO

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
<b>Pre semina Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Carfentrazone (1)	<b>Glifosate: limite aziendale di impiego</b> pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L'uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta. (1) solo per vivai di piante arbustive ed arboree
<b>Epoche diverse</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	Max 4 applicazioni all'anno
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Isoxaben (1) Carfentrazone (2)	(1) Solo ornamentali (2) Solo per vivai di piante arbustive ed arboree

Ove possibile effettuare la pacciamatura del terreno con film plastici biodegradabili

## DIFESA INTEGRATA FUNGHI COLTIVATI

### PRATAIOLO - *Agaricus bisporus*

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Marciume secco</b> <i>Verticillium fungicola</i>	<b>Interventi agronomici</b> Isolare dall'ambiente esterno le stanze di coltivazione; filtrare l'aria; pulire e disinfettare i locali di coltivazione e le attrezzature; abbattere la polvere durante le fasi di carico di composto e terra di copertura, controllare i Ditteri; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione; curare l'igiene del personale.	Procloraz	10	
<b>Marciume umido</b> <i>Mycogone perniciosa</i>	<b>Interventi agronomici</b> Vedi marciume secco.	Procloraz	10	
<b>Tela di ragno</b> <i>Cladobotryum dendroides</i>	<b>Interventi agronomici</b> Vedi marciume secco.	Procloraz Metrafenone	10 10s	
<b>Muffe verdi</b> <i>Trichoderma spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> Selezionare le materie prime; eseguire un'accurata fermentazione e pastorizzazione del composto; isolare la sala semina; filtrare l'aria dei tunnel di pastorizzazione ed incubazione; abbattere le polveri; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione; curare l'igiene del personale.	Procloraz	10	
<b>BATTERIOSI</b>				
<b>Maculatura batterica</b> <i>Pseudomonas tolaas</i>	<b>Interventi agronomici</b> Controllare l'umidità e la velocità dell'aria; eliminare gli sbalzi di temperatura. Trattare l'acqua di annaffiatura con Cloro (ipoclorito di sodio o cloruro di calcio) o Iodio (PVP 179)			
<b>Mummy</b> <i>Pseudomonas spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> Sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione; non bagnare il composto alla semina.			
<b>VIROSI</b> Watery stipe, die back, virus X	<b>Interventi agronomici</b> Filtrare l'aria dei tunnel di pastorizzazione incubazione; raccogliere i funghi chiusi; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.			

## DIFESA INTEGRATA PRATAIOLO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Sciaridi</b> <i>Lycortella spp.</i> <i>Bradysia spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura; filtrare l'aria in entrata ed uscita; mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione	<i>Steinernema feltiae</i> Citomazina (1) Deltametrina	nr nr 3	(1) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021
<b>Foridi</b> <i>Megaselia spp</i>	<b>Interventi agronomici</b> - Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura; - filtrare l'aria in entrata ed uscita; - mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo; - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	Citomazina (1) Deltametrina	nr 3	(1) <b>Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021
<b>Cecidomidi</b> <i>Heteropeza pigme</i>	<b>Interventi agronomici</b> - Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura; - filtrare l'aria in entrata ed uscita; - mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo; - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	Deltametrina	3	
<b>Acari</b> <i>Pygmephorus spp.</i> <i>Tarsonemus myceliophagus</i>	<b>Interventi agronomici</b> Curare la fermentazione e la pastorizzazione del composto; eliminare le muffe del composto stesso.	<i>Maltodestrina</i>	nr	
<b>Nematodi</b> <i>Aphelenchoides composticela</i> <i>Ditylenchus spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> Curare la pastorizzazione del composto; lavare e disinfettare macchine ed attrezzi; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.			
<b>Limacce</b>	<b>Interventi agronomici</b> Isolare le stanze di coltivazione dall'ambiente esterno.	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	

**PLEUROTUS - Pleurotus spp; PIOPPINO - Agrocybe aegerita**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	CARENZA GIORNI	LIMITAZIONI D'USO
<b>CRITTOGAME</b>				
<b>Tela di ragno</b> <i>Cladobotryum dendroides</i>	<b>Interventi agronomici</b> Isolare dall'ambiente esterno le stanze di coltivazione; filtrare l'aria; pulire e disinfettare i locali di coltivazione e le attrezzature; abbattere la polvere durante le fasi di carico di composto e terra di copertura, controllare i ditteri; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione; curare l'igiene del personale.	Procloraz Metrafenone	10 10s	
<b>Muffe verdi</b> <i>Trichoderma spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> Selezionare le materie prime; eseguire un'accurata fermentazione e pastorizzazione del composto.	Procloraz	10	
<b>BATTERIOSI</b>				
<b>Maculatura batterica</b> <i>Pseudomonas tolaasi</i>	<b>Interventi agronomici</b> Controllare l'umidità e la velocità dell'aria; eliminare gli sbalzi di temperatura; trattare l'acqua di annaffiatura con Cloro (ipoclorito di sodio o cloruro di calcio) o Iodio (PVP 179)			
<b>FITOFAGI</b>				
<b>Sciardi</b> <i>Lycoriella spp.</i> <i>Bradysia spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura; filtrare l'aria in entrata ed uscita; mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo; sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	<i>Steinernema feltiae</i> Cirimazina (1) Deltametrina	nr nr 3	<b>(1) Revocato.</b> Impiego ammesso fino al 30/06/2021
<b>Cecidomidi</b> <i>Heteropeza pigmea</i>	<b>Interventi agronomici</b> - Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura; - filtrare l'aria in entrata ed uscita; - mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo; - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	Deltametrina	3	
<b>Limacce</b>	<b>Interventi agronomici</b> Isolare le stanze di coltivazione dall'ambiente esterno.	<i>Fosfato ferrico</i>	nr	